




BIBLIOTECA NAZ.  
Vittorio Emanuele III

XXIX

B

29

MACOLI







XXIA

B.

29







# INTRODUCTION

*A L'ÉTUDE*

DU RÈGNE MINÉRAL

---

Terra, cui uni ferum naturæ partium, eximia propter  
merita, cognomen indidimus maternæ venerationis....  
imus in viscera ejus, persequimur omnes fibras, vivi-  
musque super excavatam . . . . . inter crimina ingrati  
animi & hoc duxerim; quod naturam ejus ignoramus.

*Plin. Nat. Hist. Lib. II.*

---

# INTRODUCTION

## A L'ÉTUDE DES CORPS NATURELS, TIRÉS DU RÈGNE MINÉRAL.

*Par M. BUCQUET, Docteur-Régent  
de la Faculté de Médecine de  
Paris.*

---

TOME I.

---




*A PARIS, rue Saint-Jacques,*  
Chez Jean-Th. HERRISSANT, Père, Imprimeur  
du Cabinet du ROI, Maison & Bâtimens  
de SA MAJESTÉ.

---

M. DCC. LXXI.

*Avec Approbation & Privilège du Roi*







A

MONSIEUR LE DUC

DE LA

ROCHEFOUCAULD,

PAIR DE FRANCE.

*MONSIEUR,*

*L'ambition de voir briller un  
Nom illustre à la tête de mon  
Ouvrage, n'est pas ce qui me dé-  
termine à vous l'offrir : il vous  
appartient encore à d'autres titres.  
C'est à cette générosité noble, avec  
laquelle vous communiquez les ri-  
ches possessions que vous rassemblez*

*avec tant de soins ; c'est au choix  
que vous avez fait de moi , pour  
être le Compagnon de votre Etude ,  
que je suis redevable de la plus  
grande partie de mes connoissances ;  
vous en faire hommage , MON-  
SIEUR , c'est à la fois satisfaire  
à votre amour pour la Science , au  
desir que vous avez d'en étendre  
les progrès , & remplir le devoir  
le plus doux que m'impose la re-  
connoissance. Puisse notre goût com-  
mun pour l'Etude de la Nature ,  
cimentier l'amitié dont vous voulez  
bien m'honorer , & me procurer des  
occasions fréquentes de vous assurer  
du respect avec lequel je suis ,*

**MONSIEUR,**

Votre très-humble & très-obéissant  
Serviteur, BUCQUET. D. M. P.



---

---

## P R É F A C E.

LES Savans avoient senti depuis long-temps , de quelle importance il étoit pour le progrès de l'Histoire Naturelle , de joindre à l'étude de cette Science , les connoissances que fournit la Chymie. Plusieurs bons Minéralogistes s'en sont souvent servi pour assigner des caractères aux substances qu'ils vouloient faire connoître ; mais en général , ils n'ont eu de la Chymie que des notions très-superficielles ; & cette Science devient une source d'erreurs , lorsqu'on ne la connoît pas dans ses détails. Aussi malgré les recherches de ces grands Hommes ,

ils leur est souvent arrivé de réunir des êtres très - dissemblables, & d'affigner des noms différens à des substances qui étoient absolument de même nature.

Les Chymistes de leur côté ont éclairci singulièrement plusieurs points intéressans de l'Histoire Naturelle ; mais ils semblent s'être bornés à un certain nombre , & paroissent avoir épuisé entièrement quelques matières, tandis qu'ils en ont laissé une foule d'autres, sur lesquelles ils n'ont pas même paru jeter les yeux.

Plein du desir d'acquérir sur ces objets si peu connus, des lumières plus étendues, j'ai cru

devoir lier si intimement la Chymie & l'Histoire Naturelle, que ces deux branches de la Physique ne fissent plus qu'une seule & même Science qui renfermât tout ce qu'on peut savoir de plus intéressant sur les Corps naturels. J'ai fait d'après ce plan, depuis quelques années, des Démonstrations qui ont eu le bonheur de plaire à plusieurs personnes instruites qui m'ont fait l'honneur d'y assister ; mais elles n'ont pas été aussi utiles au plus grand nombre que je l'aurois désiré. Forcé, comme on est, par le peu de temps qu'on emploie à l'étude de l'Histoire Naturelle, de réunir dans une seule séance,

x     *P R É F A C E.*

une quantité prodigieuse de faits, nouveaux pour la plupart de ceux qui les entendent; la mémoire a peine à les retenir, & souvent l'exposé du lendemain fait perdre celui de la veille : il arrive donc, qu'après bien des soins de la part de celui qui enseigne, & beaucoup d'application de la part de ceux qui étudient, il ne leur reste rien que quelques idées vagues, & souvent même du dégoût pour une Science qu'ils regardent comme trop au-dessus de leurs forces. J'ai cru qu'un des moyens de remédier à cet inconvénient, étoit de leur mettre sous les yeux, un tableau raccourci des

objets qu'ils parcourent avec tant de rapidité, afin que les examinant avant & après chaque leçon, ils pussent se les graver plus profondément dans la mémoire.

Je commence par donner le *Règne Minéral*, parceque les minéraux forment la masse du globe, & qu'ils servent à la production des plantes dont se nourrissent les animaux; d'ailleurs l'analyse chymique de ces substances, me paroît plus aisée que celle des Corps que renferment les autres Règnes de la Nature; leurs principes sont plus à nu que ceux des plantes ou des animaux; & quoique les opérations qu'on fait sur les ma-

tières minérales , soient très-multipliées , les connoissances qu'elles nous laissent sont infiniment plus exactes & plus satisfaisantes , puisque , non contente de connoître leurs principes par l'analyse , la Chymie est en état de les reproduire par la Synthèse , ce qu'elle ne peut pas faire à l'égard des matières végétales & animales. En présentant cet Essai , je n'ai pas prétendu donner un nouveau Système de Minéralogie , j'ai tâché seulement de rassembler sous des caractères faciles à saisir , le plus grand nombre de substances minérales : j'en ai développé la nature , & j'ai indiqué les diffé-

rentes combinaisons dans lesquelles elles entrent ; ainsi que les usages principaux auxquels on peut les employer. J'ai pu omettre beaucoup de Corps qui ne sont pas encore venus à ma connoissance, & mal classer ceux que je ne connois que superficiellement. C'est un défaut auquel le temps seul & un travail opiniâtre peuvent remédier. J'ai supprimé à dessein un grand nombre de détails dans lesquels sont entrés les Minéralogistes, parcequ'ils m'ont paru minutieux, & peu faits pour des Commençans. J'ai évité autant qu'il a été en moi, toute érudition chymique & toute citation ; ce

n'est pas que j'aie eu envie de me parer des découvertes d'autrui : il est deux sortes de découvertes chimiques, les unes sont l'effet du hazard & peuvent s'offrir au plus ignorant comme au plus habile Artiste : je pourrois peut-être en réclamer de cette sorte ; mais je ne crois pas qu'elles en vailent la peine, & je les abandonne volontiers à quiconque prétendra les avoir faites avant moi : les autres sont le fruit d'un travail suivi avec intention & sagacité, comme celles de M. Macquer sur l'arsenic, les argilles, le bleu de Prusse, &c. de feu M. Rouelle sur l'inflammation des huiles,




les crySTALLIFICATIONS, de M. d'Ar-  
cet sur l'action d'un feu égal &  
violent; & de tant d'autres cé-  
lèbres Chymistes. Ce sont celles-  
là que je desirerois avoir faites,  
mais j'avoue de bonne foi n'en  
avoir point encore à moi de cet  
ordre.

Tout ce que je me suis pro-  
posé dans mon travail, c'est de  
faciliter l'étude d'une Science  
que j'aime, non-seulement aux  
personnes qui auroient quelque  
intention de suivre mes Cours,  
mais encore à celles qui veulent  
en suivre d'autres; parcequ'il suf-  
fit d'examiner les échantillons  
que j'indique, qui pour la plupart  
sont rangés dans la magnifique

xvj *P R É F A C E.*

Collection du Cabinet du Roi,  
& de voir dans quelque Laboratoire les Expériences analytiques qu'un grand nombre de très-bons Maîtres exécutent ; peut-être même avec plus d'adresse que je ne puis le faire , quelques soins que j'emploie pour cela. Si cette première Partie paroît utile , je me hâterai de la faire suivre des Règles végétal & animal ; afin qu'on puisse trouver réunis les principes fondamentaux de l'Histoire Naturelle, & puiser ensuite avec plus d'avantage dans ces sources intarissables de Science , fruit des veilles des plus grands Naturalistes, & des Chymistes les plus habiles.

DIVISION



# DIVISION

D E S

## MINÉRAUX.

*Le Règne Minéral se divise en sept Classes.  
Les Classes en Sections, les Sections en  
Genres, & les Genres en Espèces.*

---

### CLASSE I.

T E R R E S .

T E R R Æ .

#### SECTION I.

Terres vitreuses.

*Terræ vitreæ.*

#### GENRE I.

Sables pierreux.

*Arenæ.*

#### ESPECES.

1. Sablon blanc.

*Arena quartzosa.*

2. Sablon jaune.

*Glarea sterilis.*

3. Gravier.

*Arena inæqualis.*

#### GENRE II.

Sables métalliques.

*Arenæ metallicæ.*

b

## E S P E C E S.

1. Sable d'étain. *Arena stannea.*
2. Sable ferrugineux. *Arena ferrea.*
3. Sable cuivreux. *Arena cuprifera.*
4. Sable aurifère. *Arena aurea.*

## SECTION II.

Terres calcaires. *Terræ calcarea.*

## G E N R E I.

Craie. *Creta.*

## E S P E C E S.

1. Craie blanche. *Creta cohærens solida.*
2. Craie d'un blanc sale. *Creta fragilior.*
3. Craie jaune. *Creta flavescens.*
4. Craie rouge. *Creta rubra.*
5. Craie verte. *Creta viridis.*
6. Craie noire. *Creta nigra.*

## G E N R E II.

Falun. *Arena conchacea.*

## E S P E C E S.

1. Terre coquillière. *Humus animalis, non terrificæ.*

## G E N R E III.

Marne. *Marga.*

## E S P E C E S.

1. Marne blanche. *Glischo-Marga.*
2. Marne grise. *Leucargilla cinerea.*
3. Marne jaune. *Marga giallotina.*
4. Marne rouge. *Capnumargos.*
5. Marne brune. *Marga fusca.*
6. Marne noire. *Marga nigrescens.*

7. Marne bleuâtre. *Marga cœrulescens.*  
 8. Marne verte. *Marga viridescens.*

## SECTION III.

Terres argilleuses. *Terræ argillaceæ.*

GENRE I.

Terres argilleuses ductiles. *Terræ glutinosæ.*

ESPECES.

1. Argille blanche. *Argilla alba.*  
 2. Argille grise. *Bolus cinerea.*  
 3. Argille jaune. *Bolus flava.*  
 4. Argille d'un rouge pâle. *Bolus colore carneo.*  
 5. Argille rouge. *Bolus rubra.*  
 6. Argille bleue. *Argilla cœrulescens.*  
 7. Argille verte. *Argilla viridescens.*  
 8. Argille noire. *Bolus nigra.*  
 9. Argille marbrée. *Argilla variegata.*

GENRE II.

Argilles non ductiles. *Terræ argillaceæ siccaæ.*

ESPECES.

1. Argille à foulon. *Argilla fissilis.*  
 2. Tripoli rouge. *Tripela rubra.*  
 3. Tripoli gris. *Tripela alba.*  
 4. Tripoli noir. *Tripela nigra.*  
 5. Pierre pourrie. *Argilla farinacea.*

## SECTION IV.

Terres composées. *Terræ compositaæ.*

GENRE I.

Terres composées minérales. *Ochræ.*

## ESPECES.

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ochre jaune.        | <i>Ochra lutea.</i>         |
| 2. Ochre rouge.        | <i>Humus rubra.</i>         |
| 3. Terre d'Angleterre. | <i>Humus rubra obscura.</i> |
| 4. Sanguine.           | <i>Creta rubens fusca.</i>  |
| 5. Ochre verte.        | <i>Ochra viridis.</i>       |
| 6. Terre d'ombre.      | <i>Humus brunea.</i>        |
| 7. Terre noire.        | <i>Humus nigra.</i>         |

## GENRE II.

Terres composées végétales. *Terræ compositæ vegetabiles.*

## ESPECES.

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 1. Terreau. | <i>Humus communis atra.</i> |
| 2. Tourbe.  | <i>Humus fibrosa.</i>       |

## GENRE III.

Terres composées animales. *Terræ compositæ animales.*

## CLASSE II.

**P**IERRES.

**L**APIDES.

## SECTION I.

Pierres vitreuses. *Lapides vitrei.*

## GENRE I.

Grais.

*Cos.*

## ESPECES.

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Graïs blanc. | <i>Cos cinerea.</i>   |
| 2. Graïs rouge. | <i>Cos rubra.</i>     |
| 3. Graïs brun.  | <i>Cos fusca.</i>     |
| 4. Graïs veiné. | <i>Cos variegata.</i> |

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Grais à filtrer.           | <i>Cos aquam transmittens.</i> |
| 6. Grais des Rémou-<br>leurs. | <i>Cos coticularis.</i>        |
| 7. Grais de Turquie.          | <i>Cos indurabilis.</i>        |
| 8. Grais carrié.              | <i>Quartzum molare.</i>        |

## GENRE II.

Caillou. *Silex.*

## ESPECES.

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Caillou gris.     | <i>Silex mollior.</i>            |
| 2. Caillou noir.     | <i>Silex igniarius.</i>          |
| 3. Caillou d'Egypte. | <i>Silex fuscus.</i>             |
| 4. Jaspe rouge.      | <i>Jaspis rubra.</i>             |
| 5. Jaspe gris.       | <i>Jaspis grisea.</i>            |
| 6. Jaspe jaune.      | <i>Jaspis flava.</i>             |
| 7. Jaspe verd.       | <i>Jaspis viridis.</i>           |
| 8. Jaspe sanguin.    | <i>Jaspis variegata viridis.</i> |
| 9. Pierre de corne.  | <i>Silex corneus.</i>            |
| 10. Agate orientale. | <i>Achates aquea.</i>            |
| 11. Cornaline.       | <i>Achates rubescens.</i>        |
| 12. Sardoine.        | <i>Sardonyx.</i>                 |
| 13. Calcédoine.      | <i>Achates nebulosa.</i>         |
| 14. Agate.           | <i>Achates variegata.</i>        |
| 15. Agate onyce.     | <i>Onyx.</i>                     |
| 16. Agate figurée.   | <i>Achates figurata.</i>         |
| 17. Chatoyante.      | <i>Lapis mutabilis.</i>          |
| 18. Aventurine.      | <i>Silex punctis distinctus.</i> |
| 19. Opale.           | <i>Achates mutans.</i>           |

## GENRE III.

Pierres quartzes. *Lapides quartzosi.*

## ESPECES.

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Quartz laiteux.     | <i>Quartzum opacum.</i>         |
| 2. Quartz transparent. | <i>Quartzum pellucidum.</i>     |
| 3. Crystal de roche.   | <i>Crystallus non colorata.</i> |

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 4. Quartz jaune.                | <i>Quartzum flavum.</i>       |
| 5. Quartz jaune verdâtre.       | <i>Quartzum virescens.</i>    |
| 6. Quartz verd.                 | <i>Quartzum viride.</i>       |
| 7. Quartz d'un verd bleuâtre.   | <i>Quartzum cyaneum.</i>      |
| 8. Quartz bleu.                 | <i>Quartzum cœruleum.</i>     |
| 9. Quartz rouge.                | <i>Quartzum rubrum.</i>       |
| 10. Quartz violet.              | <i>Quartzum violaceum.</i>    |
| 11. Quartz d'un rouge jaunâtre. | <i>Quartzum hyacinthinum.</i> |
| 12. Quartz d'un rouge obscur.   | <i>Quartzum fuscum.</i>       |
| 13. Quartz noir.                | <i>Quartzum nigrum.</i>       |

## GENRE IV.

Pierres précieuses. *Gemmae.*

## ESPECES.

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 1. Diamant.      | <i>Adamas.</i>           |
| 2. Saphir.       | <i>Saphirus.</i>         |
| 3. Aigue marine. | <i>Beryllus.</i>         |
| 4. Émeraude.     | <i>Smaragdus.</i>        |
| 5. Chrysolite.   | <i>Chrysolitus.</i>      |
| 6. Topase.       | <i>Topasius.</i>         |
| 7. Hyacinthe.    | <i>Hyacinthus.</i>       |
| 8. Rubis.        | <i>Rubinus.</i>          |
| 9. Grenat.       | <i>Granatus.</i>         |
| 10. Améthyste.   | <i>Amethystus.</i>       |
| 11. Tourmaline.  | <i>Lapis electricus.</i> |

## SECTION II.

Pierres calcaires. *Lapides calcarei.*

## GENRE I.

Pierres à chaux. *Lapis calcareus.*



## E S P E C E S.

1. Pierre à chaux *Lapis calcareus albus*,  
blanche.
2. Pierre à chaux *Lapis calcareus griseus*,  
grise.
3. Pierre à chaux *Lapis calcareus fuscus*,  
jaune.
4. Pierre à chaux *Lapis calcareus rubens*,  
rouge.
5. Pierre à chaux *Lapis calcareus viridis*,  
verte.
6. Pierre à chaux *Lapis calcareus niger*,  
noire.
7. Pierre à chaux *Lapis calcareus veno-*  
*sus*,  
veinée.

## G E N R E II.

Marbre.

Marmor.

## E S P E C E S.

1. Marbre blanc. *Marmor album*.
2. Marbre blanc va- *Marmor variegatum al-*  
rié. *bum*.
3. Marbre gris. *Marmor venetum*.
4. Marbre gris varié. *Marmor variegatum ve-*  
*netum*.
5. Marbre jaune. *Marmor flavum*.
6. Marbre jaune va- *Marmor variegatum fla-*  
rié. *vum*.
7. Marbre brun. *Marmor lividum*.
8. Marbre brun varié. *Marmor variegatum li-*  
*vidum*.
9. Marbre rouge. *Marmor rubrum*.
10. Marbre-rouge va- *Marmor variegatum ru-*  
rié. *brum*.
11. Marbre violet. *Marmor violaceum*.

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 12. Marbre violet va-  | <i>Marmor violaceum va-</i>    |
| rié.                   | <i>riegatum.</i>               |
| 13. Marbre bleu.       | <i>Marmor cœruleum.</i>        |
| 14. Marbre bleu varié. | <i>Marmor variegatum cœ-</i>   |
|                        | <i>ruleum.</i>                 |
| 15. Marbre verd.       | <i>Marmor viride.</i>          |
| 16. Marbre verd varié. | <i>Marmor variegatum vi-</i>   |
|                        | <i>ride.</i>                   |
| 17. Marbre noir.       | <i>Marmor nigrum.</i>          |
| 18. Marbre noir varié. | <i>Marmor variegatum ni-</i>   |
|                        | <i>grum.</i>                   |
| 19. Breche blanche.    | <i>Marmor particulis spar-</i> |
|                        | <i>sis album.</i>              |
| 20. Breche grise.      | <i>Marmor particulis spar-</i> |
|                        | <i>sis cinereum.</i>           |
| 21. Breche jaune.      | <i>Marmor particulis spar-</i> |
|                        | <i>sis flavum.</i>             |
| 22. Breche violette.   | <i>Marmor particulis spar-</i> |
|                        | <i>sis violaceum.</i>          |
| 23. Breche verte.      | <i>Marmor particulis spar-</i> |
|                        | <i>sis viride.</i>             |
| 24. Lumachelle grise.  | <i>Marmor crustaceum ci-</i>   |
|                        | <i>nereum.</i>                 |
| 25. Lumachelle jaune.  | <i>Marmor crustaceum fla-</i>  |
|                        | <i>vum.</i>                    |
| 26. Lumachelle rou-    | <i>Marmor crustaceum ru-</i>   |
| ge.                    | <i>brum.</i>                   |
| 27. Lumachelle verte.  | <i>Marmor crustaceum vi-</i>   |
|                        | <i>ride.</i>                   |
| 28. Lumachelle noire.  | <i>Marmor crustaceum ni-</i>   |
|                        | <i>grum.</i>                   |
| 29. Marbre figuré de   | <i>Marmor figuratum Haf-</i>   |
| Hesse.                 | <i>siacum.</i>                 |
| 30. Marbre figuré de   | <i>Marmor figuratum Flo-</i>   |
| Florence.              | <i>rentinum.</i>               |

## G E N R E III.

Spath.

*Spatum.*

## E S P E C E S.

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Spath transparent. | <i>Spatum pellucidum.</i> |
| 2. Spath laiteux.     | <i>Spatum album.</i>      |
| 3. Spath jaune.       | <i>Spatum flavescens.</i> |
| 4. Spath rougeâtre.   | <i>Spatum rubrum.</i>     |
| 5. Spath verd.        | <i>Spatum viride.</i>     |
| 6. Spath noirâtre.    | <i>Spatum nigricans.</i>  |

## G E N R E IV.

Pierres calcaires for- *Pori aquei.*  
mées par l'eau.

## E S P E C E S.

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Stalactite transpa-<br>rente. | <i>Stalactites pellucidus.</i> |
| 2. Stalactite blanche.           | <i>Stalactites albus.</i>      |
| 3. Stalactite grise.             | <i>Stalactites griseus.</i>    |
| 4. Stalactite jaune.             | <i>Stalactites flavus.</i>     |
| 5. Stalactite rouge.             | <i>Stalactites ruber.</i>      |
| 6. Incrustation.                 | <i>Porus crustaceus.</i>       |
| 7. Tuf.                          | <i>Tophus.</i>                 |

## S E C T I O N III.

Pierres argilleuses. *Petræ argillaceæ.*

## G E N R E I.

Pierre ollaire. *Lapis ollaris.*

## E S P E C E S.

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Pierre de lard. | <i>Lardites.</i>          |
| 2. Jade.           | <i>Lapis nephreticus.</i> |
| 3. Serpentine.     | <i>Ollaris griseus.</i>   |

## G E N R E II.

Stéatite. *Ollaris mollior.*

## E S P E C I E S.

1. Craie de Briançon *Creta Briançonia alba*,  
blanche.
2. Craie de Briançon *Creta Briançonia viri-*  
verte. *dis.*
3. Stéatite marbrée. *Steatites variegata.*
4. Stéatite noire. *Steatites nigra.*
5. Molybdène. *Molybdænum.*

## G E N R E III.

Schistes.

*Schisti.*

## E S P E C I E S.

1. Ampélite. *Ampelites.*
2. Schiste gris. *Fissilis cinereus.*
3. Schiste rouge. *Schistus ruber.*
4. Schiste verd. *Schistus viridis.*
5. Ardoise. *Fissilis cœrulescens.*
6. Schiste noir. *Schistus ater.*
7. Pierre naxienne. *Fissilis lamellis cras-*  
*sioribus.*

## G E N R E IV.

Talc.

*Talcum.*

## E S P E C I E S.

1. Talc blanc. *Talcum albicans.*
2. Talc jaune. *Talcum luteum.*
3. Talc verd. *Talcum viride.*
4. Talc rouge. *Talcum rubrum.*
5. Talc noir. *Talcum nigrum.*

## G E N R E V.

Amiante.

*Amiantus.*

## E S P E C I E S.

1. Lin fossile. *Amiantus mollis.*
2. Amiante non mûre. *Amiantus rigidus.*
3. Asbeste mûre. *Asbestus mollis.*

4. Asbeste non mûre. *Asbestus durus.*  
 5. Cuir de montagne. *Corium montanum.*  
 6. Liège fossile. *Suber montanum.*

## GENRE VI.

Zéolite. *Zeolitus.*

## ESPECES.

1. Zéolite blanche. *Zeolitus albus.*  
 2. Zéolite verte. *Zeolitus viridis.*

## SECTION IV.

Pierres de roche. *Saxa.*

## GENRE I.

Pierre de roche. *Petro-filix.*

## ESPECES.

1. Pierre de roche *Petro-filix semipellucidus.*  
 blanche.  
 2. Pierre de roche *Petro-filix flavus.*  
 jaune.  
 3. Pierre de roche *Petro-filix rubescens.*  
 rouge.  
 4. Pierre de roche *Petro-filix fuscus.*  
 brune.  
 5. Pierre de roche *Petro-filix viridis.*  
 verte.  
 6. Pierre de roche *Petro-filix niger.*  
 noire.  
 7. Pierre de roche *Petro-filix venosus.*  
 veinée.

## GENRE II.

Feldt-spath. *Spatum scintillans.*

## E S P E C E S.

1. Feldt-spath blanc. *Spatum pyrimachum album.*
2. Feldt-spath gris. *Spatum pyrimachum cinereum.*
3. Feldt-spath rougeâtre. *Spatum pyrimachum rubrum.*

## G E N R E III.

Trapp. *Corneus solidus.*

## E S P E C E S.

1. Trapp gris. *Trapp cinereus.*
2. Trapp verd. *Trapp viridis.*
3. Trapp noir. *Trapp niger.*

## G E N R E IV.

Pierre d'azur. *Lapis lazuli.*

## E S P E C E S.

1. Pierre d'azur. *Lapis lazuli.*
2. Pierre d'Arménie. *Lapis lazuli punctulis albis.*

## G E N R E V.

Schorl. *Corneus crystallifatus.*

## E S P E C E S.

1. Schorl rougeâtre. *Corneus crystallifatus ruber.*
2. Schorl verd. *Corneus crystallifatus viridis.*

## G E N R E VI.

Porphyre. *Porphy.*

## E S P E C E S.

2. Porphyre rouge. *Porphy rubens.*
1. Ecaille de mer. *Porphyr absque maculis.*

3. Porphyre verd. *Porphyr viride.*  
 4. Porphyre verd tacheté de blanc. *Ollaris virescens.*  
 5. Porphyre noir. *Porphyr nigrum.*

## GENRE VII.

Granit. *Saxum simplex.*

## ESPECES.

1. Granit gris. *Saxum griseum.*  
 2. Granit rouge. *Saxum rufescens.*  
 3. Granit noir. *Saxum nigrum.*

## GENRE VIII.

Pudding. *Saxum arenaceo filiceum.*

## CLASSE III.

SOUFRE. *SULPHUR.*

## GENRE I.

Soufre natif. *Sulphur nativum.*

## ESPECES.

1. Soufre en fleurs. *Sulphur pulverulentum.*  
 2. Soufre transparent. *Sulphur pellucidum,*  
 3. Soufre mêlé à de la terre. *Sulphur terræ mixtum.*

## CLASSE IV.

SELS. *SALIA.*

## SECTION I.

Sels simples. *Salia simplicia.*

## GENRE I.

Sels acides. *Salia acida.*

## ESPECES.

1. Acide vitriolique. *Acidum vitriolicum.*
2. Acide nitreux. *Acidum nitrosum.*
3. Acide marin. *Acidum marinum.*
4. Acide sulfureux. *Acidum catholicum tenuius.*

## GENRE II.

Sels alkalis. *Salia alkalina.*

## ESPECES.

1. Alkali déliquescent. *Alkali deliquescent.*
2. Alkali marin. *Alkali marinum.*
3. Borax. *Borax.*
4. Alkali volatil. *Alkali volatile.*

## SECTION II.

Sels neutres. *Salia neutra.*

## GENRE I.

Sels neutres parfaits. *Salia neutra fixa.*

## ESPECES.

1. Tartre vitriolé. *Tartarus vitriolatus.*
2. Sel de Glauber. *Sal glaubermanum.*
3. Nitre. *Nitrum.*
4. Nitre cubique. *Nitrum cubicum.*
5. Sel fébrifuge. *Sal febrifugum.*
6. Sel marin. *Sal marinum.*
7. Sel sulfureux. *Sal sulfureum.*
8. Sel sulfureux marin. *Sal sulfureum marinum.*



## GENRE II.

Sels ammoniacaux. *Salia ammoniacalia.*

## ESPECES.

1. Sel ammoniacal vi- *Sal ammoniacale vi-*  
triolique. *triolicum.*
2. Sel ammoniacal ni- *Sal ammoniacale nitro-*  
treux. *sum.*
3. Sel ammoniac. *Sal ammoniacum.*
4. Sel ammoniacal sul- *Sal ammoniacale sul-*  
fureux. *fureum.*

## GENRE III.

Sels neutres terreux. *Salia neutra terrea.*

## ESPECES.

1. Vitriol de sable. *Vitriolum arenosum.*
2. Nitre de sable. *Nitrum arenosum.*
3. Sel de sable. *Sal arenosum.*
4. Sélénite. *Selenites.*
5. Nitre de craie. *Nitrum cretaceum.*
6. Sel de craie. *Sal cretaceum.*
7. Alun. *Alumen.*
8. Nitre d'argille. *Nitrum argillaceum.*
9. Sel d'argille. *Sal argillaceum.*

## CLASSE V.

**D**EMI-MÉTAUX. *SEMI-METALLA.*

## SECTION I.

Demi-métaux cassans. *Semi-metalla fragilia.*

## GENRE I.

Arsenic. *Arsenicum.*

## ESPECES.

1. Arsenic blanc. *Arsenicum mineralisatum album.*
2. Arsenic gris. *Arsenicum testaceum.*
3. Arsenic noir. *Arsenicum nigrum.*
4. Arsenic en chaux. *Arsenicum nativum.*
5. Orpiment. *Auri pigmentum.*
6. Réalgar. *Risigalum.*

## GENRE II.

Cobalt ou Cobolt. *Cobaltum.*

## ESPECES.

1. Cobalt cendré. *Cobaltum cinereum.*
2. Cobalt noir. *Cobaltum nigrum.*
3. Cobalt en fleurs. *Cobaltum efflorescens.*

## GENRE III.

Bismuth. *Wismuthum.*

## ESPECES.

1. Bismuth natif. *Wismuthum nativum.*
2. Bismuth gris. *Wismuthum albo flavescens.*
3. Bismuth bleuâtre. *Wismuthum nitens.*

## GENRE IV.

Antimoine. *Stibium.*

## ESPECES.

1. Régule d'antimoine *Regulus nativus.*  
natif.
2. Mine d'antimoine *Stibium cinereum.*  
grise.
3. Mine d'antimoine *Stibium rubrum.*  
rouge.

## GENRE V.

Nickel. *Nickel.*

## SECTION II.

Demi-métaux qui ont *Semi-metalla minus fra-*  
une sorte de ducti- *gilia.*  
lité.

## GENRE I.

Zinc.

*Zincum.*

## ESPECES.

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Zinc natif.         | <i>Zincum nudum.</i>         |
| 2. Mine de zinc.       | <i>Zincum mineralisatum.</i> |
| 3. Manganèse.          | <i>Magnesia.</i>             |
| 4. Blende.             | <i>Pseudo-galena.</i>        |
| 5. Pierre calaminaire. | <i>Lapis calaminaris.</i>    |
| 6. Vitriol de zinc.    | <i>Vitriolum album.</i>      |

## GENRE II.

Mercure.

*Hydrargyrum.*

## ESPECES.

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Mercure natif.            | <i>Hydrargyrum nativum.</i>  |
| 2. Cinnabre.                 | <i>Cinnabaris.</i>           |
| 3. Mine de mercure<br>grife. | <i>Hydrargyrum petrosum.</i> |

## CLASSE VI.

MÉTALX.

*METALLA.*

## SECTION I.

Métaux imparfaits. *Metalla imperfecta.*

## GENRE I.

Plomb.

*Plumbum.*

## E S P E C E S.

1. Plomb natif. *Plumbum nativum.*
2. Galène. *Galena.*
3. Mine de plomb blanche. *Plumbum spatiforme.*
4. Mine de plomb d'un rouge noirâtre. *Plumbum atro - purpurascens.*
5. Mine de plomb rouge. *Plumbum rubrum.*
6. Mine de plomb verte. *Plumbum viride.*
7. Mine de plomb terreuse. *Plumbum terreum.*

## G E N R E II.

Etain. *Stannum.*

## E S P E C E S.

1. Crystaux d'étain blancs. *CrySTALLI stanni albescentes.*
2. Crystaux d'étain jaunâtres. *CrySTALLI stanni aureæ.*
3. Crystaux d'étain noirs. *CrySTALLI stanni nigræ.*

## G E N R E III.

Fer. *Ferrum.*

## E S P E C E S.

1. Fer natif. *Ferrum nativum.*
2. Mine de fer noire. *Ferrum nigrum.*
3. Mine de fer grise. *Ferrum cinereum.*
4. Hématite. *Hæmatites.*
5. Mine de fer cha- *Ferrum crystallisatum.*  
toyante.
6. Mine de fer limon- *Ferrum argillaceum.*  
neuse.

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 7. Wolfram.             | <i>Ferrum arsenicale.</i>  |
| 8. Mine de fer blanche. | <i>Ferrum album.</i>       |
| 9. Aiman.               | <i>Magnes.</i>             |
| 10. Emeril.             | <i>Smirris.</i>            |
| 11. Pyrite sulfureuse.  | <i>Pyrites flavescens.</i> |
| 12. Pyrite arsenicale.  | <i>Pyrites albicans.</i>   |
| 13. Vitriol martial.    | <i>Vitriolum Martis.</i>   |

## GENRE IV.

Cuivre. *Cuprum.*

## ESPECES.

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Cuivre natif.             | <i>Cuprum nativum.</i>           |
| 2. Mine de cuivre jaune.     | <i>Pyrites flavus.</i>           |
| 3. Mine de cuivre azurée.    | <i>Cuprum minerâ nitente.</i>    |
| 4. Mine de cuivre hépatique. | <i>Cuprum minerâ pyriticoſa.</i> |
| 5. Mine de cuivre grise.     | <i>Cuprum cinereum.</i>          |
| 6. Mine de cuivre rouge.     | <i>Cuprum rubrum.</i>            |
| 7. Mine de cuivre terreuse.  | <i>Cuprum terreum.</i>           |
| 8. Verd de montagne.         | <i>Cuprum viride.</i>            |
| 9. Bleu de montagne.         | <i>Cuprum cœruleum.</i>          |
| 10. Mine de cuivre foyeuſe.  | <i>Ærugo nativa.</i>             |
| 11. Malachite.               | <i>Ærugo nativa ſolida.</i>      |
| 12. Vitriol de cuivre.       | <i>Vitriolum cœruleum.</i>       |

## SECTION II.

Métaux parfaits. *Metalla perfecta.*

## GENRE I.

Argent. *Argentum.*

## ESPECES.

1. Argent natif. *Argentum nativum.*
2. Mine d'argent grise. *Argentum cinereum.*
3. Mine d'argent vitreuse. *Argentum vitreum.*
4. Mine d'argent en plumes. *Argentum plumosum.*
5. Mine d'argent rouge. *Argentum rubrum.*
6. Mine d'argent noire. *Argentum fuligineum.*
7. Mine d'argent cor-  
née. *Argentum semi-pellucidum.*

## GENRE II.

Or. *Aurum.*

## ESPECE.

Or natif. *Aurum nativum.*

## GENRE III.

Platine. *Platinum.*

## CLASSE VII.

**B**ITUMES.*B*ITUMINA.

## SECTION I.

Bitumes solides. *Bitumina solida.*

## GENRE I.

Ambre gris. *Ambra grisea.*

## ESPECES.

1. Ambre gris. *Ambra variegata.*
2. Ambre blanc. *Ambra alba.*
3. Ambre noir. *Ambra nigra.*

## GENRE II.

Succin. *Succinum.*

## ESPECES.

1. Succin transparent. *Succinum pellucidum.*
2. Succin blanc. *Succinum album.*
3. Succin jaune. *Succinum fuscum.*

## GENRE III.

Asphalte. *Asphaltum.*

## GENRE IV.

Jayet. *Gagates.*

## GENRE V.

Charbon de terre. *Litanthrax.*

## SECTION II.

Bitumes fluides. *Bitumina fluida.*

## GENRE I.

Pétrol. *Petroleum.*

## ESPECES.

1. Pétrol blanc. *Naptha.*
2. Pétrol brun. *Petroleum.*
3. Pissasphalte. *Pissalphaltum.*

## PREMIER SUPPLÉMENT

à la Minéralogie.

*Minéraux altérés par le feu des  
volcans.*

- |      |                       |   |                              |
|------|-----------------------|---|------------------------------|
| 1. C | Harbon fossile.       | C | Arbo fossilis.               |
| 2.   | Soufre sublimé.       |   | Sulphur sublimatum.          |
| 3.   | Sel ammoniac sublimé. |   | Sal ammoniacum sublimatum.   |
| 4.   | Rapillo.              |   | Cineres conglomeratæ griseæ. |
| 5.   | Pozzolane.            |   | Pozzolana.                   |
| 6.   | Ponce.                |   | Pumex.                       |
| 7.   | Lave poreuse.         |   | Lava porosa.                 |
| 8.   | Lave compacte.        |   | Lava solida.                 |
| 9.   | Verre de Naples.      |   | Vitrum Neapolitanum.         |





## SECOND SUPPLÉMENT

à la Minéralogie.

### EAUX MINÉRALES.

#### ORDRE I.

Eaux terreuses. *Aquæ topheæ.*

#### ORDRE II.

Eaux sulfureuses. *Aquæ sulfureæ.*

#### ESPECES.

1. Eau dont on tire du soufre. *Aqua sulfurea sulfur suppeditans.*
2. Eau dont on ne tire pas de soufre. *Aqua sulfurea sulfur non suppeditans.*

#### ORDRE III.

Eaux salées. *Aquæ salinæ.*

#### ESPECES.

1. Eau alkaline. *Aqua alkalina.*
2. Eau alkaline marine. *Aqua alkalina marina.*
3. Eau chargée de sel de Glauber. *Aqua salina Glauberiana.*
4. Eau chargée de sel d'Epsom. *Aqua salina Epsomensis.*
5. Eau alumineuse. *Aqua aluminosa.*

## ORDRE IV.

Eaux métalliques. *Aquæ metallicaæ.*

## ESPECES.

1. Eau martiale. *Aqua ferruginea simplex.*
2. Eau vitriolique ferrugineuse. *Aqua vitriolica martialis.*
3. Eau vitriolique cuivreuse. *Aqua vitriolica cuprosa.*
4. Eau vitriolique de zinc. *Aqua zinci vitriolica.*

## ORDRE V.

Eaux bitumineuses. *Aquæ bituminosæ.*



# DISCOURS

## PRÉLIMINAIRE.

CONNOÎTRE les différens corps qui composent le Globe terrestre, ou qui couvrent sa surface ; saisir les rapports qu'ils ont entr'eux, & avec nous ; voir les différences qui les caractérisent ; développer, s'il se peut, la nature de leurs principes, & les loix de leur formation, pour les appliquer plus sûrement à nos besoins : voilà l'objet de l'*Histoire Naturelle*. Elle comprend la Physique générale & particulière, les Mathématiques, la Chymie, la Médecine même, qui n'est que l'histoire de l'homme sain ou malade, & des différens corps qui ont rapport à lui.

Par cet exposé des différentes branches de l'*Histoire Naturelle*, on voit com-

Tome I,

A

bien cette science est immense, lorsqu'on la prend dans sa plus grande étendue, & combien elle doit le paroître davantage, lorsqu'on la suit dans ses détails : une seule partie de l'Histoire de la Nature suffit pour occuper la vie de plusieurs Savans, & ce n'est qu'en se bornant ainsi, qu'on est parvenu à dévoiler quelques-uns de ses mystères. Les Physiciens se sont occupés du soin de connoître les propriétés générales de la matière, & les phénomènes les plus apparens que présentent certains corps. Les Naturalistes se sont attachés à décrire chacune des substances qui font partie de ce vaste Univers, & à imaginer sur leur origine des systêmes brillans. Les Chymistes enfin, en les analysant, nous ont instruit sur leur nature & sur leurs propriétés : mais malgré les travaux multipliés, & les efforts réunis de ces grands hommes, qui ont cherché à éclairer chacune des branches de l'*Histoire Naturelle*, ils n'ont encore pu nous donner que quelques

notions bien légères, lorsque nous les comparons à la quantité prodigieuse de connoissances qui nous restent encore à acquérir. Cependant, cette difficulté de parvenir au faite de la science, ne sauroit nous décourager : nous désirons réunir tout ce que chacun de ces hommes illustres a embrassé ; & sans croire nos forces supérieures aux leurs, un desir invincible de profiter de leurs découvertes, nous anime. L'espoir de reculer les bornes de la science, est un motif assez puissant pour nous faire entrer dans cette carrière, quelque pénible qu'elle soit ; & ce n'est qu'à regret, & dans l'impossibilité de connoître à fond toute l'*Histoire Naturelle*, que nous nous bornons à une de ses branches. Le moyen d'y acquérir des connoissances très-exactes, seroit peut-être d'examiner les êtres qui nous environnent, à mesure qu'ils s'offrent à nos yeux, ou de les faire passer en revue dans l'ordre de leurs rapports avec nous ; mais cette étude est longue &

pénible ; c'est celle de toute la vie ; elle exige d'ailleurs un génie vaste, capable de retenir une infinité de faits détachés, & de les lier ensuite, pour en former un ensemble : elle demande en un mot, un homme tel que M. de Buffon, & la nature en est avare.

Les Méthodistes nous fraient une route plus courte & plus facile à parcourir ; ils rangent tous les corps naturels sous un certain nombre de divisions, dont les caractères sont faciles à retenir ; & ce n'est qu'après nous avoir présenté des masses générales, qu'ils nous font entrer dans des détails plus circonstanciés. La première division qu'ils font des corps de la nature, est en trois règnes : le premier comprend les minéraux, qui n'ont ni la vie ni le mouvement ; le second, les végétaux, qui ont la vie & le mouvement ; dans le troisième enfin, sont renfermés les animaux, qui ont avec la vie, le mouvement & le sentiment. Quoique chacun des corps qui se trouvent dans un règne, n'en

ait pas les caractères dans un degré également marqué, tous les Naturalistes néanmoins ont admis cette distinction : il n'en est pas ainsi des divisions secondaires ; comme les caractères qui servent à les faire reconnoître, sont moins marqués, tous les Auteurs n'ont pas suivi les mêmes. On rencontre cependant parmi les plantes & les animaux, des êtres qui ont tant de rapport les uns avec les autres, qu'on ne peut s'empêcher de les reconnoître, comme faisant des familles naturelles ; & quel que soit le caractère qui sert à les désigner dans les différentes méthodes des Naturalistes, on trouve toujours réunis les individus d'une même famille. A l'égard des matières fossiles que la terre renferme dans son sein, elles sont tellement mêlées les unes avec les autres, qu'il est souvent très-difficile de décider quelle est celle qui domine dans un échantillon, sur-tout lorsqu'on n'a pour guide dans ses recherches que des caractères aussi variables que ceux des

formes & des couleurs : il ne faut pas pourtant négliger ces caractères , ils doivent concourir , autant qu'il est possible , avec ceux que nous donne un examen plus approfondi : la forme , par exemple , est un indice assez sûr pour nous faire distinguer une mine de plomb blanche d'avec une mine de fer de la même couleur ; mais les cas pareils sont rares , & l'œil le mieux exercé ne sauroit nous éclairer , autant sur la nature des substances minérales , que le peut faire une analyse faite avec les précautions qu'indique la Chymie.

### *De l'Analyse Chymique.*

La Chymie est la science qui apprend à connoître la nature & les propriétés des corps. Elle y parvient en séparant les parties qui les constituent pour les examiner chacune séparément : elle les unit ensuite entr'elles ou avec d'autres corps , pour reconnoître quelles sont les loix de leurs combinaisons , & s'efforce de reproduire des substances



semblables aux premières, ou de nouvelles que la nature n'avoit pas faites.

Les noms d'*Analyse* & de *Synthèse* sont synonymes en Chymie à ceux de décomposition & de récomposition.

On ne peut faire un pas dans l'*Analyse* Chymique, sans connoître une des propriétés fondamentales de la matière, que les Chymistes ont nommé *affinité*.

Ils entendent par *affinité*, la force avec laquelle les parties d'un corps homogène adhèrent entr'elles, & celle qui tend à unir deux substances de nature différente; c'est ce qui a engagé M. Macquer à distinguer deux sortes d'*affinités*. Il appelle *affinité d'aggrégation* celle qui a lieu, par exemple, entre deux molécules d'huile ou de mercure, qui, roulant sur un même plan, viennent à se rencontrer & à se confondre.

L'*affinité de composition* est celle qui unit les parties de deux corps différens pour n'en former qu'une seule substance.

L'opinion la plus généralement adoptée, est que cette *affinité* dépend de ce

que les corps qui s'unissent , sont composés de principes homogènes : elle se mesure plutôt par l'adhérence de ces corps après leur union , que par la facilité avec laquelle ils s'unissent ; on en peut prendre un exemple dans la manière dont les acides nitreux & marins agissent sur le mercure : le premier dissout beaucoup plus facilement ce demi-métal , quoiqu'il ait avec lui une affinité moindre que n'en a l'acide marin , qui peut décomposer le nitre mercuriel.

La première & la plus simple des affinités de composition a lieu entre deux corps , comme entre l'eau-forte & le fer qu'elle dissout : la seconde est celle de trois ou de quatre , qui ont une égale disposition à s'unir entr'eux , comme des métaux qu'on mêle ensemble par la fusion.

### *De la Dissolution.*

La Loi des affinités n'est jamais plus sensible que dans les dissolutions.

Une dissolution est une opération

chymique dans laquelle un corps en pénètre un autre, & se l'assimile de manière à ne former plus qu'un avec lui; cette action ne peut avoir lieu qu'un des deux ne soit fluide, de-là l'axiôme *corpora non agunt, nisi sint fluida*.

On appelle *dissolvans* ou *menstrues*, les substances qui peuvent dissoudre les corps qu'on leur présente, & on les distingue en simples & en composés.

Les dissolvans simples sont le feu & l'eau.

Le feu appliqué aux corps les pénètre, il les dilate; & cette dilatation portée au plus haut point, produit la désunion du corps chauffé, ou la fusion, qu'on peut regarder comme une sorte de dissolution ignée.

Cette propriété de se fondre n'existe que dans les substances, qui contiennent beaucoup du principe inflammable; car elle n'a lieu que très-difficilement dans les substances terreuses en général, & point du tout dans celles qu'on regarde comme les terres les plus

pures. Lorsque le feu, après avoir pénétré un corps, vient à s'en séparer, les parties de ce corps se réunissent, en vertu de leur affinité d'aggrégation, & la masse recouvre sa solidité, mais d'une manière lente, & qui permet à ces parties de s'appliquer par des surfaces égales, & avec d'autant plus de régularité, que le refroidissement a été plus lent : c'est une sorte de cristallisation qui se fait à l'aide du feu.

L'eau est encore un dissolvant simple, qui a de l'action sur plusieurs corps, qui en contiennent en abondance ; tels sont les sels, le foie de soufre, les matières mucilagineuses, &c.

On peut considérer l'eau dans deux états différens ; comme froide, depuis quelques degrés au-dessous du terme de sa congélation, jusqu'à trente ou trente-cinq degrés au thermomètre de M. de Réaumur ; & comme chaude, depuis ce terme, jusqu'à l'ébullition.

Tous les sels ne se dissolvent pas en

égale quantité dans l'eau ; ceux qui en contiennent beaucoup , & dont la texture est lâche , se laissent dissoudre avec la plus grande facilité ; mais ceux qui ont plus de densité , & qui retiennent moins de ce fluide , en exigent davantage pour être dissous.

On a plusieurs moyens de séparer les sels de l'eau qui les tient en dissolution. Premièrement , lorsque l'eau en a dissout une certaine quantité à l'aide de la chaleur , elle laisse précipiter cette quantité en se refroidissant ; & plus ce refroidissement est lent , plus le sel qui se précipite a le temps de s'arranger , & de prendre une forme régulière. Cet arrangement régulier des sels , qui forme des masses plus ou moins transparentes , se nomme *crystallisation* ; & toutes celles qui ont lieu pour les substances salines , plus dissolubles dans l'eau chaude que dans l'eau froide , ne suivent d'autre loi , pour arriver au point de perfection , que celle d'un refroidissement très-lent.

A l'égard des sels qui se dissolvent également bien dans l'eau froide & dans l'eau chaude, ils ne peuvent se crySTALLISER que par l'évaporation de l'eau qui les tient en dissolution, & la forme qu'ils prennent est d'autant plus régulière que cette évaporation se fait plus lentement.

Les substances salines qui attirent fortement l'humidité de l'air, doivent être évaporées très-rapidement & refroidies de même.

Toutes les crySTALLISATIONS se font dans des vaisseaux dont l'ouverture est large; on les nomme *capsules à crySTALLISER*, elles sont faites de grès ou de verre.

Les évaporations se font dans ces capsules ou dans des vaisseaux de verre, dont le fond a un diamètre égal à celui de l'ouverture, & on les nomme *évaporatoires*.

La précipitation offre un autre moyen de dégager les sels, de l'eau qui les tient en dissolution.

On entend par précipitation la sé-

paration d'un corps dissous d'avec celui qui le tenoit en dissolution, opérée par une troisième substance, qui a plus d'affinité avec l'un des deux corps, qu'ils n'en avoient ensemble : ainsi, par exemple, si on verse dans une dissolution de sel marin, un peu d'esprit-de-vin, qui a beaucoup plus d'affinité avec l'eau que n'en a le sel, celui-ci se précipite.

Les dissolvans qu'on nomme *composés*, sont le soufre, les sels, les matières demi-métalliques & métalliques, les huiles & les esprits ardents.

Le genre d'union qu'ils contractent avec les substances auxquelles ils s'unissent, est très-différent de celui qui a lieu entre un dissolvant simple & la matière qu'il dissout ; celui-ci n'est qu'interposé entre les parties du corps qu'il tient en dissolution, & ne change en rien ses propriétés : l'autre au contraire entre vraiment dans la combinaison : on le voit dans la dissolution du fer opérée par l'acide vitriolique ; l'une & l'autre de ces substances perdent tellement

leurs propriétés, qu'on ne retrouve plus après leur union, ni fer, ni acide, mais un composé des deux, nommé *vitriol martial* ou *couperose verte*.

Le soufre est une substance minérale, sèche & inflammable, qui s'unit très-bien par la fusion à la plupart des métaux & des demi-métaux, avec lesquels elle forme des mines métalliques : le grillage peut séparer le soufre ainsi uni à un métal ; on y parvient encore en présentant à ce composé, un corps qui ait une affinité plus grande avec le soufre ou le métal que ces deux matières n'en ont ensemble.

Les sels sont des corps qui ont de la faveur, & la propriété de se dissoudre dans l'eau ; ceux qui peuvent le plus ordinairement servir de menstrues, sont acides ou alkalis.

Les sels acides ont une faveur vive & brûlante ; lorsqu'ils sont étendus d'eau, elle paroît aigre : ils rougissent les teintures bleues des végétaux, comme de tournesol & de violettes : ils s'unissent



avec effervescence à la craie , aux pierres à chaux , aux sels alkalis & dissolvent les métaux. Il résulte de toutes ces dissolutions , des sels appelés *neutres* , qu'on peut obtenir sous forme sèche & crySTALLINE , en faisant évaporer l'eau dans laquelle l'acide étoit étendu , & qui après qu'il s'est combiné avec sa base , tient le nouveau sel neutre en dissolution : les règles de ces crySTALLISATIONS sont les mêmes que celles qu'on observe dans les crySTALLISATIONS en général.

Quoique les acides soient en état de dissoudre plusieurs substances , ils n'ont pas avec toutes le même degré d'affinité : M. Géoffroy avoit formé une table des différens rapports que les dissolvans ont avec les corps qui peuvent leur servir de base ; feu M. Rouelle fit quelques additions importantes à cette table : plusieurs Chymistes ont fait des tables d'affinités beaucoup plus détaillées , comme on peut le voir dans leurs ouvrages.

La table de M. Géoffroy , augmentée

par M. Rouelle, est écrite en caractères, & disposée par colonnes, placées à côté les unes des autres : à la tête de chaque colonne se trouve le dissolvant ou menstrue ; immédiatement au-dessous, la substance avec laquelle il a la plus grande affinité ; en descendant ainsi, la substance qui est le plus au-bas de la colonne, est celle qui a la moindre affinité avec le dissolvant.

On peut prendre un exemple simple de ces affinités dans la première colonne de la table. Le caractère qui est au haut est celui des acides ; le plus bas de cette même colonne est celui des matières métalliques : il résulte de ces deux corps un sel neutre, à base métallique, du vitriol martial, par exemple, composé de fer & d'acide vitriolique. Or, ce sel peut être décomposé par toutes les matières qui se trouvent entre la matière métallique & l'acide : ainsi, une terre absorbante, comme la craie ou l'eau de chaux, versée dans une dissolution de vitriol martial, s'unit  
à

à l'acide, & le fer se précipite. Après la précipitation du métal, l'eau tient en dissolution un sel neutre à base calcaire. L'alkali volatil, qui se trouve placé au-dessus des terres absorbantes, versé sur la dissolution de ce sel neutre, en dégage la terre en s'unissant à l'acide avec lequel il forme un sel ammoniac. Enfin, si dans cette dissolution de sel ammoniac, on ajoute un alkali fixe, l'alkali volatil se dégage, & l'acide se portant sur l'alkali fixe, en forme un sel neutre parfait.

Quoique dans la table on ne trouve aucun corps entre les acides & l'alkali fixe, il ne s'ensuit pas pour cela qu'on ne puisse rompre l'union de ces deux substances. Le principe que les Chymistes ont nommé *phlogistique*, suffit souvent pour opérer cette décomposition.

Elle peut aussi se faire en vertu des doubles affinités qu'on ne peut mieux entendre que par l'exemple suivant.

Le tartre vitriolé, qui est un sel neutre parfait, formé par l'acide vitrioli-

que, uni à l'alkali fixe, ne peut être décomposé par le mercure. Mais si on mêle une dissolution de ce métal dans l'eau-forte avec une dissolution de tartre vitriolé, les deux sels neutres sont décomposés réciproquement. L'acide nitreux quitte le mercure pour s'unir à l'alkali fixe, avec lequel il a plus d'affinité, & fait lâcher prise à l'acide vitriolique, qui n'auroit pas abandonné sa base alkaline, s'il ne trouvoit à côté de lui le mercure, auquel il peut s'unir; en sorte qu'on peut dire que la décomposition du tartre vitriolé, commencée par l'eau-forte, est achevée par le mercure.

Dans le nombre des affinités il y en a qui paroissent réciproques: le sel ammoniac, par exemple, composé d'un alkali volatil, uni à un acide, peut être décomposé par la craie; il résulte de cette décomposition, premièrement, l'alkali volatil, qui servoit de base à l'acide dans le sel ammoniac, & de plus un nouveau sel neutre, formé par l'u-

nion de l'acide à la craie. Si on verse dans la dissolution de ce nouveau sel le même alkali volatil qui a été dégagé par la craie, il s'unit à l'acide, & précipite la terre calcaire qui avoit d'abord servi à le séparer. Cette expérience, qui paroît contredire la loi reconnue des affinités, ne dépend que de la volatilité de la base du sel ammoniac, comme on peut s'en assurer par les phénomènes de la décomposition de ce sel.

Tous les acides peuvent être employés comme menstrues chymiques; on les distingue communément en acides minéraux, acides végétaux, & acides animaux.

Les acides minéraux sont quatre : savoir, l'acide vitriolique, l'acide nitreux, l'acide marin & l'acide sulfureux. ils ont tous les caractères communs assignés aux acides, & de plus des caractères particuliers qui servent à faire reconnoître chacun d'eux.

L'acide vitriolique n'a ni couleur, ni

odeur ; il est le plus fort des acides , c'est-à-dire , qu'il peut séparer tous les autres des bases auxquelles ils sont unis.

L'acide nitreux tient le second rang ; il a une odeur nauséabonde ; lorsqu'il est bien rapproché , il a une couleur d'un brun-rouge , & répand des vapeurs rouffes.

L'acide marin est le troisième ; sa couleur est jaunâtre ; il a une odeur moins désagréable que celle de l'acide nitreux ; lorsqu'il est bien concentre , il répand des vapeurs blanches.

L'acide sulfureux est le plus foible des acides minéraux ; il n'a point de couleur , mais il a une odeur vive & suffoquante.

Les acides végétaux sont de deux sortes ; les uns existent tout formés dans les plantes , comme les suc de groseilles & de limons ; les autres sont le produit de la fermentation , comme le vinaigre. On peut leur ajouter encore ceux qui étoient enveloppés dans les plantes , &

combinés avec d'autres principes, & que la Chymie en dégage par l'analyse.

Les acides ne se trouvent jamais dans le corps animal que dans l'état de combinaison ; ils sont tous dégagés, ou par la fermentation, ou par l'analyse chimique. Le plus puissant de tous est l'acide *phosphorique*.

En général, les acides, tant végétaux qu'animaux, sont moins forts que les acides minéraux ; ils sont tous plus ou moins masqués par une portion d'huile qui les affoiblit, & diminue leurs propriétés.

Les sels alkalis forment un autre ordre de menstrues salins ; on les reconnoît à leur saveur urineuse & piquante, à la propriété qu'ils ont de verdir le sirop de violettes, & à l'effervescence qu'ils font avec les acides. On distingue les alkalis en fixes & en volatils : les premiers n'ont point d'odeur ; les seconds en ont une très-vive.

Les sels neutres sont rarement fonction de menstrues, parceque leur ten-

dance à se combiner est ordinairement satisfaite ; cependant cela souffre exception dans plusieurs cas.

Les substances métalliques fondues, peuvent se servir de menstrues réciproquement , & on peut rompre leur union par l'intermède d'un corps qui ait plus d'affinité avec l'une des deux substances qu'elles n'en ont ensemble ; par exemple, si on plonge dans du mercure une combinaison de cuivre & d'or, le mercure s'unit à l'or & laisse le cuivre.

Les huiles sont des corps onctueux, inflammables , immiscibles à l'eau ; on les retire des végétaux , des animaux & des matières bitumineuses : elles contiennent abondamment le principe nommé *phlogistique* , & dissolvent très-facilement les substances qui contiennent ce même principe , sur-tout, lorsqu'il est dans l'état huileux. Le soufre minéral, certaines chaux métalliques , les matières bitumineuses, les résines des végétaux, sont très-dissolubles dans les huiles.



Les esprits ardens sont des liqueurs inflammables, qui ont une odeur forte, & peuvent se mêler à l'eau. Les principaux & les plus usités, sont l'esprit tiré du vin, de la bière & des autres végétaux fermentés. On peut y joindre les *ethers*, qui, quoique moins miscibles à l'eau, s'y mêlent pourtant complètement, quand la quantité de ce fluide est suffisante. Les corps que les esprits ardens dissolvent le mieux, sont ceux qui sont inflammables, & dont le principe huileux est presque à nu, comme certains bitumes, les résines & les huiles essentielles des plantes. On peut séparer les matières dissoutes dans les esprits inflammables, par l'évaporation du menstrue, ou en versant dans la dissolution une certaine quantité d'eau qui s'unit à l'esprit, & dégage la matière huileuse qui se précipite en flocons blancs & légers.

*De la Distillation.*

La plus simple de toutes les opérations de la Chymie, après la dissolution,

c'est la séparation des principes volatils, d'avec les principes fixes d'un corps, qui s'opère par la distillation, à l'aide du feu.

Comme les produits volatils qu'on retire des différentes substances, sont, ou fluides, ou concrets, cela a donné lieu de diviser la distillation en deux espèces.

La première est la distillation, proprement dite, opération par laquelle on retire, sous forme fluide, les produits volatils des corps analysés.

La seconde est la sublimation, qui présente à nu les principes volatils des corps sous une forme sèche.

On a distingué la distillation, en distillation montante, ou *per ascensum*; distillation descendante, ou *per descensum*; & distillation latérale, ou *per latus*: mais toutes ces opérations sont au fond la même chose, & ne diffèrent que par la forme des vaisseaux dont on se sert pour opérer.

Dans toute distillation la matière à  
analyser

analyser est renfermée dans un vaisseau qu'on fait chauffer ; la chaleur dilate la substance qui est soumise à son action, & donne lieu aux principes volatils de se dégager sous la forme de vapeurs. qui tendent toujours à s'éloigner du feu qui les volatilise.

Dans la distillation qu'on appelle *montante*, on se sert d'un instrument que les Chymistes ont nommé *alambic* ; il est composé d'un vaisseau profond, ou espèce de chaudron, dans lequel on met les substances à analyser. Cette première pièce se nomme *cucurbite* ; elle doit être couverte d'une seconde pièce appelée *chapiteau* : ce chapiteau est un cône dont la base est rétrécie pour s'ajuster à la cucurbite : le rétrécissement de cette base du cône forme une gouttière à l'intérieur, dans sa partie la plus large. Cette gouttière a une ouverture qui répond à un canal qui sort du chapiteau & qu'on nomme le *bec*. Les vapeurs qui s'élèvent du corps renfermé dans la cucurbite, vont se condenser

dans le chapiteau, y forment des gouttes qui tombent le long de ses bords, & se rassemblent dans la gouttière, pour s'écouler ensuite par le bec.

L'alambic, tel qu'il vient d'être décrit, peut être fait de verre, de terre ou de métal.

Les alambics de verre ont l'avantage de laisser voir à l'intérieur ce qui s'y passe; ils ne sont pas sujets à se laisser corroder par plusieurs matières qui ont de l'action sur les substances métalliques; mais ils ont l'inconvénient de se casser, en passant subitement du froid au chaud; & on ne peut faire dedans que des petites opérations. On fabrique de ces alambics dont le chapiteau est uni à la cucurbite: on les nomme alambics d'une pièce. Les cucurbites de terre souffrent un peu mieux l'alternative du froid & du chaud: on s'en sert pour distiller à feu nu les matières corrosives.

Les alambics de métal sont plus d'usage pour les grandes distillations; la

cucurbite est de cuivre étamé, le chapiteau est d'étain ; il est renfermé dans un seau de cuivre , soudé à la base du cône : ce seau prend le nom de *réfrigérant* , parcequ'on le remplit d'eau froide pendant les distillations : par le moyen de cette eau , on obtient plutôt des produits beaucoup meilleurs. Pour bien entendre cela , il faut se souvenir que la distillation ne peut avoir lieu , que les vapeurs du corps qu'on distille ne se condensent sous le chapiteau : or , le froid qu'elles éprouvent en y passant , produit cette condensation , & la distillation est plus prompte , les produits en sont meilleurs ; parceque les vapeurs circulant dans les vaisseaux chauds , y prennent une odeur de feu désagréable , & d'autant plus forte , qu'elles ont été plus long-temps sans se condenser. Les Chymistes nomment cette odeur *empyreume*. Pour aider la condensation des vapeurs , on ajuste au bec du chapiteau de l'alambic un tuyau nommé *serpentin* ; ce tuyau est d'étain ; il est

tourné en spirale , & plongé dans un feu de cuivre plein d'eau froide : les vapeurs qui coulent dans le serpentin , arrivent très-froides dans le vaisseau destiné à les recevoir.

Les distillations qui s'opèrent dans l'alambic de métal , peuvent se faire ou à feu nu , ou par un intermède appelé *bain*. Lorsque la distillation se fait à feu nu , on place l'alambic sur un fourneau de brique ou de terre. Ce fourneau est toujours composé de deux cavités , séparées par une grille , & chaque cavité a au-devant une ouverture particulière , qu'on peut ouvrir ou fermer à volonté. La cavité qui est au-dessus de la grille , sert à mettre la matière combustible , comme le bois ou le charbon ; celle qui est au-dessous reçoit les cendres , & donne entrée à une certaine quantité d'air , qui , passant dans le foyer , augmente l'activité du feu. La cucurbite entre dans la cavité supérieure du fourneau jusqu'aux deux tiers de sa hauteur ; elle est soutenue par un rebord assez

élevé au-dessus de la grille, pour qu'on puisse mettre la quantité de feu nécessaire pour opérer. Immédiatement au-dessous du bord qui soutient la cucurbite, au côté opposé à la porte du foyer, se trouve placé l'ouverture d'une cheminée, qui sort en dehors du fourneau, & donne issue à la fumée.

Toutes les distillations ne peuvent pas se faire à feu nu, soit parcequ'elles ont besoin d'une chaleur plus foible, soit encore parceque les vaisseaux sont sujets à se casser; comme ceux qui sont faits de verre; alors on plonge les vaisseaux dans de l'eau ou dans du sable qui servent de bain.

Pour opérer de cette manière avec un alambic de métal, on met de l'eau dans la cucurbite de cuivre, on place dedans une seconde cucurbite faite d'étain, dont l'ouverture s'adapte au chapeau, la matière à analyser est mise dans la cucurbite d'étain, & chauffée par l'eau ou par les vapeurs de l'eau contenue dans la cucurbite de cuivre.

Dans le premier cas , le bain se nomme *bain-marie* , dans le second , *bain de vapeurs*.

On peut faire des distillations dans un alambic de verre au bain-marie , en assujettissant le vaisseau distillatoire dans un chaudron plein d'eau chaude , fermé d'un couvercle qui est percé d'un trou , par lequel passe la partie supérieure de la cucurbite.

Lorsqu'on emploie le sable, il suffit d'en mettre dans une poêle de fer sur un fourneau , & d'enfoncer son appareil , plus ou moins , selon la chaleur dont on a besoin.

La distillation qu'on nomme *descendante* , se fait avec un appareil fort simple : on prend un verre à boire dans lequel on met un peu d'eau ; on le couvre d'une toile assujettie avec un fil ; on place sur cette toile la matière qu'on veut distiller , on la couvre d'un bassin de balance , capable de fermer l'ouverture du verre ; on met dans ce bassin des cendres & quelques charbons



allumés ; la chaleur dégage des vapeurs , qui tendant à s'éloigner du feu , passent à travers la toile , & vont se condenser dans l'eau qui est au fond du verre.

La troisième distillation ou la distillation latérale , se fait dans un vaisseau d'une seule pièce ; c'est une espèce de bouteille ovale , terminée par un grand col courbé , qui fait avec la bouteille un angle plus ou moins aigu ; ce vaisseau se nomme *retorte* ou *cornue* , il est de verre , de grès ou de métal.

Il y a des cornues qui ont à leur sommet une ouverture par laquelle on introduit la matière à analyser ; mais le plus ordinairement on est obligé de la faire entrer par le col même du vaisseau , à l'aide d'un entonnoir à longue tige.

Les cornues de verre restent telles qu'elles sont , lorsqu'on s'en sert pour distiller au bain de sable ou au bain-marie : mais il est des occasions où elles doivent supporter l'action du feu nu ; alors on les enduit d'une couche mince de terre à four ; on fait

de même pour les cornues de grès.

Le fourneau qui sert pour distiller à feu nu dans une cornue , se nomme *fourneau de réverbère* ; il est composé d'un foyer & d'un cendrier , séparés par une grille comme tous les fourneaux ; au-dessus du foyer est un cercle de terre qui porte à son bord supérieur une petite échancrure demi-circulaire : on place dans le cercle la cornue posée sur deux barres de fer qui traversent le fourneau , & sont reçues dans des petites échancrures du bord supérieur du foyer ; on ferme le fourneau avec un dôme terminé par une cheminée : ce dôme a une petite échancrure demi-circulaire , qui s'ajustant avec une pareille du cercle , forme un trou par lequel passe le col de la cornue : comme ce dôme est propre à réfléchir la flamme sur la cornue , on lui donne le nom de *réverbère*. Souvent on joint à ce fourneau une espèce de tour creuse , qui communique par une pente douce avec le foyer ; on emplit cette tour de char-

bon , & à mesure que les matières sont consumées , le charbon tombe de la tour dans le fourneau ; on le nomme pour cela *fourneau éternel* ou *athanor*.

Les produits des distillations sont reçus dans des vaisseaux, qu'on désigne sous le nom générique de *récipiens* ; mais selon leur forme , on leur a assigné différens noms : on appelle *matras* , une bouteille sphérique dont le col est long ; *ballon* une bouteille de même forme , mais beaucoup plus grosse & dont le col est court.

Il y a de ces ballons qui ont deux ouvertures opposées , ils servent dans les cas où l'on est obligé d'en mettre plusieurs les uns au bout des autres pour condenser des vapeurs.

On se sert dans la distillation des huiles essentielles, d'un récipient particulier ; c'est une espèce de vase fait en poire , dont le col est à la partie la plus étroite , il porte vers le fond un siphon courbé en S.

On proportionne la grandeur du ré-

cipient à la quantité des produits & à leur nature ; quand ce sont des vapeurs très-expansibles , on emploie de très-grands ballons ; on tâche aussi d'ajuster , autant qu'il est possible , l'ouverture du récipient au bec du chapiteau ou au col de la cornue qui doit entrer dedans ; & on les assujettit par le moyen des luts.

Le plus simple est une bande de papier enduite de colle , dont on entoure l'ouverture des vaisseaux : lorsque celui-ci ne suffit pas , on en peut faire avec du linge couvert d'une pâte de blanc-d'œuf & de chaux éteinte à l'air. M. Roux a donné aux Écoles de Médecine le procédé d'un très-bon lut , fait avec la colle-forte délayée dans l'eau chaude , & la poudre qui reste après qu'on a tiré l'huile des amandes. On peut encore se servir d'un morceau de vessie mouillée. Dans les distillations des acides minéraux , les Chymistes emploient un lut gras , qu'ils font avec l'huile de lin bouillante , dans laquelle ils versent du succin en fusion ; ils forment avec

cette espèce de vernis gras , & la terre glaise desséchée & réduite en poudre , une pâte très-ductile & qui se sèche difficilement.

Lorsqu'on a besoin d'éloigner le ballon du fourneau , dans les opérations qui se font à la cornue , on se sert d'un petit vaisseau de verre , de forme allongée , ouvert à ses deux extrémités ; ce tuyau se nomme *allonge* ; on le lute d'une part à la cornue , & de l'autre au récipient.

La digestion est une opération fort analogue à la distillation ; elle n'en diffère qu'en ce que les produits se versent continuellement sur la matière à analyser ; ce que les Chymistes ont appelé *cohobation* : ils ont imaginé pour cette opération des vaisseaux connus sous les noms de *généaux* & de *pélicans*.

Les *généaux* sont composés de deux alambics de verre d'une pièce , disposés de manière que le bec de chacun des chapiteaux est reçu dans la cucurbite qui lui est opposée : en sorte que

mettant le feu sous l'un des alambics , l'autre lui sert de récipient , & chauffant ensuite le second, le premier reçoit à son tour le produit de la distillation.

Le pélican est un alambic d'une pièce dont le chapiteau a deux becs , qui tous deux sont courbés , & rentrent dans la cucurbite , de manière que les vapeurs qui s'élèvent dans le chapiteau , retombent continuellement par les becs dans le vaisseau distillatoire.

A tous ces vaisseaux qui ne sont presque plus usités , on a substitué un appareil beaucoup plus simple : il consiste à mettre dans un grand matras la matière qu'on veut faire digérer ; on ferme le matras avec un autre plus petit , dont le col rentre dans celui du grand , on ferme les jointures & on procède à la digestion. Les vapeurs qui s'élèvent dans le petit matras , retombent dans le grand , & se récohobent.

On se sert aussi quelquefois d'un alambic dont le chapiteau n'a point de

bec ; & entre dans la cucurbite ; on le nomme *alambic aveugle*.

La seconde espèce de distillation est la sublimation ; les appareils dont on se sert dans cette opération sont fort simples. On pose sur une cucurbite de terre plusieurs pots de fayance , ouverts par les deux bouts ; le dernier est fermé d'un couvercle conique percé d'un petit trou ; on met la matière à analyser dans la cucurbite placée sur son fourneau ; on ajuste les pots qu'on nomme *aludels* ; la vapeur sèche que le feu élève s'attache dans leur intérieur : cet appareil est d'usage pour retirer les fleurs de soufre.

On se sert encore pour des sublimations de deux terrines vernissées, dont on a usé les bords sur un grès pour qu'elles ferment mieux ; celle qui doit servir de cucurbite , se met sur un fourneau , on pose l'autre dessus & on lute les jointures avec une bande de papier enduite de colle ; il faut avoir soin que la terrine supérieure soit percée d'un

petit trou. Quelques personnes font dans l'usage de se servir d'un pot de terre, qu'on couvre d'un grand cône de carton ; mais ce carton a l'inconvénient de laisser échapper par ses pôres beaucoup de la matière qui se sublime.

### *De la Calcination.*

La calcination est une opération entièrement opposée à la distillation : elle nous présente à nu les principes les plus fixes des corps, & se fait toujours à feu ouvert dans une cuiller de fer, ou dans un creuset de terre. On fait ces sortes de vaisseaux, avec la même argille dont on fait les fourneaux ; ils supportent assez bien l'alternative du froid & du chaud ; mais comme ils sont très-poreux, ils laissent passer la plupart des substances qu'on y fait fondre : on les connoît sous le nom de *creusets de France*. On fabrique encore des creusets avec la pâte des poteries de grès ; on les nomme *creusets d'Allemagne* : ils retiennent assez bien les substances même



les plus fusibles, mais ils sont sujets à casser, lorsqu'on les fait chauffer ou refroidir trop brusquement. On fait des creusets avec une espèce de pierre talqueuse noire, connue sous le nom de *mine de plomb des peintres* ou *plombagine* ; on peut s'en servir pour fondre des métaux, mais ils sont rarement d'usage.

*De quelques Opérations préliminaires de la Chymie.*

A toutes les opérations analytiques de la Chymie, on peut ajouter celles qui ne sont que préliminaires, & qui paroissent plus mécaniques que chimiques. Telle est premièrement la trituration : c'est une division des matières à analyser qui se fait dans des mortiers de fer, de marbre ou de verre : les premiers servent pour les matières très-dures ; leur pilon est du même métal : les seconds sont employés pour des matières plus tendres qui ne sont point

corrosives ; leurs pilons sont faits de bois : enfin , les derniers servent pour les matières salines & corrosives ; leurs pilons doivent être de verre : on peut leur substituer des mortiers d'agate.

Les matières qui doivent être réduites en poudre fine , sont broyées avec une masse de porphyre sur une table de même matière , ou sur une espèce de pierre très-dure , nommée *écaille de mer*.

Toutes les poudres doivent être passées à travers des tamis , qui sont de crin pour les poudres grossières , & de soie pour celles qui sont plus fines.

La filtration est encore une manœuvre souvent nécessaire , pour séparer une liqueur des matières auxquelles elle est mêlée & l'avoir pure ; on se sert quelquefois d'une simple toile , d'une étamine ou d'une étoffe de laine , qu'on appelle *blanchet*. On accroche ces morceaux d'étoffe aux quatre coins d'un châssis de bois , monté sur un pied ; souvent on se sert , pour filtrer , de papier gris

gris ou blanc non collé, qu'on met dans un entonnoir de verre. Les liqueurs qui passent au travers des pôres du papier sont très-limpides, & aussi pures qu'elles peuvent l'être par la filtration.

On trouve encore dans les laboratoires de Chymie plusieurs instrumens, comme des balances de différentes grandeurs, pour peser depuis quelques livres, jusqu'à des parcelles de grain. Ces dernières, qui sont très-déliçates, sont communément renfermées sous une lanterne de verre : on les nomme *balance d'essai*.

Différens outils pour travailler les métaux, comme tas d'acier, bigorne, marteau à planer, cisailles, &c. cônes de fer & lingotières, pour couler les matières métalliques fondues.

Ustensiles pour travailler dans les fourneaux & manier les creusets ; une petite forge garnie de son soufflet.

Un fourneau servant à coupeller les métaux ; ce fourneau ne diffère de celui de réverbère que par sa forme, qui est

quarrée : l'endroit qui répond au foyer est séparé de celui qui répond au cendrier, par deux barres de fer sur lesquelles porte un vaisseau de terre, long, plat en dessous, convexe en dessus : on l'appelle *moufle* ; son ouverture répond à la porte du foyer : on met sous cette moufle les creusets ou coupelles qui sont ou faites d'une argille bien réfractaire, ou préparées avec la terre des os d'animaux bien calcinée & bien lavée, dont on fait avec de l'eau une pâte à laquelle on donne la forme nécessaire dans des moules. Le cendrier du fourneau est percé de plusieurs ouvertures ; le dôme en a une antérieurement, par laquelle on jette le charbon.

Telles sont en général les opérations de la Chymie, & les instrumens qu'elle emploie. L'industrie de chaque artiste peut en créer suivant ses besoins ; mais il a toujours plus d'avantage à en diminuer le nombre qu'à l'augmenter.

*Des Éléments:*

Quelque loin que l'analyse chymique puisse nous conduire dans les recherches sur la nature & les propriétés des corps, elle en trouve cependant qui se refusent absolument à toute décomposition, & qui jusqu'à présent paroissent absolument inaltérables & toujours les mêmes, de quelque substance qu'on les retire. Les Chymistes ont regardé ces corps, les plus simples de tous, comme les principes ou élémens qui servent à former les autres, qu'ils ont distingués en mixtes & en composés.

Ils appellent mixtes les corps qui résultent de l'union des élémens, & composés, ceux qui sont formés de mixtes; & comme ces composés peuvent eux-mêmes être formés d'un nombre de corps déjà composés, M. Macquer croit qu'on pourroit, avec raison, les distinguer en composés du premier, du second & du troisième ordre, &c. Il est bon d'observer que dans une masse,

chaque petite particule est elle-même un composé, & que leur état de réunion forme ce qu'on appelle un aggrégé de composés ; enforte qu'on peut détruire l'aggrégation d'un morceau de soufre ; par exemple, en le réduisant en poudre, sans que sa composition soit altérée.

La découverte des premiers élémens des corps étant le point vers lequel tendent toutes les analyses chymiques, il faut les connoître avant d'entrer dans le détail des substances plus composées : les Physiciens, ainsi que les Chymistes, ont reconnu quatre élémens : le feu, l'air, l'eau & la terre.

### *Du Feu.*

Le feu est un fluide très-actif qui pénètre tout, & qui, par son extrême agitation, semble se soustraire aux loix générales d'inertie & de repos, imposées aux autres corps. Nous ne pouvons mieux nous éclairer sur la nature de ce principe, qu'en examinant l'une

après l'autre ses différentes propriétés.

La chaleur est le premier & le plus sensible des effets du feu ; mais la sensation qu'elle produit devenant plus ou moins forte pour nous , suivant l'état où nous sommes lorsque nous venons à l'éprouver , elle ne peut rien nous apprendre de positif sur la quantité de matière ignée dont un corps est actuellement pénétré ; puisque ce qui nous paroît froid dans un temps, nous semble chaud dans un autre. Nous trouvons les caves chaudes en hiver & froides en été ; & cependant lorsqu'elles sont très-profondes, elles gardent , à-peu-près, la même température dans tous les temps ; & quand elles sont plus près de la surface de la terre, elles suivent alors les variations de l'air seulement d'une manière moins subite & moins marquée.

La lumière est encore regardée comme un effet du feu ; quelques Physiciens même prétendent que le feu n'est que la matière de la lumière, qui acquiert

une nouvelle force, en pénétrant des corps denses qui s'opposent à son passage ; mais le plus grand nombre regarde ces deux substances comme très-distinctes. En effet, la lumière peut être réfléchie en tombant sur certains corps, & décomposée par le prisme, comme le démontrent les expériences de Newton ; le feu au contraire n'a aucune de ces propriétés. Il est d'ailleurs très-constant que beaucoup de corps qui contiennent une très-grande quantité de feu, comme une barre de fer chaude & qui n'est point rouge, de l'eau bouillante, &c. ne sont nullement lumineux ; tandis que, comme l'indique Boerhaave, les rayons de la lune rassemblés par un miroir ardent, produisent une très-grande lumière, sans qu'on s'apperçoive de la moindre augmentation de chaleur au foyer de ce miroir. La dilatation que produit le feu dans tous les corps qu'il pénètre, est de tous les signes de sa présence, celui qui peut nous indiquer, de la manière la plus



sure, en quelle quantité il entre dans une substance ; car nous voyons cette dilatation croître dans tous les corps, à mesure qu'ils restent plus long-temps exposés à l'action de cet élément. Si on prend deux barres de fer parfaitement égales, qu'on en fasse chauffer une, elle paroîtra plus longue que l'autre, & ne passera pas, étant chaude, par où elle passoit avant d'avoir souffert l'action du feu ; parceque la dilatation produite par la chaleur a lieu en tout sens, & le dernier degré de cette dilatation produit l'écartement total des parties du corps solide, ou la fusion ; mais en refroidissant, tout rentre dans son premier état.

Les Physiciens ont construit un instrument très-propre à mesurer les degrés de dilatation d'un corps chauffé : ils le nomment *pyromètre* : il est composé d'une lampe à l'esprit-de-vin, dans laquelle plusieurs méches se trouvent disposées sur la même ligne droite. On place au-dessus de ces méches la

tige de métal qu'on veut soumettre à l'expérience ; cette tige passe par une de ses extrémités, dans un pilier solide, placé à l'un des bouts de la lampe, il est surmonté d'une vis de pression, qui sert à arrêter la tige de métal, & à s'opposer à sa dilatation dans ce sens.

L'autre extrémité de la même tige se visse dans deux espèces de bascules, disposées à angle droit, & attachées conjointement à une lame de cuivre, qui peut se mouvoir en avant & en arrière, & dont l'étendue du mouvement est bornée à une ligne d'espace. Le mouvement de cette lame est occasionné par la dilatation de la tige qui pousse les bascules. Pour le rendre plus sensible, & pour s'appercevoir de la plus petite dilatation possible, voici la mécanique ingénieuse que les Physiciens ont imaginée.

Ils ont adapté vers le milieu de la lame un levier du premier genre, dont les bras sont très - inégaux. Le plus petit, attaché fixement à cette lame, participe

participe au mouvement qu'elle reçoit ; & le mouvement se multiplie à l'extrémité de l'autre bras, à raison de son excès de longueur, dont le rapport est communément de 36 à un.

Un grand levier du premier genre est pareillement fixé, par son plus petit bras, à l'extrémité du premier, qui lui communique toute l'étendue du mouvement qu'il reçoit ; celui-là le multiplie pareillement, à raison de l'excès de longueur que l'artiste a su donner à son plus grand bras. Ce rapport est ordinairement comme celui de 60 à 1, ce qui rend le mouvement 60 fois plus grand qu'à l'extrémité du premier levier où il étoit déjà 36 fois plus grand que dans la lame, & conséquemment dans la tige qui l'occasionnoit. Le mouvement de cette tige se trouve donc 2160 fois plus sensible à l'extrémité du plus long bras du second levier : cette extrémité conduit un rateau, qui engraine dans un pignon surmonté d'une aiguille qui se meut circulaire-

ment sur un cadran horizontal , placé sur la platine supérieure de la cage qui contient tout l'appareil.

Si ce cadran est exactement divisé de lignes en lignes, chaque graduation que l'aiguille parcourra , indiquera une dilatation dans la tige qui n'ira qu'à  $\frac{1}{1000}$  de ligne ; & qui conséquemment marquera ; d'une manière sensible , la plus petite altération que la chaleur sera capable d'occasionner dans cette tige.

La dilatation produite par le feu , est beaucoup plus prompte dans les fluides que dans les solides , comme le prouve l'expérience suivante , rapportée par Boerrhaave. Si on prend une phiole remplie d'eau froide jusqu'à une hauteur marquée, qu'on la plonge dans l'eau bouillante, on voit la phiole se dilater, & la liqueur descendre au-dessous de la marque ; mais à mesure que l'eau qui est dans la phiole s'échauffe, elle augmente de volume, & monte au-dessus de l'endroit où elle se trouvoit avant l'immersion. Cet effet est encore

plus sensible si on fait l'expérience avec de l'esprit-de-vin ; c'est même à raison de la dilatabilité singulière de cette liqueur, qu'on s'en sert pour construire les thermomètres.

L'air étant de tous les fluides connus le plus mobile, est aussi le plus facile à se dilater ; aussi les thermomètres à air sont-ils tellement sensibles, qu'ils ne restent jamais en repos ; la moindre augmentation ou diminution de chaleur dans l'atmosphère suffit pour produire la dilatation ou la condensation de l'air contenu dans la boule du thermomètre.

Le feu peut naître du frottement de deux corps, & son activité est en raison de la dureté des corps frottés, & de la rapidité du frottement qu'ils éprouvent.

On peut encore produire cet être, en rassemblant les rayons du soleil par le moyen d'une lentille de verre ; & lorsqu'il est une fois mis en action, on l'entretient à l'aide des matières combustibles.

La propriété que les corps ont de brûler , dépend de ce qu'ils contiennent tous une plus ou moins grande quantité d'un principe que les Chymistes ont nommé *phlogistique* ou *principe inflammable* , & qui paroît n'être autre chose que le feu lui-même qui perd ses propriétés en entrant dans la combinaison des corps.

Lors donc que le feu actif est appliqué à un corps qui contient du phlogistique, ce corps se dilate, ses pores s'ouvrent, le feu qui les pénètre va s'unir aux molécules de principe igné, qui se trouvent isolées & comme emprisonnées par les particules de matière environnante; en sorte que devenues plus fortes par leur union, elles brisent tous les obstacles qui s'opposent à leur action, enlèvent avec elles les parties qui peuvent céder à leur impulsion, & ne laissent que la portion la plus fixe du corps dans un état de désunion & de décomposition parfaite. On voit par-là que plus le phlogistique d'un

corps est lié avec les autres principes, plus la déflagration doit en être vive, & plus elle doit procurer de chaleur.

Les substances qui contiennent une grande quantité de matière inflammable, sont aussi celles que le feu altère davantage ; il détruit toutes les parties, tant des plantes que des animaux, & les met en cendres ; il enlève aux matières métalliques leur éclat, & les réduit à l'état d'une terre d'autant plus inaltérable au feu, qu'elle a été plus complètement dépouillée de phlogistique ; car tous les corps qui n'ont point ce principe dans leur combinaison peuvent bien être pénétrés par le feu ; mais d'une manière passagère & qui ne produit point sur eux d'altération.

On observe que les métaux acquièrent de la pesanteur par la calcination ; mais on ignore encore la véritable raison de ce phénomène singulier.

Lorsque le phlogistique qui s'élève des corps dans leur combustion, entraîne de l'eau avec lui, il en résulte

de la flamme; on le prouve par les charbons qui en fournissent tant qu'ils contiennent de l'humidité; & qui cessent d'en produire aussi-tôt qu'ils l'ont entièrement perdue, quoiqu'ils conservent encore beaucoup de phlogistique & qu'ils continuent de brûler. Si on les éteint lorsqu'ils ont cessé de donner leur flamme, & qu'après les avoir exposés dans un lieu humide on les allume de nouveau, ils reproduisent de la flamme, & peuvent, à l'aide de l'eau, en fournir jusqu'à ce qu'ils soient entièrement consumés.

La plupart des vapeurs inflammables ne sont presque que de l'eau; l'esprit-de-vin qui en contient beaucoup, comme un de ses principes, ne cesse de donner de la flamme jusqu'à ce qu'il soit totalement brûlé.

Les matières métalliques, au contraire, dont le phlogistique est dans un grand état de siccité, brûlent presque sans s'enflammer; mais si on ajoute à leur phlogistique la quantité d'eau qui



lui manque, il est en état de produire de la flamme. Qu'on prenne, par exemple, une certaine quantité de limaille de fer, qu'on la mette dans un matras, & qu'on verse par-dessus un peu d'acide vitriolique étendu d'eau, le fer se dissout, & il s'élève de la dissolution des vapeurs qui s'enflamment à l'approche d'une bougie allumée. Ces vapeurs ne sont que de l'eau qui charie une portion du phlogistique du fer, & se dissipent avec lui.

Quelques Chymistes pensent que le phlogistique est différent de la matière du feu; ils appuient leur sentiment sur ce que le feu ne peut pas faire ce que fait le phlogistique. Le nitre, disent-ils, exposé dans un creuset à l'action d'un feu violent, ne détonne point, tandis que s'il vient à toucher un charbon embrasé, sur le champ il s'enflamme & se décompose.

De même un métal exposé au feu, se calcine, & la chaux finit par se fondre en verre; mais si on mêle à cette

chaux , une certaine quantité de matière abondante en phlogistique, comme de la poudre de charbon, du suif, ou quelque autre corps, & qu'on l'expose au feu dans un creuset, le phlogistique des matières combustibles que le feu dissipe, se combine avec la chaux métallique & la réduit en métal.

On peut répondre à leurs objections de la manière suivante : le nitre ne détonne pas lorsqu'il est seul dans un creuset ; mais il finit par s'alkalifer de même qu'après la détonation ; en sorte que la décomposition étant la même, la seule différence qui s'y trouve, naît de la promptitude, ou de la lenteur avec laquelle elle s'opère ; or, dans le premier cas, c'est-à-dire, lorsque le nitre chauffe dans un creuset, le feu le pénètre d'une manière lente, & n'enlève son acide que par petite portion, tandis que dans le second, le charbon embrasé qui touche ce nitre, allume à la fois une certaine quantité de son acide,

& donne lieu à une combustion plus prompte.

A l'égard de la réduction des chaux métalliques, il est constant qu'elle ne peut s'opérer par le seul secours du feu dans un creuset ; mais comme on ne peut point encore assurer que le phlogistique soit le seul principe que la calcination enlève aux métaux, on n'est pas plus certain qu'ils ne reprennent que lui dans leur réduction.

De tout ce qu'on vient de dire, il est facile de conclure : premièrement, que le feu se trouve dans deux états différens, libre & jouissant de toutes ses propriétés, ou combiné comme principe, & formant le phlogistique dans presque tous les corps de la nature. 2.<sup>o</sup> Que ce phlogistique peut être dégagé des corps qui le contiennent, toutes les fois que le feu en action s'unit à lui, & lui donne le pouvoir de rompre les obstacles qui s'opposent à son expansion. 3.<sup>o</sup> Que le phlogistique qui charie de l'eau en brûlant, forme

la flamme. 4.<sup>o</sup> Que les corps auxquels on enlève le phlogistique, perdent avec lui leurs autres principes volatils & leur liaison. 5.<sup>o</sup> Que les corps complètement déphlogistiqués, ne peuvent plus être aucunement altérés par le feu. 6.<sup>o</sup> Enfin, que le phlogistique peut se combiner de nouveau avec les terres métalliques qui en ont été privées, & leur rendre toutes les propriétés qu'elles avoient avant la calcination.

*De l'Air.*

L'air est un fluide pesant, élastique & compressible ; il forme un atmosphère autour de notre globe ; sa présence se manifeste : 1.<sup>o</sup> par la résistance qu'il oppose au mouvement, & qui, pour parler le langage des Physiciens, croît en raison doublée de la vitesse des corps mus : 2.<sup>o</sup> Par le vent, qui n'est autre chose que l'agitation de l'air, produite par des portions de sa masse, qui se déplacent journellement dans la production & la destruction de tous les

êtres ; où , comme le pense M. de Buffon , par la gravitation de la lune sur notre globe , qui peut communiquer à l'athmosphère le mouvement de flux & de reflux qu'elle imprime aux eaux de l'Océan.

La première propriété de l'air est la fluidité , qu'il ne doit peut-être qu'au feu qui le pénètre , & qui est telle qu'on n'a jamais pu lui faire perdre. Quoique les parties de cet élément soient très-mobiles , il ne pénètre cependant pas certains corps que l'eau & les huiles pénètrent avec la plus grande facilité , comme le papier , le cuir , &c.

La pesanteur de l'air est comme celle des autres fluides , en raison composée de sa hauteur & de l'étendue de sa base ; aussi est-il plus pesant dans les lieux bas , où il est d'ailleurs chargé d'une quantité de vapeurs hétérogènes , qui en altèrent la pureté. Torricelli , qui le premier a découvert la pesanteur de ce fluide , a vu que dans un temps calme , il pouvoit tenir en équilibre une colonne

de mercure de 28 pouces de hauteur, ce qui fait que le poids de l'air est à celui de l'eau, à-peu-près comme 1 à 850.

On peut par la compression réduire l'air à un cent vingt-huitième du volume qu'il occupoit auparavant, & il n'en a que plus de force à se remettre dans son premier état, dès que la compression cesse. Cette seconde propriété se nomme *élasticité*; l'air ne peut jamais la perdre par la compression, quelque temps qu'elle puisse durer, comme il résulte de l'expérience de Messieurs Boyle & Mariotte, qui gardèrent, pendant plusieurs années, de l'air dans la crosse d'un fusil à vent, sans qu'il eût rien perdu de son élasticité. C'est à l'élasticité qu'est dûe la propriété que la plus petite masse d'air a de tenir en équilibre tout le poids de l'atmosphère.

L'air hâte considérablement la déflagration des corps combustibles; on croyoit même qu'il y étoit indispensablement nécessaire; mais M. d'Arcet, dans les

savantes recherches qu'il a faites sur plusieurs matières minérales, s'est assuré que la plupart des substances métalliques & demi-métalliques, pouvoient être réduites en chaux & fondues en verre, quoiqu'exactement renfermées dans des boules de porcelaine, & n'ayant pas le moindre contact avec l'air ; peut-être de semblables expériences réussiroient-elles sur d'autres substances.

L'air qui nous environne n'est jamais bien pur ; il contient toujours une plus ou moins grande quantité d'eau & de vapeurs de toute nature, que le soleil & les feux souterrains élèvent dans l'atmosphère ; lorsque ces vapeurs sont très-abondantes, elles augmentent considérablement la pesanteur de l'air, & détruisent son élasticité.

L'air entre dans la composition de presque tous les corps de la nature : les hommes & la plupart des animaux y vivent ; il est si nécessaire à la végétation, que les plantes, même celles qui croissent sous l'eau, périssent dans

le vuide : il entre dans la combinaison de presque tous les minéraux ; cependant il n'est pas prouvé que les métaux en contiennent.

L'air qui est renfermé dans les corps s'y trouve réduit en particules très-fines, & dans un état de combinaison, privé de toutes ses propriétés, comme le feu dans l'état de phlogistique ; on le retire abondamment de la distillation de plusieurs corps, & à mesure qu'il s'en dégage, il reprend toutes ses propriétés d'air élastique. Feu M. Rouelle a perfectionné un appareil inventé par M. Hales, pour mesurer la quantité d'air que fournit un corps dans son analyse : cet appareil consiste en un récipient qui a deux cols, formant sur le corps du récipient un angle d'environ 45 degrés ; l'un de ces cols est plus court & plus large ; l'autre plus long & plus étroit : le récipient est renfermé dans un châssis quarré qui repose dans le fond d'un seau, & soutient sur ses quatre piliers une cloche de verre, pa-



reille à celle dont on couvre les machines pneumatiques. Cette cloche est percée d'un petit trou à son sommet ; après avoir placé dans son fourneau une cornue pleine de la matière à analyser, on la lutte au col court du récipient ; on emplit le seau d'eau, & en vidant avec la bouche l'air contenu sous la cloche, on fait monter l'eau jusqu'à une hauteur marquée ; on distille ; & à mesure que l'air se dégage, il sort par le tuyau long du récipient, & passe dans la cloche ; il comprime l'eau & la fait descendre fort au-dessous de l'endroit où elle montoit avant l'opération. Lorsque les vaisseaux sont refroidis, & que l'air, dégagé par la distillation, s'est condensé, on en mesure la quantité par l'espace qui se trouve entre l'endroit où montoit l'eau avant l'opération, & sa hauteur actuelle.

*De l'Eau.*

L'eau se trouve solide & sous la forme de glace, ou sous celle d'un fluide trans-

parent , sans couleur , ainsi que sans odeur. Quoique ce dernier état de l'eau soit le plus ordinaire, il n'est cependant pas le plus naturel ; car la fluidité n'appartient qu'aux particules de feu qui pénètrent l'eau , & dont elle peut se charger jusqu'au point de bouillir, après quoi elle n'en prend plus. Comme ce feu n'est qu'interposé entre les parties de l'eau , & qu'il n'y est pas combiné, elle peut le perdre par un entier refroidissement , & se trouve après la même qu'elle étoit avant d'avoir été chauffée. Farenheit a observé que la même eau bouillante, n'avoit pas le même degré de chaleur en tout temps, & qu'il falloit avoir égard au poids de l'air qui la comprime, parceque l'eau est plus ou moins chaude à raison de sa densité ; d'où il conclut qu'on pourroit connoître l'état de l'atmosphère, en plongeant dans l'eau bouillante un thermomètre très-sensible , qui feroit dans ce cas fonction de baromètre.

Lorsque l'eau se gele, elle ne perd pas  
pour

pour cela tout le feu qu'elle contenoit ; car il est possible d'augmenter considérablement le froid de la glace ; & on ne fait pas même jusqu'où il peut être porté.

L'eau est incompressible , comme le prouvent les expériences de l'Académie *del Cimento*.

Plusieurs Savans ont été long-temps dans l'opinion , que l'eau étoit composée de terre , & pouvoit même se changer entièrement en cette substance : Boerrhaave , & d'autres très-bons Chymistes ont douté de la vérité de ce fait : enfin , M. Lavoisier a communiqué l'année dernière à l'Académie Royale des Sciences , les expériences qu'il avoit faites à ce sujet. Ce Chymiste prit un pélican de crystal , fermé d'un bouchon de pareille matière ; il le pesa exactement & y mit une certaine quantité d'eau déjà purifiée par plusieurs distillations ; après avoir lutté exactement l'ouverture de son pélican , il continua de distiller pendant cent & un jours ; les

gouttes qui s'élevoient, retombant perpétuellement par les becs du pélican dans la cucurbite : au bout de ce temps, M. Lavoisier ayant apperçu une certaine quantité de flocons terreux, examina son expérience avec une attention scrupuleuse ; il trouva que le vaisseau & l'eau qu'il contenoit, avoient le même poids qu'avant qu'ils fussent mis en expérience ; mais l'eau en ayant été retirée, & le pélican pesé séparément, son poids se trouva diminué de quelques grains : l'eau qui avoit été soumise à cette longue digestion, ayant été distillée, laissa un résidu terreux qui équivaloit à peu près à la portion que le pélican avoit perdue ; ce qui prouve, comme le dit M. Lavoisier, que cette terre n'étoit pas celle de l'eau, mais celle que ce fluide avoit dissoute du vaisseau qui avoit servi à le contenir pendant la durée de l'opération.

L'eau étant susceptible d'être volatilisée par la chaleur du soleil, s'élève en vapeurs dans l'atmosphère & produit

tous les météores aqueux. Premièrement, les brouillards & les rosées, lorsque ne s'élevant qu'à peu de hauteur, elle se rassemble en petites gouttes qui retombent lentement sur la terre. Secondement, les nuages, quand ces particules d'eau se réunissant en grosses masses, sont assez élevées pour pouvoir être soutenues en l'air. Troisièmement, les pluies formées par l'eau de ces nuages qui tombent en gouttes d'autant plus grosses qu'elles tombent de plus haut, & qu'elles se réunissent en plus grand nombre dans leur chute. Quatrièmement enfin, la neige qui n'est que le brouillard ou la petite pluie gelée, & la grêle qui est produite par les gouttes d'eau plus considérables.

Les nuages que le vent pousse vers le sommet des hautes montagnes, s'y condensent & coulent en ruisseaux qui sillonnent leur lit dans les terrains les plus tendres, & vont enfin former les rivières & les fleuves qui se jettent à la mer.

Toutes les eaux de la terre sont ou douces, ou salées, ou minérales. Les mers sont pleines de sel, & les fleuves ne contiennent que de l'eau douce, parce que ces eaux sont de véritables eaux distillées. Les brouillards qui s'élèvent des mers n'entraînent avec eux aucunes parties salines qui sont de nature fixe; or, ce sont ces brouillards qui forment les nuages; & les nuages donnent naissance aux rivières; en sorte qu'on peut comparer l'Univers à un grand alambic, dont les mers sont la cucurbite, les montagnes le chapiteau, & les fleuves le récipient.

A l'égard des eaux minérales, ce sont des sources particulières qui ont dissous quelques matières salines & métalliques qu'elles ont trouvées dans leur chemin. Comme toutes les eaux n'ont pas le même degré de pureté, elles n'ont pas non plus la même pesanteur; on a imaginé pour les évaluer des instrumens connus sous le nom d'*aréomètres*. Cet instrument fut imaginé

par une femme célèbre dans les mathématiques ; mais il sortit alors bien imparfait de ses mains : ce n'étoit autre chose qu'un tube de verre terminé par une boule soufflée, dans laquelle on introduisoit une quantité donnée de mercure, pour faire enfoncer l'instrument dans l'eau & l'y tenir perpendiculairement.

On jugeoit des pesanteurs spécifiques de différentes eaux, par le plus grand ou le plus petit nombre de degrés d'enfoncement de cet instrument : l'eau étoit-elle plus légère, il s'enfonçoit davantage ; plus pesante, il s'enfonçoit moins.

Cet instrument, tout imparfait qu'il étoit, fut fort accueilli dans son origine, & ce ne fut que plusieurs siècles après, qu'on réfléchit plus particulièrement sur sa construction, & qu'on se proposa de le perfectionner.

Le principal défaut qu'on y trouvoit, fut l'impossibilité de juger exactement des différences dans les pesanteurs spé-

cifiques des liqueurs, & de pouvoir comparer ses observations avec celles qui auroient été faites à l'aide d'un instrument d'une autre espèce.

Ce fut ce qui engagea, dans le siècle dernier, le célèbre M. Homberg, à renoncer à cette méthode, & à imaginer un instrument qui lui parut plus propre à remplir ses vues.

Il prit un petit vaisseau de crystal, auquel il fit adapter un tube communiquant : il remplissoit ce vaisseau jusqu'à une hauteur indiquée sur ce dernier tube ; & étant sûr alors d'avoir le même volume de liqueur, il jugeoit de sa pesanteur spécifique à l'aide d'une balance très-sensible.

Cette méthode, quelque exacte qu'elle paroisse, n'est cependant pas préférable à la précédente, en supposant qu'on pût remédier à son imperfection ; & c'est à quoi plusieurs bons Physiciens se sont appliqués.

Il paroît même qu'on étoit parvenu jusqu'à un certain point, du temps de



M. Musschenbroeck, à ce degré de perfection qu'on desiroit dans cet instrument.

M. Ratz de Lanthenée est sans contredit un de ceux qui se sont le plus distingués dans cette carrière, & qui prit le meilleur moyen de réussir, en se servant de poids pour graduer son instrument. Ces poids qu'il pouvoit évaluer aisément, & dont il chargeoit la queue de l'aréomètre, mettoient des différences graduées dans les degrés de son immersion, & équivaloient certainement à de semblables degrés de diminution dans la pesanteur spécifique de la liqueur dont il faisoit usage pour faire cette expérience.

M. Baumé mérite encore notre reconnaissance pour la méthode ingénieuse qu'il imagina il y a quelques années, afin de rendre ces instrumens fixes & comparables les uns aux autres. Il trouva moyen d'augmenter progressivement la densité de l'eau, en lui donnant à dissoudre une quantité dé-

terminée de sel ; & ce fut d'après les accroissemens dans la densité du liquide, qu'il construisit l'échelle de son instrument. Nous nous arrêterons un instant sur cette méthode qui mérite bien d'être connue.

Son pese-liqueur, qui ne diffère en rien dans sa construction des pese-liqueurs ordinaires, étant placé dans l'eau pure, doit être lesté, de façon qu'il s'y enfonce jusqu'au haut de sa tige où M. Baumé marque zéro, pour continuer sa graduation.

Pour avoir le second terme, dit cet ingénieux Artiste, on prépare une eau salée, en faisant dissoudre quinze livres de sel marin dans quatre - vingt-cinq livres d'eau pure, ce qui forme cent livres de liquide ; on plonge alors l'instrument dans cette liqueur, & on marque 15 degrés à l'endroit où il se fixe ; on divise ensuite l'espace compris depuis zéro jusqu'à cette graduation en quinze parties égales, qui indiquent chacune le nombre de livres de

e sel contenues dans la liqueur ; & conséquemment cet instrument devient propre à mesurer la richesse d'une saumure , à quelque point de saturation qu'elle soit portée , puisqu'on peut & qu'on doit continuer la graduation en descendant , & se servant toujours des mêmes degrés indiqués par la seconde immersion.

L'échelle de M. Baumé descend jusqu'à 40 degrés , ce qui est plus que suffisant , puisqu'il n'est guère possible de trouver une saumure , dont le rapport du sel au liquide qui le contient , soit de 40 à 60. Le même Artiste porta aussi ses vues dans le même temps sur la perfection des aréomètres pour les liqueurs spiritueuses ; il suivit le même procédé , qu'il modifia relativement à ses vues.

Il prit un pese-liqueur semblable au précédent , qu'il lesta de mercure , avant qu'il pût s'enfoncer de quelques lignes au-dessus de sa boule , dans une li-

queur faite de 90 onces d'eau, & de 10 onces de sel ; ce fut à cet endroit qu'il plaça le zéro de la graduation : il le plongea ensuite dans de l'eau distillée, dans laquelle il s'enfonça davantage, & il y marqua dix degrés. Il divisa l'espace compris entre ces deux termes, en dix parties égales, & il continua sa division en montant jusqu'à cinquante degrés, nombre plus que suffisant pour l'objet qu'il se proposoit, puisqu'on ne trouve point d'esprit-de-vin qui puisse faire arriver l'aréomètre à ce terme.

On conçoit aisément que les degrés de ce dernier instrument, ont un usage inverse de ceux du précédent aréomètre ; ce dernier annonce une eau d'autant plus riche en sel, qu'il s'enfonce moins dans cette eau ; l'autre au contraire, annonce une liqueur d'autant plus spiritueuse, qu'il s'y enfonce davantage. Nous n'avons point à nous plaindre de l'exactitude de cette mé-

thode, mais seulement de sa difficulté. Quelles précautions, en effet, ne faut-il pas prendre pour y mettre toute l'exactitude qu'elle exige, soit par rapport à la pureté du sel qu'on doit employer, soit par rapport à la température de l'eau qu'on doit nécessairement conserver la même pendant toute l'opération, ce qui n'est certainement pas aisé.

Nous observerons encore ici, qu'il seroit à désirer pour la perfection de ces instrumens, que l'échelle ne fût pas placée dans l'intérieur du tube : les réfractions que la lumière éprouve, peuvent souvent occasionner quelques erreurs dans des degrés aussi petits.

Il seroit encore à désirer que ces degrés fussent plus étendus & séparés de l'instrument ; degré de perfection qui se trouve dans l'instrument de M. de Parcieux. Ce célèbre Physicien voulant comparer exactement les pesan-

teurs spécifiques de différentes eaux, se servit du procédé suivant.

Il fit un pese-liqueur extrêmement volumineux ; c'étoit une espèce de cylindre de fer-blanc, lesté d'une quantité suffisante de plomb, & surmonté d'une tige de métal de 4 pieds de hauteur. La grosseur de son cylindre, ainsi que celle de la tige, étant bien proportionnée, il vit que la moindre différence dans la densité du liquide, occasionnoit un mouvement fort étendu dans le plongeur, qu'il mettoit dans un autre cylindre de 4 pieds de profondeur, & qu'il emplissoit du liquide dont il vouloit examiner la pesanteur spécifique. L'échelle de cet instrument étoit placée sur une règle qui excédoit la hauteur de ce dernier cylindre. Le zéro de la graduation répondoit à la surface de l'eau : or, la sensibilité de cet instrument étoit telle, que le plongeur mis dans l'eau de puits, son immersion répondoit à zéro ; & placé en-

suite dans l'eau de la Seine, il descendoit de 19 pouces plus bas. L'instrument de M. de Parcieux réunissoit donc deux avantages essentiels, une grande sensibilité, & une échelle détachée de la queue de l'instrument. Il étoit si sensible en effet, que quelques grains de sel, jettés dans l'eau, suffisoient pour faire monter le plongeur de plusieurs pouces.

Le seul défaut qu'on pût lui reprocher, étoit un vice de construction, dont l'auteur convient lui-même, & auquel on a remédié aisément, en substituant un plongeur & un vase de crýstal aux vaisseaux de fer-blanc qui pouvoient s'altérer dans l'eau. Nous en avons un de cette espèce, qui jouit de cette extrême sensibilité que nous admirons dans celui de M. de Parcieux, & qui est gradué selon la méthode de M. de Lanthénée: il a été construit par les soins de M. de la Fond, Professeur de Physique expérimentale, dont on con-

noît l'exaétitude , & qui a su profiter de ces deux méthodes , pour donner à cet instrument le degré de perfection qui lui manquoit jusqu'à ce jour.

L'eau entre comme principe dans presque tous les corps : les animaux & les plantes en contiennent abondamment : on la retire de tous les sels , des bitumes & du soufre ; elle existe dans tous les crystaux & les pierres les plus dures ; & quoiqu'on n'en puisse retirer des matières métalliques , il paroît cependant qu'elles en contiennent ; car toutes donnent de la flamme lorsqu'on les fait chauffer jusqu'à l'incaudescence. Le zinc notamment en donne une très-vive , & on fait que la flamme ne se produit que lorsque le phlogistique charie avec lui une portion d'humidité.

### *De la Terre.*

La terre est le principe le plus fixe des corps ; celui qu'ils laissent tous après



eur analyse. C'est une substance sèche, friable, qui ne se dissout point à l'eau, & qui, pour avoir les qualités de l'élément terreux par excellence, doit être altérable au feu. Mais il y a bien peu de terres de cette sorte ; presque toutes sont unies à des matières salines ou phlogistiques ; elles peuvent alors se changer en verre par l'action du feu. Les substances, qui jusqu'à présent paroissent avoir, dans le degré le plus éminent, les qualités de l'élément terreux, sont toutes celles que les Naturalistes ont nommées terres ou pierres vitrifiables ; c'est cette terre que Becher a connue, & qu'il a désignée sous le même nom de terre vitrifiable. Celle que ce Chymiste appelle terre inflammable ou phlogistique, n'est que le feu lui-même. A l'égard de la troisième espèce qu'il indique sous le nom de terre mercurielle, & qu'il dit exister dans l'acide marin & les matières métalliques, & à laquelle il attribue plusieurs

## 86 *Discours Préliminaire.*

phénomènes singuliers, dont on ignore la cause , on convient généralement que ce principe n'est que soupçonné, sans être bien connu.





# INTRODUCTION

A L'ÉTUDE

DES CORPS NATURELS,

TIRÉS

DU RÈGNE MINÉRAL.

**L**ES minéraux forment la masse du globe terrestre ; ils ne sont susceptibles ni de sentiment, ni de mouvement ; ils ne s'accroissent par le moyen d'aucuns organes intérieurs , mais par la *juxtaposition* de particules homogènes : ils ne se reproduisent point , & servent à la nourriture des plantes.

Avant de passer à l'examen détaillé des différens corps que renferme le règne minéral, il faut considérer un moment la surface de la terre, & voir,

## 82     *Introduction à l'Etude*

avec l'illustre M. de Buffon, quels sont les grands changemens qu'elle a éprouvés. Plusieurs agens peuvent altérer considérablement le globe terrestre.

Les eaux de la mer, agitées d'un mouvement de flux & de reflux, détachent continuellement de ses bords des portions de terre qui se trouvent emportées par les vagues, jusqu'à de certaines distances, où se précipitant, en vertu de leur pesanteur, sous la forme de sédiment, elles forment une première couche horizontale ou élevée, suivant la position du terrain sur lequel elles se déposent. Plusieurs couches venant à s'asseoir, de la même manière, les unes sur les autres, il se forme, dans le fond de la mer, des élévations composées de couches remplies des corps marins qui ont été ensevelis dans ces dépôts terreux.

Ces éminences du fond de la mer forment, comme le dit M. de Buffon, une longue suite de collines, disposées comme les ondes qui les ont produites ;

& lorsque, parvenues à une certaine hauteur, elles forment obstacle au mouvement général de la mer, il se forme des courans particuliers qui sillonnent des vallons entre ces montagnes.

Tous les Naturalistes conviennent assez généralement que la mer découvre tous les jours de nouveaux terrains, & qu'elle en recouvre une infinité d'autres. Le Pas de Calais paroît avoir été formé par une irruption de l'Océan. La Hollande n'est défendue que par des digues, & elle est toujours à la veille d'être submergée. Mais ce dont on ne convient pas également, c'est que les hautes montagnes soient formées de la même manière. Plusieurs Savans distinguent ce qu'ils appellent ancien & nouveau Monde. On ne trouve point dans l'ancien Monde ces couches régulières dont le nouveau est entièrement formé. Comme toutes ces couches ont été molles dans leur principe, elles s'affaissent peu-à-peu, & prennent une re-

traite plus ou moins considérable ; cette retraite produit des fentes perpendiculaires , dans lesquelles l'eau charie la matière des crysiaux & des stalactites.

Les eaux du ciel produisent encore des altérations très-sensibles ; elles détachent de dessus les hauteurs les portions de terre les plus friables , & les entraînant dans les fonds, elles taillent les montagnes à pic , & remplissent les vallées.

Les vents considérables qui se font sentir en différens pays , comme en Arabie , élèvent des montagnes de sable dont ils couvrent les plaines à des distances de plusieurs lieues ; ils déracinent les arbres , enlèvent les animaux , & font remonter les rivières.

Les tremblemens de terre produisent encore de grandes altérations dans notre globe. M. de Buffon soupçonne que c'est à l'affaïssement de cavernes considérables qu'on doit la formation de l'Océan Atlantique, les ouvertures du Caucaſe , des Cordillières & de l'Helleſpont.

Le feu, qui s'allume dans les entrailles de la terre & qui produit les volcans, change singulièrement la surface des pays où ils se trouvent ; il couvre le terrain de cendres & de matières brûlées, qui ne conservent plus aucun des caractères qu'elles avoient auparavant. Il forme des montagnes, souvent même dans une seule éruption. Milord Hamilton, ministre d'Angleterre à Naples, a fait part à la Société Royale de Londres d'excellentes observations sur les volcans, dans lesquelles il prouve que le *Monte-Nuovo*, qui est aux environs de Naples, a été formé d'une seule éruption du Vésuve.

Toutes les matières minérales se trouvent en masses énormes dans les montagnes anciennes ; elles sont disposées par couches horizontales dans les terres nouvelles ; souvent elles n'ont aucune forme ; quelquefois elles en affectent une très-régulière, comme on peut le voir par l'énumération suivante,

---

---

## CLASSE PREMIÈRE.

### TERRES. *TERRÆ.*

**L**ES terres sont des substances fossiles, qui n'ont ni saveur, ni odeur sensible; elles sont en général sèches; leurs parties ne sont point liées, ou n'ont entre elles qu'une adhérence foible, & qui permet de les réduire en poudre entre les doigts: elles forment les pierres en se durcissant. On les range sous quatre Sections.

---

### SECTION PREMIERE.

Terres vitreuses. Sables. *Terræ vitreæ.*  
*Arenæ.*

**L**ES sables sont composés de grains défunis, secs & durs; ils ne se laissent entamer, ni par le feu, ni par aucun menstree. Les Minéralogistes les ont nommés *terres vitrifiables*, parcequ'on



les emploie communément dans la fabrique du verre. M. d'Arcet, dans les nouvelles recherches qu'il vient de faire sur quantité de matières minérales, s'est assuré que ce nom ne leur convient pas, parcequ'elles ne fondent point par elles-mêmes, & que leur fusibilité est toujours dûe au fondant qu'on leur ajoute. Le nom de terres vitreuses paroît s'accorder mieux avec la dureté, l'indestructibilité & la transparence de chacun des grains qui les composent ; leur infusibilité, qui seule les distingue du verre, ne prouve rien autre chose, sinon que leur densité ne permet point au feu de les pénétrer assez pour les rendre fluides ; que c'est un verre fait par la nature, infiniment supérieur à tout ce que l'art peut produire de plus parfait en ce genre. On rencontre dans les sables une infinité de variétés pour les couleurs & pour les formes : tous n'ont pas, à beaucoup près, le même degré de pureté : les uns ne sont formés que de parties terreuses & pierreuses :

les autres contiennent une quantité plus ou moins grande de matières métalliques.

### G E N R E P R E M I E R.

Sables purs ou pierreux. *Arena*.

Les sables purs sont composés de petites parties vitreuses, souvent sans mélange; quelquefois aussi on y trouve de petites portions de pierres calcaires de mica ou d'argille qui les colorent, & leur ôtent quelques-unes des propriétés assignées aux sables bien purs.

### E S P E C E P R E M I E R E.

Sablon blanc, sablon quartzeux. *Arena quartzosa, particulis rotundis vel angulatis. WALL. Arena heterogenea, inæqualis, subrotundata. LINN.*

Les grains de ce sablon sont, ou parfaitement ronds ou anguleux: les uns sont assez gros; tel est celui qu'on connoît à Paris sous le nom de sablon d'Etampes:

d'Etampes : les autres sont beaucoup plus fins ; on les nomme alors sable en poussière & sablon mouvant : ce dernier ne diffère du précédent que par la petitesse de ses grains que le vent peut enlever facilement. On les trouve à la campagne, dans les traces de ces petits ruisseaux que forme la pluie ; ils sont tantôt blancs & tantôt gris : ils doivent cette couleur à quelques portions de terre étrangère.

E S P E C E. II.

Sablonjaune, sable des Fondeurs. *Glarea sterilis, fusoria.* WALL.

Ce sablon est d'une couleur jaune plus ou moins foncée ; il paroît contenir un peu d'argille ferrugineuse, qui le colore & le fait fondre plus facilement.

E S P E C E. III.

Gravier. *Arena particulis grossioribus, inæqualibus.* WALL. *Arena heterogenea difformis, angulata.* LINN.

Le gravier est formé de grains de

nature & de grosseur très-différentes : quelquefois ils sont vitreux & arrondis comme des perles ; souvent ils sont anguleux & mêlés de pierre à chaux & de paillettes de mica diversement colorées. Les Auteurs ont appelé, assez ridiculement, gravier mâle, celui dont les grains sont plus gros, & gravier femelle, celui dont les grains sont plus petits. Le gravier se fond en verre sans addition. On le trouve en beaucoup d'endroits dans le sein de la terre, au bas des montagnes, & dans le lit des rivières, avec les cailloux qui ont été roulés par les eaux.

## G E N R E II.

Sables métalliques. *Arena metallica.*

Les sables métalliques sont tous très-colorés ; on y rencontre des parcelles de métal, mêlées aux grains de terre vitreuse : on peut les fondre tous sans addition ; mais le verre qu'on en ob-

tient est toujours teint : on peut aussi en retirer le métal en les traitant avec des fondans convenables , sur-tout lorsqu'ils sont riches.

On les trouve en poussière ou en masses très-friables.

E S P E C E I.

Sable d'étain. *Arena stannea*. WALL.

Le sable d'étain est d'une couleur rouge, tirant sur le violet; il fournit un verre laiteux ; on peut en séparer l'étain, en le fondant avec des matières grasses, après l'avoir grillé.

E S P E C E II.

Sable ferrugineux. *Arena ferrea*. WALL.  
*Arena ferri atra*. LINN.

Le sable qui contient du fer est, ou noir, ou d'une couleur de rouille plus ou moins foncée : ce dernier est plus pauvre que le premier, qui est attirable à l'aiman. Le verre qu'on retire de ce sable est différemment coloré, en

verd, en brun, en noir, suivant la proportion du fer qui s'y trouve, & l'exactitude de la fusion.

### E S P E C E I I I.

Sable cuivreux. *Aréna cuprifera*. BOM.

M. Valmont de Bomarè, dans sa *Minéralogie*, dit qu'on trouve à Saint-Domingue un sable de couleur verte, jaunâtre & bleuâtre qui contient des particules de cuivre & un peu de fer.

### E S P E C E I V.

Sables aurifères. *Arena aurea*. WALL.  
*Aréna auri difformis*. LINN.

On trouve l'or mêlé au sable dans plusieurs fleuves & rivières; tels que le Rhin, le Rhône, le Doux, le Gardon, la Garonne, le Salat & l'Ariège, qui en a tiré son nom. On lit dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1761, que le sable d'or que roule l'Ariège est commun dans tout le terrain qui avoisine cette rivière;

qu'on le trouve dans plusieurs endroits du Languedoc & au pays de Foix ; que la ville de Pamiers est bâtie sur une semblable terre aurifère , composée de grains rougeâtres & d'autres plus blancs , qui paroissent formés du débris de cailloux & de pierres quartzeuses , qui servent de gaugue à la mine d'or.

A l'égard des sables décrits sous le nom de sable stérile, ce sont ceux qui ne contiennent point de substances étrangères qui puissent en faciliter la fusion.

### *Usages des Sables.*

Le gravier est employé pour paver les jardins , les caves , les fontaines ; on le mêle avec la chaux éteinte pour en faire le mortier. Le sablon quartzeux sert de bain en Chymie. On fait avec le sablon fin des horloges horaires. Le sablon jaune ou argilleux est d'usage chez les Fondateurs pour former leurs moules : il est d'autant plus propre à ces sortes d'ouvrages , qu'il peut prendre une certaine liaison à l'aide des

portions d'argille qu'il contient ; son grain étant d'ailleurs assez égal , les pièces de fonte qu'on y coule n'en sortent point rayées

Le principal usage des sables est leur emploi dans la verrerie : toutes les espèces de ce genre , même celles qui sont le moins fusibles, peuvent le devenir par l'addition de certaines matières , nommées *fondans* par les ouvriers : telles sont les terres calcaires & argilleuses, les sels alkalis , le borax, le sel fédatif, le nitre , les sels séléniteux , l'arsenic, toutes les chaux métalliques, & sur-tout celles de plomb. Ces substances , moins compactes que le sable avec lequel on les mêle, se laissent facilement pénétrer par la chaleur ; elles se dilatent, se liquéfient , & forment un bain de feu autour de chaque grain, qui se trouve attaqué séparément, & fondu avec beaucoup plus d'efficacité que ne l'eût pu faire le feu le plus violent appliqué à une masse plus considérable.



La dose de chacun des fondans se règle sur leurs différens degrés de fusibilité, & sur la nature des sables qu'on veut traiter ; il faut plus de terre que de sel, moins d'arsenic ou de chaux de plomb que des autres chaux métalliques, pour qu'il en résulte une masse qui unisse à la plus grande solidité une transparence parfaite, qualités nécessaires pour constituer un beau verre ; que le feu ne produit pas, mais dégage seulement de chaque grain de sable, qu'on doit regarder comme un globule de verre, & qu'il réunit en une masse par la fonte, comme des grains de plomb qu'on rassembleroit en un culot par le même moyen.

Tout ce qui se fabrique dans lesdites manufactures n'a pas, à-beaucoup-près, le même degré de perfection, & ces différences tiennent autant aux matières qu'on y emploie qu'à la durée de la fusion, dont l'effet est de séparer les parties étrangères, qui, étant beaucoup moins denses que le

verre, viennent nager à la surface, en une masse moins fluide & moins transparente, qu'on enlève & qu'on connoît sous les noms de laitier, de fiel & de sel de verre. Si le sable & les fondans qu'on a choisis sont très-purs, comme un sel alkali bien net & un très-beau sable quartzeux, les scories sont peu abondantes & se séparent plus vite. Si au contraire on s'est servi de cendres & de sables colorés, quoique la fusion en soit plus prompte, il faut beaucoup plus de temps pour dégager ces scories, qui sont en plus grande quantité. Il arrive souvent même que malgré l'exactitude & la durée de la fusion, le verre reste teint par des portions de métal qui se sont combinées avec lui. Les ouvriers, pour corriger ce défaut, ajoutent dans la fonte un peu de manganèse qu'ils appellent le *savon*.

Quelque parfait que soit le verre, même celui que les ouvriers nomment *crystal*, il est encore fort inférieur aux cristaux que la nature produit ; il retient  
 toujours.

toujours un peu des fondans qu'on a employés dans la fabrique , ce qui lui donne de la fusibilité & la propriété d'être attaqué par différentes substances ; défaut plus sensible encore dans les verres bruns & tendres , que dans les autres.

M. de Réaumur a donné dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences* , année 1739 , un moyen d'ôter au verre sa transparence , & de le convertir en une espèce de mauvaise porcelaine vitreuse : il suffit pour cela d'emplir de plâtre une bouteille de verre noir , de la mettre dans un creuset également plein de plâtre , & de l'exposer à un feu violent pendant plusieurs heures.

Les sables métalliques ne servent que lorsqu'ils sont riches ; on les allie aux autres mines métalliques & on les exploite avec elles.



## SECTION II.

Terres calcaires. *Terra calcarea.*

LES terres calcaires sont formées de parties très-fines, plus ou moins étroitement liées entr'elles ; elles salissent les doigts lorsqu'on les touche ; se dissolvent avec effervescence dans les acides , & se fondent toutes en verre sans addition ; mais elles exigent un degré de feu très-violent. M. d'Arcet, qui a éprouvé un grand nombre de substances calcaires , n'a pu faire couler la craie de Champagne, & la chaux éteinte ; mais M. Macquer en est venu à bout.

## G E N R E I.

Craie. *Creta.*

La craie forme des masses plus ou moins solides, qui ne sont pas toujours également pures ; les matières qui s'y trouvent mêlées en font varier beau-

coup la consistance & la couleur. On trouve cette terre en couches horizontales, communément entrecoupées par des bandes de pierres à fusil noires, enduites de la matière même de la craie; quelquefois aussi on y rencontre par lits, ou éparfés & sans ordre, des coquilles qui souvent ont pris la consistance du caillou & de l'agate.

L'origine de la craie n'est point encore bien connue: plusieurs Minéralogistes, & Henkel à leur tête, croient qu'elle est une terre de première création; d'autres veulent qu'elle se produise journellement; mais ils ne sont pas d'accord sur les principes qui servent à la former. Les uns l'attribuent au débris des coquilles & autres corps que la mer laisse sur les terres qu'elle découvre; ils fondent leur opinion sur l'égale épaisseur des couches qui paroissent avoir été déposées, comme le sont les sédimens des eaux. Les autres observant que les coquilles & autres corps marins, ne se trouvent pas abon-

damment dans la craie, croient que les cailloux peuvent se dénaturer & se convertir en cette substance. Rien n'est plus commun, disent-ils, que de voir des cailloux enduits d'une croûte blanche à l'extérieur, plus épaisse du côté qui est exposé à l'air, & plus mince du côté qui regarde la terre; cet enduit est de nature parfaitement calcaire à sa superficie; mais lorsqu'on approche davantage du centre, il ne paroît pas encore être entièrement passé à l'état de craie.

A l'égard de l'agent qui dénature ainsi les cailloux, dont l'extrême dureté résiste au feu le plus violent, ce ne peut être que l'action combinée du soleil & de la pluie; le premier dilatant sans cesse les pores de ces corps, l'eau les pénètre, les divise, & les atténue de plus en plus. Il est vrai que cela doit être très-long; car des cailloux mis en expérience à l'air, pendant deux ans entiers, ne sont pas sensiblement changés, seulement leur surface pa-



roît un peu ternie ; mais qu'est-ce que ce peu de temps pour la nature, qui ne compte point les siècles qu'elle emploie à changer la superficie de notre globe. S'il étoit possible d'appuyer cette idée sur une expérience journalière de la Chymie, cette science nous offre des moyens de diviser singulièrement le caillou, & d'en obtenir une terre blanche très-légère, qui se dissout dans les acides avec effervescence, & qui se fond en verre ; propriété que n'avoit pas le caillou avant d'être attaqué, & qui rapproche beaucoup sa substance de celle de la craie.

E S P E C E I.

Craie blanche. *Creta cohærens, solida*, WALL. *Calx solubilis, impalpabilis, cohærens*. LINN.

La craie blanche est la plus commune, on la nomme craie friable, *creta non Saxosa*, WALL. ou craie dure, *creta dura, Saxosa* ; WALL. gurr de craie, *creta fluida*, WALL. quand elle est éten-

due d'eau ; lait de lune, ou agaric minéral, *lac lunæ subterraneum*, WALL. lorsqu'elle se dépose, entre les fentes des rochers, en une poussière très-fine, & d'un blanc de lait. On lui donne encore le nom de farine fossile, *lac lunæ solare*, WALL. mais elle ne diffère pas bien sensiblement du lait de lune, qui a seulement un peu plus de consistance. Ce qu'on appelle fleur de de chaux, *calx nativa*, *aquis supernatans*, *vel mixta*, WALL. n'est qu'une craie blanche & légère, qui nage à la superficie de certaines eaux thermales. WALL. parle d'une craie blanche d'Angleterre, qu'il nomme *cretæ aquæ frigida effervescens* ; cette craie, selon son rapport, s'échauffe avec l'eau, au point qu'on y peut cuire des œufs : on ne sait si cette propriété dépend de la nature de la craie, ou de quelque accident particulier.





E S P E C E II.

Craie d'un blanc sale. *Creta fragilior, grossior & rudis alba.* WALL. *Calx solubilis pulverea.* LINN.

Cette craie ne paroît différer de la précédente que par l'interposition de quelques corps étrangers : on en trouve en Suède , en Saxe , dans la Westrogothie , dans la mine de Cellerfeld , au Hartz.

E S P E C E III.

Craie jaune. *Creta flaves cens.*

On en trouve en Saxe , à S. Johan , au bain de Schinznach près Berne.

E S P E C E IV.

Craie rouge. *Creta rubra.*

E S P E C E V.

Craie verte. *Creta viridis.* WALL.

E S P E C E VI.

Craie noir. *Creta nigra.*

On en trouve à Osnabruck.

## G E N R E I I.

Falun ou Cron. *Arena conchacea.*

WALL. *Calx solubilis furfuracea.*

LINN.

Le falun diffère de la craie par la quantité de coquilles brisées qui le composent, & qui ne laissent aucun doute sur son origine. On en rencontre souvent de très-entières, qu'on conserve dans les cabinets sous le nom de *coquilles fossiles*. Les unes sont absolument de la nature de la craie; les autres ont encore conservé un peu de leur brillant; mais toutes ont perdu leurs couleurs. La falunière la plus connue est celle de Touraine, qui peut avoir neuf lieues quarrées de surface.

## E S P E C E I.

Terre coquillière. Falun. *Humus animalis non terrifica.* WALL. *Calx solubilis furfuracea.* LINN.

On peut ranger à la suite des indi-

vidus de cette espèce les coquilles fossiles, qu'on divise, comme les coquilles marines, en trois ordres.

PREMIER ORDRE. *Coquilles univalves* ou *cochlites*. M. d'Argenville en fait quinze familles; on leur conserve à la plupart leur dénomination, en changeant seulement la terminaison de leur nom.

1. Lépas ou Patelles. *Lepadites*, *Patellites*.

2. Oreilles de mer. *Haliotites*.

3. Tuyaux. *Tubulites*. *Vermiculites*. *Dentalites*.

4. Nautilus. *Nautilites*.

On doit joindre à ce genre, celui de la corne d'Ammon ou *Ammonite*, dont plusieurs espèces se rapportent parfaitement à des nautilus connus, qu'on ne trouve que dans la mer des Indes, suivant les observations de M. de Jussieu, rapportées dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1722.

5. Limas à bouche ronde. *Cochlites*.

6. Nérites. *Neritites*.

7. Sabots. *Trochilites*.

106 *Introduction à l'Etude*

8. Rouleaux. *Cylindrites*.

9. Cornets. *Volutites*.

10. Vis. *Strombites*.

11. Buccins. *Buccinites*.

12. Rochers. *Muricites*.

13. Pourpres. *Purpurites*.

14. Porcelaines. *Porcellanites*.

15. Tonnes. *Globosites*.

DEUXIEME ORDRE. *Coquilles bivalves*  
ou *conchites*, il renferme six familles.

1. Huîtres. *Ostracites* ou *Gryphites*.

2. Cames & Tellines. *Chamites*. *Tellin-*  
*nites*.

3. Cœurs. *Bucardites*.

4. Peignes. *Pectinites*.

5. Moules. *Musculites*.

6. Manches de couteau. *Solenites*.

TROISIEME ORDRE. *Coquilles mul-*  
*tivalves*. On en fait six familles.

1. Ourfins. *Echinites*.

2. Pholades. *Pholadites*.

3. Glands de mer. *Balanites* & *Glan-*  
*dités*.

4. Conches anatifères. *Anatites*.

5. Pouffe-pieds.

6. Oscabrions.

On doit ajouter aux coquilles fossiles les coraux altérés dans leur couleur & dans leur dureté, les madrepores & autres habitations de polypes, l'ivoire fossile, ou unicorne fossile, noms donnés indistinctement à toute sorte de matières osseuses, demi-décomposées; mais principalement aux défenses des éléphans & à leurs dents molaires, trouvées dans la terre.

La turquoise est encore une substance très-analogue à l'unicorne fossile; c'est un os coloré en bleu plus ou moins foncé, qui avec le temps passe au vert. Celles qui sont dures & d'un beau bleu, prennent le nom de *turquoises orientales*, ou *turquoises de vieille-roche*; lorsqu'elles sont plus pâles ou plus tendres, on les nomme *occidentales*, ou de *nouvelle-roche*. M. de Réaumur a donné un Mémoire sur les turquoises, imprimé dans le *Recueil de l'Académie des Sciences*, année 1715, où il attribue leur formation à des dents d'animaux, blanches, jaunes ou grises, marquées de

petits points d'un bleu très-foncé, que le feu développe ensuite & répand dans toute la pierre qu'on calcine. Les minières qui fournissent ces turquoises, se trouvent en France, dans le Bas-Languedoc, proche la ville de Simore & aux environs.

Il paroît que les dents ne sont pas les seules parties qui peuvent fournir des turquoises, & que le feu n'est pas toujours nécessaire pour leur donner leur couleur bleue. On conserve dans le Cabinet du Roi, la main d'une femme, dont les dernières phalanges sont des turquoises bleues; & il ne paroît pas que cette main ait souffert l'action du feu d'un fourneau, car elle porte encore des restes de chair desséchée, qui en auroit été détruite.

Les plus belles turquoises viennent de la Perse, & selon M. de Réaumur, elles diffèrent de celles de France, en ce que l'eau-forte, qui dissout très-bien celles-ci, n'agit point sur les autres. L'eau régale agit aussi différem-

ment sur ces deux sortes de pierres ; elle dissout entièrement les nôtres, & réduit celles de Perse en une espèce de pâte plus blanche que n'étoit la turquoise.

On doit encore ranger ici les crapaudines, qui sont de petits corps durs, vides dans leur intérieur, d'une couleur grise, tirant plus ou moins sur le jaune & sur le noir, & qu'on avoit regardées comme des pierres précieuses du second ordre. M. de Jussieu a développé leur origine dans un Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie des Sciences, en 1723 ; il reconnoît que ces pierres ne sont que les couronnes des dents d'un poisson appelé *grondeur*, qui se trouve dans la mer du Brésil. Il en est de même des pierres qu'on appelle *yeux de serpens* : celles-ci sont formées par les dents incisives, & les premières par les dents molaires qui sont plus grosses,



*G E N R E III.**Marne. Marga.*

Le nom de marne a été donné assez indistinctement par les cultivateurs à toutes les espèces de terres dont le mélange peut améliorer un sol, quoiqu'elles soient souvent de nature très-différente. Dans le Dictionnaire encyclopédique on a restreint ce mot à une espèce de craie très-fine. Wallérius, dans sa *Minéralogie*, veut qu'on appelle marne un mélange de craie & d'argille : les caractères qu'il en donne sont assez faciles à reconnoître, aussi est-ce d'après lui qu'elles se trouveront rangées ici.

*E S P E C E I.*

Marne blanche. *Glischo-Marga.* WALL.  
*Argilla mixta, pallida, acido efferves-*  
*cens.* LINN.

On en trouve en France aux environs d'Alençon ; c'est le kaolin dont on se



fert pour la porcelaine de ce pays ; cette marne n'est pas pure, elle contient un peu de mica & une assez grande quantité de sable quartzeux : lorsque cette terre se rencontre dans les fentes des rochers, on la nomme *steno-marga*.

E S P E C E II.

Marne grise. *Leneargilla cinerea*. WALL.

Elle diffère peu de la précédente.

E S P E C E III

Marne jaune. *Marga giallolina*. WODW.

E S P E C E IV.

Marne rouge. *Capnumargos*. WALL.

On trouve une semblable terre qui se décompose à l'air, dans le schiste de Stygfors, paroisse de Ratwick, en Dalécarlie.

E S P E C E V.

Marne brune. *Marga fusca*. WALL.

E S P E C E VI.

Marne noire. *Marga nigrescens*. WALL.

## E S P E C E VII.

Marne bleuâtre. *Marga cœrulescens*.  
WALL.

## E S P E C E VIII.

Marne verte. *Marga viridescens*. WALL.

On en trouve à Chemnitz en Hongrie.

La marne fait effervescence avec les acides, comme la craie ; mais l'effervescence est ordinairement moins vive ; elle a plus de ténacité & plus d'onctuosité que la craie : on en trouve quelques échantillons qui peuvent former avec l'eau, une pâte plus ou moins ductile. La marne se fond à un feu médiocre, en une masse opaque ou espèce d'émail ; mais à un feu plus fort, elle fournit un très-beau verre.

La marne que Wallérius décrit sous le nom de *marne pétrifiable*, ne paroît pas fort différente du tuf, dont il sera question en parlant des pierres calcaires. La marne vitrifiable n'a point de caractère

caractère décidé , toutes ayant la possibilité de se convertir en verre , plus ou moins aisément.

*Usage des Terres calcaires.*

On mêle la craie , le falun & la marne aux terres grasses & fortes pour les rendre plus meubles & plus faciles à se laisser pénétrer par les racines tendres des jeunes plantes. On peut faire une bonne chaux avec la craie , le falun & les coquilles fossiles.

On prépare une forte de blanc en petits pains , en broyant la craie dans de l'eau : la partie la plus pesante se précipite ; on décante l'eau trouble ; on la laisse déposer lentement jusqu'à ce qu'elle soit devenue claire ; puis , après l'avoir versé doucement , on met en pains la terre qui se trouve au fond du vase , & on la fait sécher. Ce blanc est d'usage dans la Peinture. La Médecine peut aussi employer les terres calcaires , comme des absorbans dans les aigreurs de l'estomac ; mais en général

ces terres sont pesantes, & on ne les ordonne qu'au défaut d'autres médicamens. On fait avec la marne des pipes & des fayances. On polit les yeux de serpent, les crapaudines & les turquoises. On peut enlever à celles de France leur couleur, en les faisant macérer dans le vinaigre ou le jus de citron. Les acides minéraux ne peuvent point avoir la même action, au rapport de M. de Réaumur.

---

### S E C T I O N III.

Terres argilleuses. *Terra argillacea.*

**L**ES parties de l'argille sont fines & bien liées : ces terres sont communément en très-grandes masses, & lorsqu'elles se séchent, elles forment des feuillets appliqués les uns sur les autres : elles se dissolvent routes dans l'eau & se durcissent au feu, & prennent une dureté qui les rend capables de faire feu avec l'acier. Elles ne se fondent pas

en verre lorsqu'elles sont bien pures, & celles qui coulent ne le font que très-difficilement. Il y a parmi les argilles deux genres fort différens.

# G E N R E I.

Terres argilleuses, grasses ou ductiles. *Terra glutinosa*. WALL.

Les argilles grasses se reconnoissent à leur mollesse & à leur onctuosité, qu'elles conservent encore long-temps après avoir été tirées de la terre. Elles se dissolvent dans l'eau, même froide, lorsqu'on les mêle avec une assez grande quantité de ce fluide ; mais lorsque cette quantité est plus petite, elles forment une pâte molle & ductile qu'on peut tourner, & à laquelle on peut donner, dans des moules, une forme qu'elles gardent en séchant. Ces terres prennent beaucoup de retraite, & sont sujettes à se fendre, lorsqu'elles n'ont que peu de liant.

## E S P E C E I.

Argille blanche. *Argilla alba vix vitrescens, in igne colorem retinens, indurata.* WALL. *Argilla apyra, arida.* LINN.

Cette argille est la plus pure de toutes ; elle a assez de liant & ne fond point au feu : on en trouve dans les environs de Châteaudun. Elle entre dans la composition d'une porcelaine qu'on fabrique dans ce pays.

Aux environs du Port-Louis en Bretagne, on en rencontre une très-blanche, mêlée d'un peu de sable & de mica.

A Sufy, en Picardie, une blanche, dont on se sert pour faire les pots de la glacerie de Saint-Gobin.

A Maubeuge, une blanche dont on fait le grès fin de Flandre.

Aux environs de Dunkerque, une d'un gris blanchâtre, dont on fait des pipes.

Il y en a encore de blanche en Alsace,

& en diverses Provinces de France, dans la Flandre Autrichienne, le Danemarck, &c.

Toutes ces argilles, quoique les plus pures qu'on connoisse, sont mêlées de sable, de mica & de quelques parties ferrugineuses, qui y forment des taches jaunes qu'on doit enlever avec soin avant de délayer la terre dans l'eau ; car alors elles se répandroient dans toute la masse, sans qu'il fût possible de les en dégager. Toutes ces argilles deviennent très-blanches à un feu médiocre ; mais lorsqu'elles sont chauffées fortement, elles perdent beaucoup de leur blanc.

E S P E C E II.

Argille grise. *Bolus cinerea.* WALL.

L'argille grise ne diffère de la blanche que par une nuance dans la couleur ; quoiqu'elle soit en apparence moins pure, elle a cependant beaucoup plus de liant. On trouve de ces sortes d'argilles en France ; à Villantraud,

près Montmireil , on en fait des pots pour les verreries ; à la Bellière , en Normandie , on s'en servoit autrefois pour faire les pots dans la glacerie de Saint-Gobin ; à Savigny , près Beauvais en Picardie , on en fait la plus grande partie des poteries de grès qu'on vend à Paris. On tire une argille d'un gris-brun dans les environs de Gournai en Normandie ; une d'un gris-brun très-foncé , presque noir , sur le chemin & à la montagne de Moret : on en fabrique une poterie de terre blanche , façon d'Angleterre , à Montereau & à la manufacture du Pont-aux-choux à Paris. On trouve encore de ces argilles , suivant le rapport de Wallérius , à Lignitz , à Maffel & à Landbach : la terre de Patna , près du Gange , dont on fait des vases légers , connus sous le nom de *gargoulettes du Mogol* , est de cette espèce.





E S P E C E III.

Argille jaune. *Bolus flava*. WALL. *Argilla flavescens punctulis maculisque ferreo-ochraceis*. LINN.

On en trouve en France dans les environs de Blois & de Saumur.

E S P E C E IV.

Argille de couleur rouge-pâle. *Bolus colore carneo*. WALL. *Argilla incarnata, fracturis glaberrimis*. LINN.

Cette espèce prend le nom de terre de Lemnos : on la nomme aussi *terre figillée*, parcequ'on la vend dans les boutiques des droguistes en petits pains ronds, portans l'empreinte d'un cachet.

E S P E C E V.

Argille rouge. *Bolus rubra*. WALL.

On en trouve en Bohême, en Perse ; on la vend chez les droguistes sous le nom de *bol d'Arménie* ; elle est d'un rouge

120 *Introduction à l'Etude*

safrané : on en trouve aussi en France ,  
mais elle est plus pâle : on fait les vases  
de boucarot avec une semblable terre.

E S P E C E VI.

Argille bleue. *Argilla vitrescens rudis.*

WALL. *Argilla humido cœrulescens ,*  
*ustione rufescens.* LINN.

On en trouve dans les environs de  
Paris , près Vaugirard ; elle rougit au  
feu , & se fond à son extrême violence  
en une scorie noirâtre.

E S P E C E VII.

Argille verte. *Argilla colorata viridescens.*

WALL.

Cette argille est celle qui sert aux  
dégraisseurs : on en trouve aux environs  
de Reims & de Vienne.

E S P E C E VIII.

Argille noire. *Bolus nigra.* WALL.

Cette argille est assez commune dans  
les environs de Paris : elle blanchit au  
feu.

ESPECE.

E S P E C E IX.

Argille marbrée. *Argilla ad instar marmoris variegata.*

Cette argille est communément marbrée de rouge & de gris. Elle est commune dans les environs de Paris : on en trouve quelquefois qui est grasse, & ressemble à du savon.

G E N R E II.

Argilles sèches & non ductiles. *Terra argillacea sicca & non glutinosa.*

Les argilles sèches sont feuilletées comme les autres ; mais leur grain est plus grossier : elles ne peuvent pas former avec l'eau de pâte ductile, mais elles s'y dissolvent en partie, & la rendent un peu laiteuse.



## E S P E C E I.

Argille sèche, grise & feuilletée. Argille à foulon. *Argilla pinguis*, in bracteis dehiescens, & in aere deliquescent. WALL. *Argilla fissilis*, friabilis, lubrica, in aqua spumans. LINN.

Cette argille est d'un gris clair, marquée de petites taches noires sur les tranches ; elle est assez douce au toucher ; elle se sèche facilement à l'air, & se partage en feuillets. Lorsqu'on la mêle en poudre dans de l'eau, elle la rend laiteuse & y forme des bulles, comme le savon. On peut s'en servir pour fouler les étoffes : on en trouve beaucoup à Montmartre, près Paris.

## E S P E C E II.

Argille sèche, grenue & rougeâtre, tripoli. *Glarea, indurata, cohærens, aspera*. WALL. *Argilla scabra, nitidula, flavescens, inquinans*. LINN.

Le tripoli a toujours à-peu-près la même consistance ; il ressemble à un

du Règne Minéral. 123

amas de sable fin, lié par une petite portion d'argille : il est de couleur isabelle-rougeâtre.

E S P E C E III.

Argille sèche, grenue & grise, tripoli gris. *Tripela alba.*

Il ne diffère du précédent que par sa couleur blanche ou grise.

E S P E C E IV.

Argille sèche, grenue & noire. *Tripela nigra.*

Ce tripoli ne diffère des autres que par sa couleur noire, qu'il perd dans le feu. On trouve ce tripoli en Bretagne & à Menat en Auvergne. M. Guettard a donné la description des carrières de cet dernier endroit, dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1755.



## E S P E C E V.

Argille sèche & friable, pierre pourrie. *Argilla parùm cohærens, exsiccata, farinacea.* WALL.

Cette argille est d'une couleur grise cendrée, d'un grain plus fin & moins lié que le tripoli; les couches y sont aussi moins sensibles.

L'argille réfractaire de Wallérius, celle qui se gonfle à l'eau & qui se trouve dans le Helsingland, l'argille à potier, &c. ne diffèrent que par des qualités accidentelles, qui ne changent en rien la nature de la terre argilleuse.

*Analyse des Argilles.*

Les argilles sont composées d'une terre analogue à celle du sable quartzeux, altérée par l'acide vitriolique, & réduite, pour ainsi dire, à l'état d'un sel avec excès de terre.

Les argilles se dissolvent dans l'eau, à l'exception d'une portion de sable qui s'y trouve mêlée, sans être altérée par

l'acide : cette portion est plus abondante dans celles qui sont blanches. Les argilles colorées doivent leur couleur à des pyrites qu'elles renferment, & qui, pour la plupart, se décomposent.

Les argilles répandent, lorsqu'on les calcine, une forte odeur d'acide sulfureux volatil.

La dissolution d'argille dans l'eau, filtrée & évaporée, fournit une espèce de cristallisation en feuillets minces.

L'alkali fixe, versé sur la dissolution d'argille, en précipite une terre blanche, qui se dissout facilement dans les acides, lorsqu'elle est encore humide ; mais en séchant elle prend beaucoup de retraite, se durcit, & devient plus difficile à dissoudre dans les mêmes acides, avec lesquels elle fait un petit mouvement d'effervescence.

La liqueur dont on a précipité la terre fournit par l'évaporation, du tartre vitriolé, du sel de glauber, ou du sel ammoniacal vitriolique, suivant la nature de l'alkali qu'on a employé

pour saturer l'acide & précipiter la terre.

L'acide vitriolique appliqué à une masse d'argille, n'a point sur elle une action sensible ; mais lorsqu'on en verse dans la dissolution de cette substance , il sature la portion terreuse surabondante, & on ne retire plus par l'évaporation ces feuillets argilleux, mais des cristaux de véritable alun.

L'acide nitreux dissout la terre des argilles , à-peu-près comme le fait l'acide vitriolique ; le sel qui en résulte cristallise difficilement, & a une saveur styptique très-forte.

L'acide marin appliqué à la terre des argilles, la dissout, & forme avec elle un sel en petites aiguilles d'une stypticité considérable.

Les acides végétaux ont aussi de l'action sur la terre des argilles.

La terre qu'on a précipitée de la liqueur des cailloux par le moyen d'un acide , présente les mêmes phénomènes que la terre qui fait la base des argilles



& de l'alun ; ce qui prouve complètement l'identité de ces substances.

*Usage des Argilles.*

Les argilles deviennent de très-bonnes terres de culture , pourvu qu'elles soient convenablement divisées , & rendues plus meubles par le mélange des terres légères , & par le labour fréquent : elles sont même de toutes les terres les plus propres à entrer dans la végétation , comme l'a fait voir M. Baumé , dans son savant *Mémoire sur les Argilles* ; ce Chymiste a retiré un véritable alun , en faisant macérer dans l'acide vitriolique les cendres bien lessivées de plusieurs plantes. Il a fait plus , il a démontré que la terre argilleuse existoit dans les os des grands animaux ; soit qu'on les fasse macérer dans l'acide vitriolique lorsqu'ils sont entiers , ou qu'après les avoir calcinés on les fasse dissoudre dans cet acide , on en obtient toujours des cristaux d'alun , & une

espèce de sel séléniteux, beaucoup plus dissoluble dans l'eau que la sélénite ordinaire. La terre précipitée de cette sélénite, par le moyen d'un alkali, est fort voisine de l'état de craie; mais elle n'est cependant pas capable de se convertir en chaux vive.

Les argilles servent en Chymie pour décomposer les sels nitreux & marins: on retire, en lessivant le résidu de la distillation du nitre par cet intermède, un vrai tartre vitriolé, & du sel de glauber de celui qui reste après la distillation du sel marin.

L'usage de la terre de Lemnos a été autrefois fort célèbre en Médecine; mais aujourd'hui on ne l'emploie que rarement.

Le bol d'arménie est d'un usage plus fréquent: on le recommande à l'intérieur comme astringent dans les hémorragies, à la dose de quelques grains, sous la forme de pillules, ou mêlé dans des boissons. On l'applique avec succès à l'extérieur, pour arrêter le sang des plaies

& les consolider ; il agit à raison de l'acide vitriolique , & du fer qu'il contient.

Les arts emploient beaucoup les différentes sortes d'argilles : les dégraisseurs s'en servent pour ôter les taches d'huile & de graisse qu'elles absorbent avec beaucoup de facilité.

Les Sculpteurs en font des figures & des vases , qu'ils laissent sécher & qu'ils cuisent ensuite pour leur donner de la solidité.

Les tuiles , les briques , les carreaux se font avec de l'argille , qu'on met en forme dans des moules , & qu'on cuit après les avoir fait sécher. Toutes ces matières se colorent communément en rouge lorsqu'elles sont cuites , parce qu'on emploie pour les faire des argilles chargées de pyrites martiales , qui se calcinent par la violence du feu ; & même lorsqu'elles en contiennent beaucoup , & qu'elles sont exposées dans l'endroit le plus chaud du four , elles se couvrent d'une lame vitrifiée , colorée en bleu ou en verd.

L'argille bleue des environs de Paris, mêlée avec des fragmens de pots à beurre, forme la pâte dont on fabrique tous les fourneaux des laboratoires de Chymie, & les creusets qu'on nomme *creusets de France*. La cuisson qu'on donne à ces fourneaux n'étant que foible, ils ne prennent en cuisant qu'une légère couleur rougeâtre, & sont sujets à se fendre, lorsqu'on les chauffe un peu brusquement.

On fait avec une semblable argille bleue des vases minces, qui, par une cuite plus forte, deviennent très-rouges : tels sont les pots pour les Jardiniers, les chauffrettes & autres ustensiles qui ne sont point destinés à retenir d'eau. Lorsqu'on veut les rendre propres à cet usage, on les enduit d'une couche de chaux de plomb, mêlée à quelques autres chaux métalliques, qui produisent, par la fusion, un enduit vitreux de différentes couleurs : le fer en donne une brune & le cuivre une verte : on nomme ces poteries *terres vernissées*.

Il est des argilles fines dont on fait des vases légers, & d'une forme agréable, comme sont ceux qui se fabriquent à la manufacture du Pont-aux-choux à Paris. On jette dans les fours où se cuisent ces poteries, une certaine quantité de nitre & de sel marin, ce qui suffit pour les enduire d'une couverte vitrée très-mince.

Les poëles & autres ustensiles, qu'on dit être de fayance propre à aller au feu, ne sont autre chose que des poteries de terre commune, qu'on enduit d'une couverte d'émail, comme la véritable fayance : cette couverte se fait avec le sable, un sel alkali & la chaux de plomb, fondus en un verre dont on a troublé la transparence par une petite portion de chaux d'étain, qui n'entre pas en fusion aussi facilement.

On broie l'émail dans l'eau ; on en forme une pâte liquide dont on couvre la superficie du vase desséché : l'humidité est absorbée par les pores du vaisseau, & lorsqu'il est bien sec, on le met

au feu pour le cuire & faire fondre la couverte qui s'y applique plus exactement. Lorsqu'on veut dessiner sur cette couverte des fleurs ou des figurés, on broie à la gomme les chaux métalliques colorantes avec la chaux de plomb, on trace les dessins, puis on met de nouveau les pièces au feu pour fondre la chaux de plomb, qui forme une couverte sur les parties colorées. Les dessins bleus se font avec la cendre de cobalt; & comme cette couleur n'est point altérable au feu, on peut peindre les pièces avant de les faire cuire.

La base de toutes ces poteries étant moins dense que la couverte, elles sont dilatées par la chaleur d'une manière fort inégale; aussi sont-elles sujettes à se fendiller & à s'en aller par écailles.

On fait les poteries de grès en mêlant à l'argille une certaine quantité de sable, qui lui donne de la consistance, & diminue sa porosité: ces sortes de poteries prennent au feu le caractère d'une vitrification commencée, & ac-

quièrent une très-grande dureté ; elles sont comme le verre sujettes à se casser , en passant subitement du froid au chaud.

On fabrique avec une semblable pâte les cruches, les cornues , les creusets d'Allemagne.

La poterie de grès , enduite d'émail , forme la véritable fayance.

La porcelaine n'est qu'une fayance dont la pâte est plus belle , & conserve bien son blanc après la cuite : cette pâte se nomme *biscuit* ; la couverte qu'on met dessus est très-brillante , & les dessins dont elle est ornée sont très-exacts. On fait cuire cette poterie avec soin , dans des étuis de terre nommés *cafettes* , comme on le pratique pour les fayances. Lorsque les pièces doivent être dorées , on applique dans les endroits marqués l'or en chaux , qu'on brunit après la cuite avec de la sanguine. On ne met point de couverte sur les vases d'ornemens & les figures délicates ; on les conserve dans l'état de biscuit.

## SECTION IV.

Terres composées. *Terræ compositæ.*

**P**RESQUE toutes les terres devroient rentrer dans l'ordre des terres composées, si on prenoit ce mot dans un sens strict, puisqu'elles sont presque toutes mélangées les unes avec les autres, & colorées par des substances métalliques : mais les Minéralogistes ont mieux aimé ranger dans des classes particulières, celles qui ayant un principe dominant dans leur combinaison, ont un caractère distinctif ; cette section étant réservée pour les individus tellement composés, qu'il est très-difficile de déterminer la nature de leurs principes constitutifs.





G E N R E I.

Terres composées minérales. *Terra mineralis composita. Ochra.*

Toutes les terres de ce genre sont fortement colorées par des matières métalliques dans l'état de chaux; elles se dissolvent en partie dans les acides, & y occasionnent souvent un petit mouvement d'effervescence; leur couleur n'en est cependant presque point altérée. Toutes ces terres se fondent au feu sans addition.

E S P E C E I.

Ochre jaune. *Ferri terra præcipitata non mineralisata. WALL. Ochra ferri, pulverea, lutea. LINN.*

L'ochre jauné est colorée par le fer; lorsqu'elle est d'un jaune pâle, on la nomme simplement *ochre jaune*; lorsqu'elle est d'une couleur plus foncée, on l'appelle *ochre de rue*.

E S P E C E I I.

Ochre rouge. *Humus rubra*, *pallidè rubescens*. WALL.

E S P E C E I I I.

Ochre d'un rouge foncé, terre d'Angleterre. *Humus rubra obscurè rubescens*. WALL.

E S P E C E I V.

Ochre d'un rouge très-foncé, grasse & onctueuse. Crayon rouge ou sanguine. *Creta rubens*, *fusca*, *cimolia*, *purpurascens*. WALL.

Elle paroît contenir plus d'argille que les autres ochres.

E S P E C E V.

Ochre verte, terre de Vérone. *Ochra cupri Viridis*. WALL.

E S P E C E V I.

Ochre brune, terre d'Ombre. *Humus nigro brunea*. WALL.

Cette terre est d'une couleur brune plus ou moins foncée; elle contient  
du

du fer ; mais ce métal n'y est pas seul, selon le sentiment de Wallérius ; il y est joint à quelques matières bitumineuses, dont la couleur, à ce qu'il dit, se dissipe au feu, ce qui fait que la terre devient blanche : ces expériences ont besoin d'être répétées avec soin ; car ayant essayé de calciner un grand nombre de terres d'ombre, pas une n'a blanchi.

E S P E C E VII.

Terre noire. *Humus nigra*, *picloria*.  
WALL.

Cette terre est noire & très-friable ; il paroît que c'est une sorte de schiste ou *ampélites* décomposé.

G E N R E II.

Terres composées végétales. *Terra composita vegetabiles*.

Ces terres contiennent abondamment des parties végétales ; elles brûlent & perdent leur couleur dans le feu.

## E S P E C E I.

Terreau ou terre franche. *Humus communis*, atra. WALL. *Humus vegetabilis*, perfecta pulverisata, atra. LINN.

## E S P E C E II.

Tourbe. *Humus vegetabilis turfæeo-fibrosa*. WALL. *Humus vegetabilis intertexto-fibrosa*, sicco induranda. LINN.

La tourbe se forme dans les lieux marécageux, du débris des plantes & des animaux qui sont enfouis & mêlés au limon des eaux : presque tout le terrain de la Hollande en est composé ; on en trouve en France, aux environs d'Amiens & de Villeroi. M. Guettard a donné des observations sur les tourbières de cet endroit, dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, pour l'année 1761.



**G E N R E III.**

**Terres composées animales.** *Terra compositæ animales.*

Les Naturalistes donnent ce nom aux terres des cimetières, des voies, &c. où se pourrissent continuellement beaucoup d'animaux.

*Usage des terres composées.*

Les terres composées minérales servent dans la peinture : on polit l'or avec la sanguine ; on s'en sert aussi en crayon, ainsi que de la pierre noire : la terre franche & la terre animale, sont des très-bonnes terres de culture ; la tourbe sert pour brûler.



---

## C L A S S E II.

### P I E R R E S . L A P I D E S .

**L**ES pierres sont en général plus dures que les terres : elles ne peuvent se réduire en poudre que sous le marteau. On les divise comme les terres, en quatre sections.

---

### S E C T I O N I.

#### Pierres vitreuses. *Lapides vitrei.*

**W**ALLERIUS donne le nom de pierres vitrifiables, à toutes celles qui entrent en fusion au feu, & se changent en verre ; elles sont ordinairement si dures, qu'elles font feu lorsqu'on les frappe avec l'acier ; aucune ne fait effervescence avec les acides ; elles n'en sont pas même attaquées ; seulement quel-

ques-unes perdent leur couleur. Les étincelles qu'elles jettent lorsqu'on les frappe avec l'acier, dépendent absolument de leur dureté; cette propriété leur est commune avec les jaspes, les granites, & même quelques pierres calcaires. La facilité qu'elles ont de se fondre au feu, est une qualité qui loin de leur être particulière, semble au contraire leur avoir été spécialement refusée. M. d'Arcet, dans les excellens Mémoires sur l'action d'un feu égal & violent, qu'il a donnés à l'Académie des Sciences, a démontré qu'aucune de ces pierres ne pouvoit se fondre seule & sans addition : il faut en excepter cependant plusieurs pierres précieuses colorées, qui paroissent être de même nature, & ne devoir leur fusibilité qu'aux matières colorantes qu'elles contiennent.



## G E N R E I.

Pierres vitreuses, tendres & opaques.  
Grais. *Cos.*

Les grais sont composés de grains de sable, qui paroissent très-sensibles dans quelques échantillons qui se brisent facilement; ces grains sont moins apparens dans d'autres; ces derniers se fendent en lames, & leur cassure paroît plus vitreuse; ils se rapprochent en cela du quartz. Le grais forme dans l'intérieur de la terre, des masses ou des couches plus ou moins considérables; les morceaux qui sont durs sont feu lorsqu'on les frappe avec l'acier. Les acides n'attaquent point le grais; & il ne peut se fondre sans addition.

## E S P E C E I.

Grais grossier blanc. *Cos. particulis arenosis, inæqualibus, dura, vulgaris, cinerea.* WALL.

Ce grais est d'une couleur blanche ou grise, tirant plus ou moins sur le



jaune ; il y en a de plus tendre & de plus dur : on en trouve beaucoup dans les environs de Fontainebleau. On en fait des pavés pour les chemins. Les plus tendres se brisent facilement & se réduisent en sable. Ceux qui sont plus durs , se fendent par lames. Le grais que les Auteurs ont nommé grais à bâtir ; *cos particulis minimis glareosis , mollis , cædua*. WALL. *Cos friabilis , particulis argilloso-glareosis* , LINN. paroît être à peu - près le même.

## E S P E C E II.

Grais grossier rouge. *Cos particulis arenosis , inæqualibus , dura , vulgaris , rubra*. WALL.

Ce grais est assez tendre. Il est d'une belle couleur rouge.

## E S P E C E III.

Grais grossier brun. *Cos particulis minimis , arenosis , inæqualibus , dura , vulgaris , fusca*. WALL.

## E S P E C E IV.

Grais grossier veiné. *Cos particulis minimis, arenosis, inæqualibus, dura, vulgaris, variegata.* WALL.

## E S P E C E V.

Grais poreux, pierre à filtrer. *Cos particulis arenosis, majoribus aquam transmittens.* WALL. *Cos particulis arenosis, æqualibus, aquam transmittendo stillans.* LINN.

Cette pierre est d'un grain égal. Elle laisse filtrer l'eau, & se durcit à l'air. Elle vient du Mexique, & des Iles Canaries.

On en trouve une autre en Ingermanie, & dans les environs d'Upsal, qui est très-légère, un peu feuilletée & comme vermoulue. Wallerius dit qu'elle ressemble à la pierre ponce, il la nomme *cos particulis arenosis, minoribus, variis foraminulis inordinatè distincta.*

E S P E C E VI.

Grais des Rémouleurs. *Cos particulis arenosis, æqualibus, minoribus, coticularis*. WALL. *Cos particulis merè glareosis, impalpabilibus, friabilibus*. LINN.

Ce grais est composé de grains très-fins & très-étroitement liés, cependant assez sensibles : on s'en sert pour aiguïser les instrumens tranchans, & pour user les verres des montres & des lunettes. Il est communément gris ; mais il varie, étant tantôt plus blanc, tantôt plus jaune : on en trouve dans la Dalécarlie.

E S P E C E VII.

Grais de Turquie, pierre à aiguïser de Turquie. *Cos particulis arenosis, tenuissimis, impalpabilibus, indurabilis*. WALL.

Cette espèce de grais est d'un gris noirâtre ; son grain est fin ; elle ressemble assez au caillou ; cependant elle est beaucoup plus tendre : l'huile lui don-

ne une certaine dureté & un peu de transparence

### E S P E C E. VIII.

Grais carrié, pierre meulière. *Quartzum variis foraminulis inordinate distinctum.* WALL.

La pierre meulière est blanche & percée de trous, qui sont remplis d'une poussière jaunâtre, ce qui la fait paroître comme carriée & vermoulue. Il y en a des échantillons plus ou moins transparens; c'est ce qui a engagé Wal-lérius à en faire un quartz; tandis que M. Valmont de Bomare l'a rangé parmi les grais: on en trouve en quantité à la Ferté-sous-Jouare.

### G E N R E II.

Pierres vitreuses, opaques & dures.  
*Silex.*

Les pierres de ce genre sont beaucoup plus dures que les grais; elles se cassent par lames comme le verre, &

on ne peut pas discerner le grain qui les compose. Elles sont toutes en petites masses roulées, & ne forment point de roches considérables : on en trouve qui sont absolument opaques ; d'autres ont conservé une sorte de transparence : on nomme les premiers *cailloux* & les seconds *agates*.

E S P E C E I.

Caillou opaque & gris. *Silex opacus, intrinsecè inæqualis, mollior.* WALL.

Ce caillou est d'une couleur grise ou blanchâtre ; il est toujours parfaitement opaque ; il y en a qui sont marqués de taches & de veines : on les trouve dans le sable, ou épars dans la campagne.

E S P E C E II.

Caillou opaque & noirâtre, pierre à fusil commune & grossière. *Silex igniærius, per arva obuius.* WALL. *Silex vagus, cortice cretaceo, fragmentis opacis, lævibus.* LINN.

C'est le caillou le plus commun,

148     *Introduction à l'Étude*

celui dont on se sert pour battre le briquet : on le rencontre dans la craie, en petites masses irrégulières, & souvent caverneuses, couvert d'un enduit de matière crétacée.

E S P E C E III.

Caillou brun, Caillou d'Égypte. *Silex vagus*, cortice ochraceo, opacus, concentrico-variegatus. LINN.

Le fond de sa couleur est brun ; il est marqué de taches & de veines jaunes, & prend un très-beau poli.

E S P E C E IV.

Caillou tacheté de blanc & de rouge, jaspe fleuri rouge. *Jaspis variegata*, rubra. WALL. *Silex rupestris*, nudus, opacus, ruber, solidus. LINN.

Ce jaspe est marqué de points rouges & de veines blanches.



E S P E C E V.

Caillou marqué de veines grises & blanches, jaspe fleuri gris. *Jaspis variegata grisea*. WALL.

Cette pierre ressemble au jaspe fleuri rouge ; mais ses taches sont grises, mêlées de blanc ou de jauné.

E S P E C E V I.

Caillou jaune, mêlé de veines blanches, jaspe fleuri jaune. *Jaspis variegata, flava*. WALL.

Cette espèce ne diffère du jaspe fleuri rouge que par la couleur des taches.

E S P E C E V I I.

Caillou verdâtre, marqué de points jaunes, jaspe fleuri verd. *Jaspis variegata obscure viridis*. WALL.



## E S P E C E VIII.

Caillou verd , ponctué de rouge ,  
jaspe sanguin. *Jaspis variegata viridis*  
WALL. *Silex rupestris, nudus, opacus,*  
*viridis.* LINN.

Ce jaspe a un fond verd ponctué de  
rouge.

Le jaspe de Wallérius n'est autre  
chose qu'un caillou : on le trouve de  
même en masses détachées. Il ne fond  
pas plus que la pierre à fusil, comme  
l'a observé M. d'Arcet ; aussi c'est à tort  
qu'on l'a confondu avec le *petro-silex*  
& le *lapis-lazuli*.

On a distingué encore beaucoup d'au-  
tres jaspes, à raison de la couleur du  
fond, & de la variété des taches. Ce  
qu'on nomme jaspe agate, n'est autre  
chose qu'une sorte de jaspe fleuri, qui  
a quelques veines transparentes, sem-  
blables à l'agate.





E S P E C E IX.

Caillou à fusil, pierre de corne commune. *Silex corneus, intrinsecè æqualis, durissimus.* WALL. *Silex vagus, cortice glabro, fragmentis diaphanis, glaberrimis.* LINN.

Cette pierre est de couleur de corne claire ; elle a un peu de transparence & se rapproche de l'agate. On la fend en lames minces , pour en armer les chiens des fusils & des pistolets.

E S P E C E X.

Caillou demi-transparent de couleur d'eau. *Achates aquea.* BOMARE.

Cette agate est la plus pure & la plus transparente de toutes : on la nomme *agate orientale.*

E S P E C E XI.

Caillou demi-transparent rouge, cornaline. *Achates ferè pellucida, colore rubescente.* WALL. *Silex vagus, diaphanus, unicolor, ruber.* LINN.

La cornaline se trouve quelquefois

## 152 Introduction à l'Etude

parfaitement transparente ; quelquefois aussi elle est marquée de quelques taches qui en altèrent la pureté. Lorsque la teinte de la pierre est d'un rouge pâle, on la nomme *carnéole* ; quand elle tire plus sur le jaune, on l'appelle *sarde*.

### E S P E C E XII.

Caillou demi-transparent jaune, fardoine. *Onyx fasciis & circulis donatus, alterutro rubro.* WALL.

La fardoine est communément de couleur jaune, veinée de brun.

### E S P E C E XIII.

Caillou demi-transparent laiteux, calcédoine. *Achates vix pellucida, nebulosa, colore griseo mixta.* WALL. *Silex vagus, subdiaphanus, cornei coloris, concentricè varius.* LINN.

La calcédoine est tantôt blanche & de couleur de lait, tantôt grise & veinée de blanc ; mais elle a toujours une forte d'opacité. On donne le nom d'*yeux de poisson* à de petits morceaux

de calcédoine qui sont un peu chatoyans.

E S P E C E. XIV.

Caillou demi-transparent varié, agate.

*Achates durissima, ferè pellucens, diversis coloribus nitens, variegata.* WALL.

*Silex rupestris, cortice rufo, noduloso, subdiaphanus.* LINN.

L'agate, quoique demi-transparente, est nuancée de diverses couleurs ; on lui a donné différens noms, comme d'agate léontine, *achates pellis leoninæ.* WALL. *Leontion leotodon*, lorsqu'elle est de couleur fauve.

Agate, peau d'hyène. *Achates pellis hyenæ.* WALL.

Agate, peau de panthère. *Achates pellis pantheræ.* WALL. *Pardalion, pantachates*, lorsqu'elle est mouchetée.

Agate à veines blanches. *Achates venulis albis.* WALL. *Seu cachates.*

Agate à veines rouges. *Achates venulis rubris.* WALL. *Hæmachates.*

Jaspe agate. *Achates viridescens pur-*

*ctis rubris.* WALL. *Jaspi-achates*, lorsque l'agate est verte & marquée de points rouges, comme le jaspe sanguin.

Agate de trois couleurs. *Achates tricolor.* WALL.

Agate de quatre couleurs. *Achates quadricolor.* WALL. *Achates elementarius.*

### E S P E C E X V.

Caillou demi-transparent, par bandes de diverses couleurs. *Onyx. Achates vix semipellucida, fasciis aut stratis diversè coloratis ornata.* WALL. *Silex vagus, stratis diversè coloribus.* LINN.

L'onyce est formée de couches diversement colorées, & disposées circulairement. Lorsque les couches sont disposées horizontalement, & qu'on peut les séparer facilement, la pierre se nomme *memphites*, ou *camée*. *Onyx stratis diversè coloratis ornatus.* WALL.

On donne le nom d'œil du monde, *Achates unguium colore, in aere opaca, aquâ pellucens.* WALL. à une espèce

d'onyce d'un gris pâle, qui a un peu de transparence, & qui, lorsqu'on la trempe dans l'eau pendant quelques minutes, devient plus transparente, & de couleur de succin ; mais elle reprend son premier état en sortant de l'eau. Cette pierre se trouve en Chine.

Il faut observer qu'on donne aussi le nom d'onyce à des pierres qui sont formées par couches, mais qu'il ne faut pas confondre avec l'agate onyce.

E S P E C E X V I.

Caillou demi-transparent figuré. *Achates figurata*. WALL.

Il y en a qui représentent des mouffes, de petits arbrisseaux : on les appelle agates herborisées ou arborisées. *Achates phytomorphos*. WALL. *Dendrachates* : on les nomme aussi dendrites ; mais ce nom leur est commun avec toutes les pierres arborisées. Lorsqu'on voit sur ces agates des parties animales, on les nomme agates zoomorphites. *Achates zoomorphos*. WALL. Quand les aga-

tes représentent des figures d'homme, on les nomme agates anthropomorphites. *Achates anthropomorphos*. WALL. Lorsqu'on y voit des corps célestes, on les nomme agates uranomorphites. *Achates uranomorphos*. WALL.

## E S P E C E XVII.

Caillou demi-transparent, brun & chatoyant, la chatoyante des Lapidaires. *Lapis mutabilis gemmariorum*. BOM.

Ces pierres sont brunes & chatoyantes ; il y en a de très-belles, dont le bord est d'un brun très-foncé, & le milieu d'un verd noirâtre très-brillant : on les appelle *yeux de loup*.

## E S P E C E XVIII.

Caillou demi-transparent, rempli de petits points brillans, aventurine. *Silex vagus, subdiaphanus, punctis minimis, micantibus distinctus*.

Cette pierre est rougeâtre & demi-transparente, marquée de petits points brillans, comme la composition qu'on connoît sous le nom d'*aventurine*. Il y

a deux de ces aventurines naturelles  
au Cabinet du Roi.

E S P E C E XIX.

Caillou demi-transparent, blanc & cha-  
toyant, opale. *Achates ferè pellucida,*  
*colores pro situ spectatoris mutans.*  
WALL. *Silex vagus reflexione & refra-*  
*ctione varians.* LINN.

L'opale est la plus belle & la plus  
transparente de toutes les agates ; le  
fond de sa couleur est le blanc de lait ;  
mais il n'est pas mat comme dans la  
Calcédoine ; au contraire il est bril-  
lant & comme vitreux. Lorsqu'on re-  
garde la pierre, elle a des réflets ; jau-  
nes, rouges & bleus. On donne le nom  
d'*œil de chat* à une opale d'un jaune ver-  
dâtre, qui, étant exposée au grand jour,  
darde un rayon jaune & très-lumineux.

La pierre qu'on appelle *girasole* ne  
diffère de l'opale qu'en ce que la cou-  
leur bleue y domine. On trouve les  
opales dans les Indes Orientales, en  
Arabie, en Egypte, en Hongrie, en  
Bohême, en Allemagne.

On peut ajouter à toutes les espèces d'agates les substances végétales ou animales agatifiées, & les pierres qu'on nomme d'hirondelle ou de fassenage.

- *Achates figurâ hemisphericâ vel ovali, magnitudine seminis lini*, WALL. qui ne sont que de petits grains d'agate roulés, assez semblables à ce qu'on appelle *yeux d'écrevisse*.

### *Analyse des Cailloux.*

Tous les cailloux rougis au feu y perdent leur couleur, & y deviennent d'un blanc mat : si étant rouges on les jette dans l'eau très-froide, ils se fendent & se brisent : on peut ainsi les réduire en une poudre blanche assez fine. Une partie de cette poudre fondue avec huit parties d'alkali fixe, forme une masse qui se dissout dans l'eau, & cette dissolution prend le nom de *liqueur de cailloux* : elle prend avec le temps une consistance mucilagineuse.

Un acide versé sur la liqueur de



cailloux s'unit à l'alkali fixe, & dégage la terre qu'il tenoit en dissolution : cette terre se dissout très-facilement dans les acides tant qu'elle est humide, & lorsqu'elle est desséchée, elle s'y dissout plus difficilement, mais toujours avec effervescence.

Les différens acides forment avec cette terre des sels semblables à ceux que produit la terre de l'alun, & celle qu'on sépare en précipitant par un alkali la dissolution des argilles dans l'eau : ce qui concoure à prouver l'analogie de ces différentes terres.

Il y a cependant entr'elles une différence ; la terre des cailloux conserve la propriété de se fondre en verre ; tandis que la terre des argilles & de l'alun est absolument infusible : cette observation est de M. Macquer.

La masse d'alkali fixe & de cailloux, mise à digérer dans l'esprit-de-vin, produit ce qu'on appelle la teinture des cailloux.

On peut également faire dissoudre le

fable quartzeux dans l'alkali fixe, pour en préparer une liqueur & une teinture.

On se sert des cailloux pour armer les fusils : on taille les agates.

### G E N R E III.

Pierres tendres & transparentes. *Lapidés quartzosi.*

Les pierres de ce genre n'ont pas toutes la même beauté, ni la même dureté : les unes sont parfaitement transparentes & sans couleur ; les autres sont colorées & ont une sorte d'opacité ; il y en a de régulièrement crySTALLISÉES, & de non crySTALLISÉES.

#### E S P E C E I.

Quartz laiteux. *Quartzum solidum, opacum, durissimum, aqueo lacteum.* WAL.  
*Quartzum rupestre, album, diaphanum.*  
 LINN.

Ce quartz, quoique vitreux, a cependant moins de transparence que les autres ; il est d'un blanc un peu laiteux :

on

on le nomme *gemma divi Jacobi*. Ce qu'on appelle le quartz gras, *quartzum solidum adtactu pingue*. WALL. *Quartzum, vagum, rotundatum, cortice glaberrimo*. LINN. ne diffère du quartz laiteux que par son aspect, qui paroît comme gras.

E S P E C È II.

Quartz transparent. *Quartzum solidum, pellucidum*. WALL. *Quartzum rupestre, hyalinum, pellucidum*. LINN.

Ce quartz est tantôt en masses qui paroissent composées de feuillets vitreux très-transparens; tel est celui qu'on nomme *crystal de Madagascar*: quelquefois il est composé de petits grains qui se peuvent séparer aisément; il a assez de ressemblance avec le grais, dont il ne diffère que par la transparence: on le trouve décrit sous le nom de quartz en grains, *quartzum granulatum coherens*. WALL. *Quartzum granulatum*. LINN. On trouve souvent dans la terre & dans les eaux de certains

fleuvès, le quartz roulé en morceaux arrondis ; les cailloux de Médoc, du Rhin, d'Alençon, de Cayenne, sont de cette espèce : ces quartz sont des plus beaux ; leur tissu ne paroît point feuilleté ; ils sont communément durs, & reçoivent bien le poli. Le quartz se trouve aussi cristallisé, tantôt en pyramides très-courtes, tantôt en petits cristaux irréguliers : on le nomme cristal vermiculaire, *Quartzum crystallizatum, irregulare*. WALL.

## E S P E C E I I I.

Cristal de roche. *Crystallus hexagona, non colata*. WALL. *Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum*. LINN.

Le cristal de roche est communément parfaitement transparent ; il est cristallisé en prismes à six côtés ; & les pointes sont des pyramides à autant de faces ; lorsqu'une des deux pointes est cachée, la pierre se nomme cristal de roche à une pointe, *crystallus montana apice uno*. WALL. Mais si toutes les

deux sont apparentes, & ont la figure pyramidale, c'est le crýstal de roche à deux pointes, *crýstallus montana utrinque acuminata*. On trouve des crýstaux de roche formés de deux pyramides jointes base à base, sans être séparées par un prisme. Celui que M. d'Arcet dit se trouver dans le comté de Maramaros en Hongrie, & qu'il croit être le diamant d'Hongrie, est de cette espèce. Quelquefois les crýstaux de roche sont en prismes triangulaires, terminés par des pyramides semblables.

Enfin, on trouve des crýstaux qui sont creux dans leur intérieur, & remplis d'une matière étrangère, *crýstallus montana, cavitate sexangulari*. WALL. *Nitrum lapidosum, quartzosum, cavum*. LINN.

#### E S P E C E IV.

Quartz transparent jaune, fausse topase. *Quartzum pellucidum, flavum*. WALL. *Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum, flavum*. LINN.

On trouve cette pierre en masse ou

164 *Introduction à l'Etude.*

en cryftaux. Wallérius, sous cette seconde forme, l'appelle *crystallus hexagona flavesceus*.

E S P E C E V.

Quartz transparent, d'un jaune verdâtre. Fausse chrysolite. *Pseudo-topasius virescens*. WALL. *Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum, viridius*. LINN.

E S P E C E VI.

Quartz transparent verd. Fausse émeraude. *Quartzum pellucidum viride*. WALL. *Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum, viride*. LINN.

Cette pierre se trouve en masse ou crySTALLIFÉE. Wallérius a décrit cette seconde forme sous le nom de *crystallus hexagona virescens*.

E S P E C E VII.

Quartz transparent d'un verd bleuâtre: fausse aiguemarine. *Pseudosmaragdus, beryllinus*. WALL. *Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum, cyaneum*. LINN.

E S P E C E VIII.

Quartz transparent bleu, faux saphir.

*Quartzum pellucidum, cœruleum.*

WALL. *Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum, cœruleum.* LINN.

Lorsqu'elle se trouve en crystaux, Wallérius la nomme *crystallus hexagona saphirina*.

E S P E C E IX.

Quartz transparent rouge, faux rubis.

*Quartzum pellucidum, rubrum.* WALL.

*Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum, rubrum.* LINN.

Lorsqu'elle est crySTALLISÉE, Wallérius la nomme *crystallus hexagona rubescens*.

E S P E C E X.

Quartz transparent violet, fausse améthyste. *Quartzum pellucidum violaceum.*

WALL. *Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum, violaceum.* LINN.

Cette pierre se trouve en masse ou crySTALLISÉE; Wallérius la nomme dans

166 *Introduction à l'Etude*

ce dernier état, *crystallus hexagona, violacea.*

E S P E C E X I.

Quartz transparent d'un rouge jaunâtre, fausse hyacinthe. *Pseudorubinus, hyacinthinus.* WALL.

E S P E C E X I I.

Quartz transparent d'un rouge obscur, faux grenat. *Quartzum fuscum, granaticum, friabile.* WALL.

Ce quartz est communément en petits cristaux, comme des grenats ; mais plus tendre.

E S P E C E X I I I.

Quartz transparent noir. Crystal noir. *Quartzum pellucidum, nigrum.* WALL.  
*Nitrum lapidosum, quartzosum, octodecaedrum, nigricans.* LINN.

Lorsque cette pierre est cristallisée, Wallérius la nomme *crystallus nigra.* On donne à tous les cristaux colorés, le nom de *prismes*, en y ajoutant le nom de la pierre précieuse qu'ils imitent.



Le quartz & certains cailloux transparents , qui ne sont que des morceaux de quartz roulé, blanchissent au feu , & deviennent beaucoup plus friables , comme l'a remarqué M. d'Arcet ; tandis que le crystal de roche ne perd rien de sa transparence.

La plupart des cristaux colorés , perdent leur couleur à un très-grand feu ; mais aucune de ces pierres ne se fond.

*G E N R E IV.*

Pierres vitreuses , transparentes & dures. Pierres précieuses. *Gemma.*

Les pierres précieuses ont en général beaucoup de transparence & de dureté ; mais il y a à cet égard des différences très-grandes , non-seulement entre les différentes espèces de pierres , mais encore entre les différens individus d'une même espèce : aussi le caractère de leur dureté , n'est-il pas suffisant pour les faire distinguer : la forme ré-

gulière qu'elles peuvent affecter, n'est pas assez constante pour servir de guide dans l'arrangement de ces pierres. Le feu seroit bien de tous les moyens, le plus propre à développer la véritable nature de ces corps; mais il n'a encore été appliqué qu'à un petit nombre, & paroît agir à peu près de la même manière, sur des pierres fort différentes par la couleur, la transparence, la dureté; tandis qu'il agit très-différemment sur des pierres qui se ressemblent parfaitement à beaucoup d'égards. La dureté, la forme & le feu, n'étant que des moyens insuffisans, pour mettre un ordre quelconque dans la distribution de ces sortes de pierres, on peut les diviser à raison de leur couleur.

## E S P E C E I.

Diamant. *Gemma pellucidissima duritie summa, colore aqueo, igne persistens.*

WALL. *Alumen lapidosum, pellucidissimum, solidissimum, hyalinum.* LINN.

Le diamant est la plus pesante & la plus

plus dure de toutes les pierres précieuses ; c'est aussi celle dont la transparence est la plus parfaite. La figure des diamans est ordinairement octaèdre. Les plus beaux diamans sont absolument sans couleur ; mais il y en a qui tirent plus ou moins sur le rouge, le bleu, le verd, le jaune, le noir.

La dureté de cette pierre est telle, qu'on ne peut l'entamer qu'avec la poudre même de diamant. Le feu a cependant sur elle plus d'action que sur toutes les autres pierres vitreuses. Boyle , après avoir tenté quelques expériences sur le diamant, avoit dit qu'il se réduisoit en vapeurs par l'action du feu. Le Grand-Duc de Toscane en fit exposer au foyer du miroir ardent de Tschirnausen , & parvint à les volatiliser. L'Empereur François I fit également volatiliser le diamant. Après vingt-quatre heures de feu , il observa que cette pierre commençoit par perdre son poli, qu'ensuite elle se feuilletoit & dispa-roissoit enfin entièrement.

M. d'Arcet, dans les excellens Mémoires qu'il a publiés, a donné le résultat de ses travaux sur le diamant ; il paroît par les expériences de ce Chymiste ; 1.<sup>o</sup> que les diamans se volatilisent, même sans le concours de l'air, comme il s'en est assuré en enfermant dans une boule de pâte de porcelaine un diamant qui en remplissoit exactement la cavité : 2.<sup>o</sup> que les diamans se volatilisent par feuillets, comme on l'avoit remarqué dans les expériences faites à Vienne en présence de l'Empereur ; & que le noyau qui reste sur la fin de l'opération, est encore un diamant parfait : 3.<sup>o</sup> que les diamans très-durs & un peu colorés, se volatilisent plus difficilement que les autres ; propriété que M. d'Arcet attribue à la matière colorante, qui défend le diamant de l'action du feu ; 4.<sup>o</sup> qu'il n'est pas nécessaire d'employer un feu très-violent pour opérer la volatilisation du diamant, puisque cinq heures de feu dans un fourneau de coupelle, suffisent pour cela : 5.<sup>o</sup> enfin,

qu'une espèce du diamant, qu'on a dit à M. d'Arcet venir du Brésil, a fondu en un verre beaucoup plus dur que toutes les autres pierres, & qui paroïssoit encore être du diamant.

Cette propriété de se volatiliser suffiroit seule pour séparer le diamant des autres pierres vitreuses, s'il ne leur ressembloit d'ailleurs à tant d'égards. Mais il suffit, pour faire voir combien il y a loin de cette matière à toutes les autres, de faire attention aux expériences qui viennent d'être rapportées, & qui ont en partie été répétées plusieurs fois, depuis la publication des Mémoires de M. d'Arcet. M. Roux a volatilisé un diamant dans les Leçons publiques de chymie qu'il a faites aux Ecoles de Médecine l'hiver dernier (1770.) M. Macquer a répété l'expérience sur un diamant qui pesoit  $\frac{4}{10}$  de karats. La pierre, quoiqu'un peu jaune, étoit parfaite & taillée en brillant. Il s'est servi du fourneau de M. Pott, avec quelques changemens qu'il y a

faits. La capsule dans laquelle il mit le diamant, étoit d'une argille parfaitement réfractaire : après l'avoir fait chauffer, il y mit la pierre, & la laissa quelque temps devant la moufle, afin qu'elle s'échauffât doucement & sans s'éclater : ayant poussé ensuite la capsule au fond de la moufle, il fit un grand feu. Au bout de vingt minutes, il visita son diamant & le trouva pénétré de feu, & brillant d'une espèce de lumière phosphorique. Ce diamant paroissoit entier, & seulement un peu plus gros qu'avant d'avoir été chauffé. Il ferma la moufle, & continua le feu avec la même force. Au bout de quarante minutes, voulant examiner une seconde fois l'état de la pierre, elle étoit entièrement disparue, sans laisser aucun vestige dans la capsule. Cette expérience de M. Macquer, faite en présence de plusieurs Chymistes, au nombre desquels j'eus l'honneur de me trouver, paroît prouver que le diamant se volatilise très-promptement, puis-

qu'il ne lui a pas fallu une heure de feu, & que cette volatilisation n'est point un simple éclatement des parties du diamant produit par la chaleur, puisque le diamant tout pénétré de feu, étoit encore parfaitement entier. M. Rouelle a encore répété cette expérience dans son laboratoire; elle a réussi de même, à quelque différence près dans la durée du feu.

La seule expérience de M. d'Arcet, qui paroît aussi singulière, pour ne pas dire plus, c'est la fusion du diamant qu'on dit venir du Brésil; car cette propriété bien reconnue, distingueroit autant le diamant du Brésil des autres diamans, que ceux-ci des autres pierres. Les mines de diamant sont en Asie, dans les Royaumes de Golconde, de Visapour, de Bengale, sur les bords du Gange, & dans l'Isle de Borneo: on en trouve aussi en Amérique, dans le Brésil; mais ils sont beaucoup plus tendres que les autres. Les diamans sont communément mêlés à de la terre;

on les en débarrasse par le lavage; ils sont couverts d'une écorce grislâtre & obscure. Les Lapidaires appellent diamant de nature, un diamant très-dur, qu'on ne peut point travailler, & qui sert à polir les autres.

## E S P E C E I I.

Saphir. *Gemma pellucidissima duritie tertia, colore cœruleo, igne fugaci.* WAILL.  
*Alumen lapidosum, pellucidissimum, solidissimum, cœruleum.* LINN.

La couleur du saphir varie depuis le bleu très-foncé jusqu'au plus pâle; les plus bleus sont les plus estimés; les plus pâles sont ordinairement tendres. Le saphir tient le second rang, pour la dureté, après le diamant: exposé au feu, la pierre perd sa couleur; mais elle ne se fond pas. On rencontre les saphirs, en petites masses roulées, dans les royaumes de Pégu, de Bismagar, de Cambaye & dans l'île de Ceylan: on en trouve aussi en Bohême, en Silésie, en Saxe. On conserve au Cabinet du Roi



des saphirs en crystaux, qui paroissent très-différens de ceux qui se trouvent décrits dans le *Systema Naturæ*.

E S P E C E III.

Aigue-marine, ou bérille. *Gemma pellucida, duritie decima, colore thalassino, igne liquabilis. WALL. Borax lapidosus, prismaticus, pellucidus, pyramidibus truncatis, cœruleo-virens. LINN.*

L'aigue - marine est d'une couleur bleue, mêlée de verd, ou de couleur d'eau de mer ; c'est de-là qu'elle a pris son nom. Cette pierre est crySTALLISÉE en prismes octaèdres, terminées par deux pyramides, souvent tronquées d'un côté ou de l'autre. Wallérius dit que l'aigue - marine se fond au feu ; cette expérience auroit besoin d'être répétée.

On trouve l'aigue - marine aux Indes, en Allemagne & en Bohème.



## E S P E C E IV.

**Emeraude.** *Gemma pellucidissima, duritie quinta, colore viridi, in igne permanente.* WALL. *Borax lapidosus, prismaticus pellucidus, pyramidibus truncatis, viridis.* LINN.

L'émeraude est d'un verd pur ; elle tient le cinquième rang après le diamant pour la dureté : une lime bien trempée peut mordre dessus.

L'émeraude exposée au grand feu, comme l'a fait M. d'Arcet, perd sa transparence, une grande partie de sa couleur, & blanchit au point de ressembler au verd de montagne ; ce qui contredit formellement Wallérius. Cette pierre exposée à Florence, au foyer du miroir ardent, perdit sa couleur & fondit promptement.

On trouve les émeraudes en Amérique, près de la nouvelle Carthage : il en vient aussi d'Italie, d'Allemagne & d'Angleterre.

Nous ne connoissons plus les éme-

raudes que les Auteurs ont nommées *Orientales* ou de *vieille roche*, & qu'ils disoient originaires de Perse & d'Arabie. On conserve au Cabinet du Roi des émeraudes crySTALLISÉES en prismes exaëdres, dont toutes les faces sont égales.

E S P E C E V.

Chrysolite. *Gemma pellucidissima, duritie sexta, colore viridiflavo, in igne fugaci.*  
WALL. *Borax lapidosus, prismaticus, pellucidus, pyramidibus truncatis virens.*  
LINN.

Cette pierre est d'un verd jaunâtre ; elle est assez tendre pour pouvoir être entamée avec la lime plus facilement que l'émeraude. Lorsqu'elle est d'un verd jaunâtre, c'est la chrysolite proprement dite ; lorsqu'elle tire davantage sur le jaune, on la nomme *chrysoprase* ; lorsque la couleur est d'un verd foncé, lavé d'un peu de jaune, & semblable à celle du porreau, on l'appelle *prase* ; enfin, quand elle est un peu obscure & bleuâtre, on l'appelle *chrysoberylle*.

M. d'Arcet fit fondre, en un beau verre clair, le *péridot*, qui paroît être une pierre de même espèce, mais de la dernière qualité. Cette expérience prouve que toutes ces pierres ne sont que des espèces inférieures en qualité à l'émeraude, qui ne se fond qu'au miroir ardent, & qui ne peut, que très-difficilement, être entamée par la lime.

## E S P E C E VI.

Topaze. *Gemma pellucidissima, duritie quarta, colore aureo, in igne permanente.* WALL. *Borax lapidosus, prismaticus pellucidus, pyramidibus truncatis, flavus.* LINN.

La topaze est une pierre jaune, quelquefois claire, d'autrefois foncée, & approchant de la couleur de l'or : il paroît que Wallérius ne parle que de la topaze Orientale, lorsqu'il dit que sa couleur est fixe au feu. On trouve dans l'excellent Mémoire de M. d'Arcet, plusieurs expériences que ce savant Chymiste a tenté sur différentes topazes.

L'espèce qu'on nomme *Orientale*, n'a rien perdu de sa couleur, de son poli, ni de son jeu. La topaze du Brésil a blanchi complètement au feu, tant en dedans qu'en dehors; elle a perdu, non-seulement toute sa transparence & son poli, mais aussi sa dureté; elle étoit couverte, en sortant du four, d'une légère pellicule, qui paroissoit avoir été formée par la partie colorante de la pierre. La topaze de Saxe a blanchi comme le quartz; mais elle a conservé toute sa dureté: aucune de ces topazes ne s'est fondue; ainsi elles paroissent très-différentes des chrysolites dont le péridot est une variété; & c'est mal-à-propos que quelques Auteurs ont confondu ces deux sortes de pierres. On attribue au plomb la couleur de la topaze; mais on peut y soupçonner la présence du fer, d'après un procédé communiqué par M. Dumelle, Orfèvre de Paris, à M. Guettard, qui en a fait part à l'Académie des Sciences. Il consiste à faire prendre à la topaze jaune

du Brésil la couleur du rubis balais, en l'exposant au feu dans un creuset plein de cendres. M. Guettard dit que la topaze Orientale, traitée de la même manière, ne change pas de couleur, ce qui se rapporte parfaitement avec les expériences de M. d'Arcet sur cette pierre. A l'égard de la topaze blanche du Brésil; c'est à tort qu'on dit qu'elle devient plus jaune au feu : M. Guettard s'est assuré du contraire, en tenant une de ces pierres exposée, pendant un très-long-temps, à un feu assez fort.

On trouve dans les Cabinets des pierres d'un jaune noir, & comme enfumées : on les connoît sous le nom de *topazes brunes de Bohème*; ce ne sont que des quartz ainsi colorés, ou de fausses topazes.

## E S P E C E VII.

Hyacinthe. *Gemma plus minus pellucida, duritie nona, colore ex flavo rubente.*

WALL. *Nitrum lapidosum quartzosum octodecaedrum, purpureo fulvum.* LINN.

Les Auteurs ont distingué quatre va-

riétés parmi ces pierres; savoir, l'hyacinthe d'un jaune rougeâtre, ou Orientale; l'hyacinthe d'un jaune de safran, ou Occidentale; l'hyacinthe d'un blanc jaunâtre, & l'hyacinthe couleur de miel.

Quoique l'hyacinthe soit assez tendre pour être entamée avec la lime, elle ne se fond pourtant pas au feu, comme l'a éprouvé M. d'Arcet, elle perd seulement un peu de sa couleur, mais rien de sa transparence & de sa dureté; ce qui ne s'accorde pas avec ce qu'en dit Wallérius, qui avance que ces pierres entrent en fusion au feu. On trouve les hyacinthes dans les Indes Orientales, aux royaumes de Cananor, de Cambaye & de Calicut: il en vient aussi des Indes Occidentales: on en rencontre en Europe, dans la Bohême & en Silésie.



## E S P E C E VIII.

Rubis. *Gemma pellucidissima, duritie secundæ, colore rubro in igne permanente.*

WALL. *Alumen lapidosum pellucidissimum, solidissimum, rubrum, majus.* LINN.

Le rubis est après le diamant la plus belle & la plus dure de toutes les pierres précieuses ; sa couleur est rouge , & les Joailliers en distinguent de quatre nuances. Le rubis Oriental , ou escarboucle , qui est d'un beau rouge-ponceau fort vif ; le rubis balais , qui est d'un rouge pourpre-foncé ; le rubis spinel , qui est d'un rouge-clair , & le rubicelle , qui tire sur le jaune.

Le rubis Oriental , traité par M. d'Arcet , n'a rien souffert , ni dans sa couleur , ni dans sa transparence. Dans les expériences que l'empereur François I. fit faire à Vienne , ce rubis ne souffrit aucune altération , de l'action d'un feu très-violent , continué pendant trois fois vingt-quatre heures. Le Grand



Duc de Toscane ayant fait exposer un rubis au foyer d'un miroir de Tschirnausen, il se forma, après quelques secondes, plusieurs bulles à la surface de la pierre, qui paroissoient comme enduites de graisse. Au bout de quarante-cinq minutes, elle perdit sa couleur; ses angles & ses facettes s'amolirent. Un autre rubis, après sept minutes de ce feu, se trouva amolli, au point de recevoir l'empreinte d'un cachet de jaspe. Au bout de quarante-cinq minutes, il devint blanchâtre, & quarante-cinq minutes après, il avoit perdu toute sa couleur; mais sa forme ne fut nullement changée, quoiqu'il restât encore trois quarts d'heure exposé à ce feu. La poudre de rubis a pareillement fondu, en réfléchissant dessus les rayons du miroir, par le moyen d'un second verre: mais à ce degré de chaleur considérable, aucune partie ne s'est volatilisée: ce qui prouve évidemment que quelque ressemblance que le rubis puisse avoir avec

le diamant, il est encore bien éloigné d'être de même nature.

On trouve les plus beaux rubis dans les Indes Orientales, aux royaumes de Pégu, de Bîsnagar, de Calicut, & dans l'île de Céilan. On en rencontre aussi en Bohême, en Silésie & en Saxe : ils sont tantôt en masses arrondies comme des cailloux, quelquefois ils ont des figures régulières, octaèdres, ou rhomboïdales.

#### E S P E C E IX.

Grenat. *Gemma plus minus pellucida, duritie octava, colore obscure rubro, in igne permanente.* WALL. *Borax tessellatus, solidus, politus, scintillans.* LINN.

Le grenat est d'une couleur rouge obscure, les plus beaux échantillons se rapprochent assez du rubis, & tiennent le milieu entre cette pierre & l'améthyste; mais ils sont beaucoup plus tendres : on les nomme dans le commerce *vermeils*; ils ne sont transparens qu'au jour, & paroissent noirs aux lumières.

Il y a des grenats jaunâtres, qui se rapprochent de l'hyacinthe ; d'autres tirent sur le violet foncé. On attribue la couleur de ces pierres au mélange du fer & de l'étain : la figure du grenat varie beaucoup. Wallérius en compte sept variétés ; savoir, le grenat rhomboïdal, le grenat octaèdre, le grenat dodecaèdre, le grenat à quatorze côtés, le grenat à vingt, le grenat à vingt-quatre côtés & le grenat de figure indéterminée : le chevalier Von-Linné en compte à-peu-près le même nombre.

M. Pott, dans le premier tome de sa *Lithogéognosie*, rapporte avoir fondu toutes sortes de grenats en une masse noirâtre. M. d'Arcet a répété l'expérience sur des grenats ; ils ont coulé en une masse noire, comme l'écaille de fer fondu. Les grenats viennent d'Éthiopie, & des royaumes de Calicut & de Cambaye : on en trouve aussi en Espagne, en Bohême & en Silésie.

## E S P E C E X.

Améthyste. *Gemma pellucidissima, duritie septima, colore violaceo, in igne liquescens.* WALL.

L'améthyste est d'une couleur violette, tantôt plus pâle & tantôt plus foncée; quelquefois elle paroît mêlée de rouge. L'améthyste se trouve quelquefois en colonnes hexagonales avec le quartz, dans les fentes des rochers. M. d'Arcet a exposé au feu l'améthyste des Indes & celle d'Auvergne; la première a perdu sa couleur, & est devenue transparente comme le plus beau caillou; l'autre a blanchi comme le quartz; mais aucune ne s'est fondue, comme le prétend Wallérius. Les améthystes Orientales sont très-rares: les plus communes viennent de Carthagène.

## E S P E C E XI.

Tourmaline. *Borax diaphanus, subopacus, purpureus, maximè electricus.* LINN.

La tourmaline est d'une couleur jaune

noirâtre, à-peu-près comme la topaze de Bohême, qu'on nomme *topaze enfumée* : il y en a même qui sont parfaitement opaques. Cette pierre a la propriété, lorsqu'on la fait chauffer, d'attirer & de repousser les corps légers qui l'environnent, comme les cendres & les petits charbons : elle a la dureté du crystal de roche, & prend un poli gras. Il est fait mention de cette pierre, pour la première fois, dans *l'Histoire de l'Académie des Sciences*, année 1717. Ce fut M. Léméri qui la fit connoître. Depuis M. Æpin, Professeur de Physique, & de l'Académie Impériale de Pétesbourg, & M. Wilke, en ont parlé. Enfin, M. le duc de Noya Caraffa, Napolitain, dans une lettre écrite à M. de Buffon en 1759, rapporte un très-grand nombre d'expériences qu'il a faites pour éprouver la vertu électrique de la tourmaline : il résulte de son travail, que la chaleur trop grande, comme celle qui est trop foible, nuisent également à cette pro-

priété, qui a lieu depuis le trentième jusqu'au soixante - dixième degré du thermomètre de M. de Réaumur. Elle agit au travers du papier , & même à l'extrémité d'une verge de fer, dont un bout pose sur la tourmaline chauffée. Cette pierre diffère des autres corps électriques, en ce qu'elle s'électrise par la seule chaleur, même dans l'eau, & ne donne point d'étincelles : elle est attirée par un tube électrisé, au lieu d'en être repoussée. Enfin , deux tourmalines chauffées s'attirent mutuellement, au lieu de se repousser.

M. le duc de Noya fit ces expériences sur deux pierres qui sont actuellement dans les mains de Milord Hamilton, ministre d'Angleterre à Naples : la plus grande de ces deux pierres est de couleur de topaze enfumée & transparente ; la plus petite est d'un brun-noir & parfaitement opaque. La tourmaline ne se trouve que dans l'île de Céilan.

*Usage des Pierres précieuses.*

On se servoit autrefois en Médecine du rubis , du saphir , de l'émeraude , de la chrysolite , de l'améthyste , de la topaze , des grenats , de l'hyacinthe & même des agates , sous le nom de *fragmens précieux* ; on leur attribuoit des vertus cordiales , alexitères , astringentes : aujourd'hui on ne s'en sert plus ; les Médecins étant bien convaincus que ces pierres n'ont aucune vertu , puisqu'elles ne peuvent nullement se dissoudre dans nos humeurs. La confection d'hyacinthe tient encore son nom de la pierre qu'on y fait entrer ; mais ce n'est point à elle qu'elle est redevable de ses propriétés.

On taille toutes les pierres précieuses à facettes , pour en faire des bagues & des bijoux. Les Lapidaires font dans l'usage de diviser toutes les pierres en Orientales & en Occidentales ; ils font plus d'attention , dans cette division , à la beauté de la pierre , qu'au

pays dont elle vient. Parmi les différentes tailles du diamant, on en distingue sur-tout deux sortes : la taille en brillant & la taille en rose. Le brillant forme deux pyramides jointes base à base, & taillées à facettes sur leurs bords ; le sommet est tronqué, & présente un plan octogone. La pierre étant montée, il n'y a qu'une des deux pyramides de visible, l'autre restant cachée dans le chaton. La rose est un diamant conique, taillé à facettes jusqu'à la pointe, on monte ce diamant sur la base du cône, en sorte que tout est en vue, & que rien ne reste caché dans le chaton. Les diamans taillés en rose, ont beaucoup moins d'éclat que les diamans taillés en brillans : ils sont aussi d'un moindre prix.

L'art imite toutes les pierres précieuses ; on trouve pour cela un grand nombre de procédés dans l'art de la verrerie de Néri, avec les notes de Meret & de Kunkel. Ils se réduisent tous à colorer le crystal avec quelques



chaux métalliques qu'on y incorpore par la fusion.

---

## S E C T I O N II.

Pierres calcaires. *Lapides calcarei.*

**L**ES pierres calcaires se dissolvent dans les acides avec effervescence ; leurs parties sont moins liées que celles des pierres vitreuses ; elles sont moins dures, & ne donnent pas d'étincelles lorsqu'on les frappe avec l'acier : elles se réduisent en chaux par l'action du feu ; mais à son extrême violence elles se fondent en verre , sans addition.

### G E N R E I.

Pierre calcaire tendre qui ne prend pas bien le poli. *Calcareus lapis.*  
WALL.

La pierre calcaire, ou pierre à chaux proprement dite, est tendre, parfaitement opaque , & composée de grains

si peu liés, que beaucoup d'échantillons ne peuvent point du tout recevoir le poli, & que les plus beaux ne le reçoivent que mal. Ces pierres sont disposées par couches parfaitement horizontales; elles forment des carrières immenses, & paroissent toutes de nouvelle formation; car on les rencontre pleines de coquillages & autres corps marins, qui paroissent avoir contribué pour beaucoup à leur origine.

## E S P E C E I.

Pierre à chaux blanche. *Lapis calcareus, colore albo.* WALL.

Cette pierre a une consistance plus ou moins solide. Wallérius en distingue beaucoup de variétés: savoir, la pierre à chaux brillante, *lapis calcareus, particulis scintillantibus.* WALL. *Marmor particulis granulatis, micantibus.* LINN. La pierre à chaux inégale, *lapis calcareus, particulis dispersis.* WALL. *Marmor particulis spathoso-squamosis.* LINN. La pierre à chaux compacte, *lapis*

du Règne Minéral. 193

*lapis calcareus particulis indistinctis.*  
WALL. *Marmor vagum, solidum, cortice argillaceo.* LINN. La pierre de liais dont on se sert à Paris est de cette espèce.

E S P E C E II.

Pierre à chaux grise. *Lapis calcareus ; griseus.* WALL.

E S P E C E III.

Pierre à chaux, jaune ou brune. *Lapis calcareus, fuscus.* WALL.

E S P E C E IV.

Pierre à chaux rouge. *Lapis calcareus ; rubens.* WALL.

E S P E C E V.

Pierre à chaux verte. *Lapis calcareus ; viridis.* WALL.

E S P E C E VI.

Pierre à chaux noire. *Lapis calcareus niger.* WALL.

E S P E C E VII.

Pierre à chaux veinée. *Lapis calcareus venosus.* WALL.

Tome I.

R

Wallérius appelle la pierre à chaux remplie de coquilles, *lapis calcareus, conchaceus*.

On peut ajouter aux pierres à chaux tendres, les matières végétales ou animales qui en ont pris le caractère; tels sont les bois pétrifiés calcaires, les madreporites ou madrepores pétrifiés, renfermant les astroïtes, les tubiporites, les milleporites, les escarites ou rétéporites, les méandrites ou cérébrites, les alcyonites ou alcyons pétrifiés, les porpites ou espèce de champignons de mer arrondis en forme de boutons; les hippurites qui paroissent d'autres petits polypiers articulés les uns dans les autres; les corallites.

On doit encore rapporter aux pierres à chaux toutes les coquilles, tant univalves que bivalves ou multivalves; les trochites entroques, ou astéries, qui sont de petites pierres en étoile, provenant d'une espèce de zoophyte, appelé *palmier marin*; les astacolites gammarolites ou cancrites, qui sont

des écrevisses ou crabes pétrifiés ; les entomolites ou insectes pétrifiés ; les ichtyolites ou poissons pétrifiés ; les ornitholites ou oiseaux pétrifiés ; les amphibiolites ou amphibies pétrifiés ; les zoolites ou quadrupèdes pétrifiés ; & les anthropolites ou parties humaines pétrifiées. Il faut encore y joindre toutes les pierres figurées , comme les glossopetres , qu'on croit être des dents de requin pétrifiées ; les bélemnites qui sont regardées par quelques Auteurs comme des pointes d'oursin pétrifiées , & par d'autres comme des stalactites ; les pierres judaïques , qui sont des petits corps olivaires , dont la superficie est quelquefois lisse , & quelquefois marquée de petits points saillans ; on les regarde aussi comme des pointes d'oursin ; les pierres numismales ou liard de S. Pierre ; elles ont reçu ce nom par leur ressemblance avec de petites pièces de monnoie ; on croit que ce sont de petites cornes d'ammon pétrifiées & appliquées les

## 198 Introduction à l'Etude

unes sur les autres ; le Bezoard fossile, qui est une espèce de pierre calcaire arrondie, formée de plusieurs couches concentriques ; la pierre appelée *Ludus helmontii*, qui est arrondie & couverte de veines saillantes, qui forment une espèce de réseau à sa surface. Il y a encore un très-grand nombre de pierres figurées, telles que les pisolites, oolites, méconites, &c. sur les détails desquelles on peut consulter les Auteurs qui en ont traité.

## G E N R E II.

Marbre. *Marmor*. WALL, *Marmor nitidum*. LINN.

Le marbre est plus dur que la pierre à chaux ; il est susceptible d'un plus beau poli ; on le rencontre communément en masses dont le grain est fin ; quelquefois il paroît composé de plusieurs petites masses arrondies, liées par un suc de même nature, on le nomme alors *brèche*. On en trouve aussi qui pa-

roît contenir des coquilles qui ont conservé leur forme ; les Italiens l'appellent *lumachella*. On distingue encore parmi les marbres ceux qui portent des dessins de plantes ou d'autres corps, & qu'on appelle *marbres figurés* ; ils ne sont pas aussi susceptibles du poli que les autres : il y en a parmi ces derniers, qui ne font presque pas d'effervescence avec les acides, & qui sont assez durs pour donner quelques étincelles, lorsqu'on les frappe avec l'acier.

E S P E C E I.

Marbre blanc pur. *Marmor unicolor album*. WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus, opacum, compactum, poliendum, album seu parium*. LINN.

Il y a des échantillons de ce marbre dont le grain est plus ou moins fin. Lorsqu'il est un peu gros & transparent, on lui donne le nom de *marbre salin*.

E S P E C E II.

Marbre blanc varié. *Marmor variegatum album*. WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , maculatum , album seu Africanum*. LINN.

E S P E C E III

Marbre gris. *Marmor unicolor venetum*. WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , cinereum , seu venetum*. LINN.

E S P E C E IV.

Marbre gris varié. *Marmor variegatum venetum*. WALL.

E S P E C E V.

Marbre jaune. *Marmor unicolor flavum*. WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , flavum , seu phengites*. LINN.

Le jaune antique , & le jaune de Sienne font de cette espèce.



E S P E C E V I.

Marbre jaune varié. *Marmor variegatum flavum*. WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus, opacum, compactum, poliendum, maculatum, luteum, seu porta sancta*. LINN.

La brocatelle est de cette espèce.

E S P E C E V I I.

Marbre brun. *Marmor unicolor lividum*. WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus, opacum, compactum, poliendum, rufum, seu numidium*. LINN.

E S P E C E V I I I.

Marbre brun veiné. *Marmor variegatum lividum*. WALL.

E S P E C E I X.

Marbre rouge. *Marmor unicolor rubrum*. WALL.



## E S P E C E X.

Marbre rouge varié. *Marmor variegatum rubrum*. WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , purpurascens seu lesbium*. LINN.

## E S P E C E XI.

Marbre violet. *Marmor unicolor violaceum*. WALL.

## E S P E C E XII.

Marbre varié violet. *Marmor variegatum , violaceum*. WALL.

## E S P E C E XIII.

Marbre bleu. *Marmor unicolor cœruleum*. WALL.

## E S P E C E XIV.

Marbre bleu varié. *Marmor variegatum cœruleum*. WALL.



E S P E C E X V.

Marbre verd. *Marmor unicolor viride.*

WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , viride seu verdello.* LINN.

E S P E C E X V I.

Marbre verd varié. *Marmor variegatum*

*viride.* WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , maculatum , viride seu lacedemonicum.* LINN.

E S P E C E X V I I.

Marbre noir. *Marmor unicolor nigrum.*

WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , nigrum seu lucillum.* LINN.

E S P E C E X V I I I.

Marbre noir varié. *Marmor variegatum*

*nigrum.* WALL. *Marmor particulis subimpalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , maculatum , nigrum seu canariense.* LINN.

E S P E C E XIX.

Brèche blanche. *Marmor particulis argillofis , ætitis cryſtallinis ſparſis , album.* LINN.

Il n'eſt queſtion dans toutes les eſpèces de brèches , que de la couleur dominante, qu'on nomme le *fond*.

E S P E C E XX.

Brèche grife. *Marmor particulis argillofis , ætitis cryſtallinis ſparſis , cinereum.* LINN.

E S P E C E XXI.

Brèche jaune. *Marmor particulis argillofis , ætitis cryſtallinis ſparſis , flavum.* LINN.

La brèche d'Alep eſt de cette eſpèce.

E S P E C E XXII.

Brèche violette. *Marmor particulis argillofis , ætitis cryſtallinis ſparſis , violaceum.* LINN.

E S P E C E XXIII.

Brèche verte. *Marmor particulis argilosis , ætitis crystallinis sparsis , viride.* LINN.

Le verd antique est de cette espèce.

E S P E C E XXIV.

Lumachelle ou marbre de coquilles gris. *Marmor friabile , particulis crustaceis , cinereum.* LINN.

E S P E C E XXV.

Lumachelle jaune. *Marmor friabile , particulis crustaceis , flavum.* LINN.

E S P E C E XXVI.

Lumachelle rouge. *Marmor friabile ; particulis crustaceis , rubrum.* LINN.

E S P E C E XXVII.

Lumachelle verte. *Marmor friabile , particulis crustaceis , viride.* LINN.

E S P E C E XXVIII.

Lumachelle noire. *Marmor friabile , particulis crustaceis , nigrum.* LINN.

E S P E C E XXIX.

Marbre figuré de Hesse. *Marmor figuratum Hassiacum*. WALL.

Ce marbre est gris ; il représente des arbres & des buissons , & prend mal le poli.

E S P E C E XXX.

Marbre figuré de Florence. *Marmor figuratum Florentinum*. WALL. *Marmor particulis impalpabilibus , opacum , compactum , poliendum , flavicans*. LINN.

Il représente des apparences de ruine.

G E N R E III.

Spath. *Spathum*.

Le spath diffère de toutes les autres pierres calcaires par une sorte de transparence plus ou moins parfaite , & par les formes régulières qu'il affecte , & qui sont très-variées. Le spath paroît toujours plus ou moins feuilleté , & n'a

jamais l'apparence vitreuse du quartz. Il fait effervescence avec les acides & s'y dissout entièrement. On ne doit pas confondre dans ce genre le *feld-spath*, ou *spath des champs*, qui donne des étincelles lorsqu'on le frappe avec l'acier, non plus que les *spaths vitreux* & fusibles, qui sont d'une nature toute différente, & qui n'ont de commun avec le vrai spath qu'une sorte de ressemblance extérieure,

E S P E C E I.

Spath transparent, sans couleur. *Spathum pellucidum, molle. WALL. Spathum solubile, pellucidum, objectis simplicibus, vel objecta duplicans. LINN.*

Ce spath est le plus pur & le plus transparent de tous. On le trouve communément cristallisé en rhomboïdes. Il y en a des échantillons qui ont la propriété de doubler les objets qu'on regarde au travers : on nomme ce spath *crystal d'Islande*. On rencontre aussi des

spaths crySTALLIFÉS en cubes, en lames & en filets.

## E S P E C E II.

Spath d'un blanc laiteux. *Spathum pellucidum*, *album*. WALL. *Spathum solubile*, *subdiaphanum*, *compactum*, *album*. LINN.

Ce spath est également disposé en lames, en filets, en cubes, en rhomboïdes : on le trouve aussi assez communément crySTALLIFÉ en colonnes hexagones, ou à un plus grand nombre de côtés : ces colonnes sont assez généralement tronquées, ce qui distingue les crySTaux de spath des véritables crySTaux de roche.

## E S P E C E III.

Spath jaune. *Spathum pellucidum*, *flaves cens*. WALL. *Spathum solubile*, *subdiaphanum*, *compactum*, *flaves cens* LINN.



E S P E C E IV.

Spath rougeâtre. *Spathum pellucidum, rubrum.* WALL.

E S P E C E V.

Spath verd. *Spathum pellucidum, viride.* WALL. *Spathum solubile, subdiaphanum, compactum, virescens.* LINN.

E S P E C E VI.

Spath noirâtre. *Spathum pellucidum, nigricans.* WALL.

On donne le nom de *Pierre porc*, ou *Pierre puante*, à quelques échantillons de spath calcaire qui exhalent une odeur fétide.

G E N R E IV.

Pierres calcaires formées par l'eau. *Concreta indurata, pori aquei.* WALL.

Parmi les pierres que l'eau forme journellement des portions de matière

## 208 Introduction à l'Etude

calcaire qu'elle a détachées & qu'elle charrie avec elle, il y en a qui sont transparentes & semblables au spath ; d'autres sont parfaitement opaques.

### E S P E C E I.

Stalactite transparente. *Porus aqueus stillicidius in aere sub stillicidio concretus, pendulus.* WALL. *Stalactites cretaceus tunicato-crustaceus, apice perforato natroso.* LINN.

C'est la plus pure des stalactites.

### E S P E C E II.

Stalactite blanche. *Stalactites albus salinus.* WALL.

On peut rapporter à cette espèce une sorte de stalactite rameuse & blanche, connue sous le nom de *flos ferri*. *Minera ferri albi germinans.* WALL. *Stalactites marmoreus, ramulosus.* LINN.

### E S P E C E III.

Stalactite grise. *Stalactites griseus, calcareus.* WALL.

ESPECE

E S P E C E IV.

Stalactite jaune. *Stalactites flavus.*

E S P E C E V.

Stalactite rouge. *Stalactites ruber ochraceus.* WALL.

Le nom de stalactite est pris ici pour toutes les pierres formées par l'eau, qui ont une sorte de transparence ; mais la plupart des Naturalistes ne le donnent qu'aux portions les plus transparentes qui se trouvent attachées aux voûtes des grottes souterraines, & y forment des espèces de culs de lampe, ou de pyramides renversées ; ces pyramides sont formées de rayons qui convergent autour d'un canal creux, rempli d'une matière terreuse non cristallisée. On appelle *congélations* les morceaux qui coulent le long des parois des cavernes, & qui sont communément mammelonés. Enfin, on nomme *stalagmites*, les portions les plus grossières qui sont tombées sur le plancher

des grottes, à cause de leur plus grande pesanteur : elles sont plus opaques que les autres.

Toutes ces pierres acquièrent avec le temps une dureté assez grande pour pouvoir être polies : on les nomme alors *albâtre calcaire*. Il est facile de distinguer l'albâtre calcaire des marbres, par sa transparence & par les couches plus ou moins sensibles qu'on y observe : l'épaisseur de ces différentes couches, & les nuances qu'on y observe, on fait distinguer une infinité de variétés dans les albâtres.

#### E S P E C E V I.

Incrustations. *Porus aqueus crustaceus, circa alia corpora concretus.* WALL.  
*Stalactites vegetabilia incrustans.* LINN.

Les incrustations sont parfaitement opaques ; les tuyaux des fontaines, qui charrient des eaux chargées de matière calcaire, s'en trouvent souvent remplis : les plantes qui croissent dans ces eaux en sont toutes couvertes ; & lorsque

ces incrustations ont été déposées autour des tiges de quelques grosses plantes, on les trouve creuses dans leur intérieur, & formant un assemblage de tuyaux, qu'on a nommé *ostéocolle*, ou *pierre des os rompus*.

E S P E C E VII.

Tuf. *Porus aqueus solidus, sub aqua minus vel non fluente, deposita materia concretus.* WALL. *Tophus glareoso-argillaceus, polymorphus.* LINN.

Le tuf est communément gris. Il est mol au sortir de sa carrière, & a une sorte d'onctuosité : il se laisse facilement travailler, & prend en séchant beaucoup de solidité & de blancheur. Cette pierre paroît contenir un peu d'argille : c'est une sorte de marne pierreuse, commune en Anjou. On trouve dans le tuf beaucoup de coquilles pétrifiées.

*Analyse des Pierres calcaires.*

Les pierres calcaires sont formées d'une terre très-fine, qui, suivant l'o-

pinion commune, est produite par la destruction des coquilles & autres parties animales. Cette terre est souvent altérée par le mélange du sable, des matières métalliques, salines ou grasses; lorsqu'on l'expose au feu, elle perd, à-peu-près, la moitié de son poids: elle devient plus friable qu'elle n'étoit: on la nomme alors *chaux vive*. Si dans cet état on la laisse exposée à l'air, elle se réduit, au bout de quelque temps, en une poudre légère, qui se trouve à-peu-près de même poids que la pierre avant sa calcination: c'est ce qu'on appelle *chaux éteinte à l'air*.

La *chaux vive* jettée dans l'eau, y produit une chaleur & un bouillonnement considérable: la pierre commence par se fendre, & se réduit ensuite entièrement en une bouillie blanche, qui se sèche avec le temps, & se met en poudre. Si on étend d'une grande quantité d'eau cette bouillie encore liquide, on voit paroître à la surface de la liqueur une pellicule saline, & pres-

que toute la terre se précipite au fond. Cette pellicule enlevée avec soin, il s'en reforme une autre, & la même eau de chaux peut en fournir plusieurs. Si après les avoir enlevées toutes, on examine la terre qui s'est précipitée, on la trouvera dans l'état d'une craie qui n'a nullement les caractères de chaux. Cette craie, calcinée une seconde fois, peut se convertir en chaux vive, & fournir une nouvelle quantité de cette crème saline; en sorte que par des calcinations répétées, il est possible de convertir en crème saline toute une quantité donnée de pierre à chaux. La crème saline examinée séparément, paroît différer de la pierre à chaux par sa dissolubilité dans l'eau, par la propriété qu'elle a de verdir le syrop de violettes, par la facilité avec laquelle elle décompose le sel ammoniac, même sans le secours du feu, ce que ne fait pas la craie; enfin, par l'action qu'elle a sur les huiles & sur l'esprit-de-vin.

Toutes ces qualités rapprochent sin-

gulièrement la crème saline de la chaux des sels alkalis fixes : quelques Auteurs ont même cru que la pierre à chaux contenoit une certaine quantité de matière alcaline ; mais il est aisé de se convaincre que quand il y en auroit, elle ne contribueroit pas à la formation de la crème saline. Car la pierre à chaux qu'on fait bouillir dans l'eau distillée , ne fournit point de crème saline : la chaux parfaitement éteinte à l'air n'en fournit pas non plus ; ce qui prouve que cette crème n'existoit pas dans la chaux même calcinée. La chaux vive est seule capable d'en produire, & il paroît qu'elle se forme au moment même de l'extinction dans l'eau.

M. Frédéric Meyer prétend que la chaux contient un acide uni à la matière du feu , & dans l'état d'une espèce de soufre : il nomme cet acide *acidum pingue* ; il fait dériver de cet acide toutes les propriétés de la chaux. M. Macbride attribue une grande partie des propriétés que la pierre à chaux prend dans



sa calcination , à la perte que cette pierre fait de l'air fixe qu'elle contenoit. Il prétend que cet air suffit pour donner de la consistance à la pierre à chaux , & que ce n'est qu'en le perdant qu'elle devient friable. Cependant il faut observer que la chaux calcinée, quoique moins dure que ne l'étoit la pierre calcaire avant sa calcination , conserve pourtant une assez grande solidité , qu'elle ne perd qu'après avoir attiré une certaine quantité de l'humidité de l'air , qui la pénètre & la réduit en poudre. Le même Auteur assure que la dissolubilité de la chaux dans l'eau , ne vient encore que de la privation de l'air fixe , & qu'en le lui rendant , elle perd cette propriété. Voici l'expérience qu'il apporte en preuve. Il met de l'eau de chaux très-claire dans un flacon, au col duquel il ajuste un tuyau courbe, qui plonge dans un autre flacon : il mêle dans ce second flacon un acide avec un alkali ; les vapeurs qui s'élèvent de ce mélange venant à tomber dans l'eau

## 216 *Introduction à l'Etude*

de chaux par le canal de communication, y occasionnent un précipité considérable. Pour que cette expérience fût concluante, il faudroit être assuré qu'il ne se dégage que de l'air dans l'effervescence qui a lieu par le mélange d'un acide & d'un alkali. Or, il est constant que dans ces sortes de combinaisons une portion des matières salines est lancée même assez loin, & que cette portion suffit pour précipiter l'eau de chaux.

L'opinion la plus généralement reçue, est que la crème de chaux est un mixte salin, qui se forme au moment même de l'extinction de la chaux. Pour concevoir cela, il suffit de faire attention que la pierre calcaire a perdu la moitié de son poids par la calcination; que cette portion perdue n'est presque que de l'eau, que la chaux peut reprendre d'une manière lente, si on la laisse exposée à l'air; mais que si on la plonge dans une grande quantité d'eau, lorsqu'elle est encore vive & bien sèche, elle

elle absorbe ce fluide avec une très-grande rapidité, & le frottement qui résulte de cette union, suffit pour produire une chaleur considérable. Dans cette action vive de l'eau sur la chaux, les parties terreuses les plus fines de cette substance s'unissent aux molécules intégrantes de l'eau, pour ainsi dire, chacune à chacune; & il résulte de cette union un sel simple, mais dans lequel le principe terreux est surabondant, ce qui lui donne les caractères des alkalis, plutôt que ceux des acides. L'alkali fixe cependant est en état de précipiter l'eau de chaux; il paroît que cela dépend de la plus grande dissolubilité de l'alkali, qui s'empare de l'eau qui tenoit la crème saline en dissolution. La chaux agit sur le soufre, & le dissout comme les sels alkalis; elle augmente la causticité des alkalis fixes auxquels on la mêle; elle décompose le sel ammoniac, & même l'alkali volatil qu'elle en sépare; elle précipite les sels neutres à base métallique.

218 *Introduction à l'Étude*  
*Usages de la Chaux.*

L'eau de chaux sert aux Chirurgiens comme escarrotique ; on la prescrit aussi à l'intérieur , lorsqu'elle est fort étendue d'eau, & dans l'état d'eau de chaux seconde. L'eau de chaux, mêlée à une certaine quantité de dissolution de sublimé corrosif, y occasionne un petit précipité ; la liqueur est trouble & un peu rousâtre : elle est employée par les Chirurgiens, sous le nom d'*eau phagédénique*.

La chaux éteinte contracte avec le sable une union très-intime, & forme le mortier dont on se sert pour bâtir. La chaux éteinte fait avec le blanc d'œuf un lut d'usage en Chymie.

---

S E C T I O N III.

Pierres argilleuses. *Lapides apyri*;  
WALL. *Petra argillacea*. LINN.

LES pierres argilleuses sont composées de parties fines , assez étroitement

liées ensemble ; elles ne font point de feu lorsqu'on les frappe avec l'acier ; elles ne produisent point d'effervescence avec les acides ; leur tissu est feuilleté comme celui des terres argilleuses ; beaucoup d'entr'elles ont de l'onctuosité.

G E N R E I.

Pierres argilleuses, solides & grasses.

*Lapis ollaris.* WALL.

Les pierres ollaires sont dures & prennent assez bien le poli ; elles ont une forte d'onctuosité ; leur cassure paroît feuilletée ; elles ne donnent point d'étincelles lorsqu'on les frappe avec le briquet, & ne font point effervescence avec les acides. Aucune de ces pierres ne se fond au feu , comme l'a remarqué M. d'Arcet.

E S P E C E I.

Pierre de lard. *Lardites.* BOMARE.

Cette pierre est grasse, assez tendre, & reçoit bien le poli ; elle est quel-

## 220 Introduction à l'Etude

quefois blanche; souvent aussi elle tire sur le jaune ou sur le verd. On en fait à la Chine différentes figures.

### E S P E C E. II,

Jade, pierre néphrétique. *Gypsum viride, semipellucidum, fissile.* WALL.  
*Talcum præpoliendum, viride, subdiaphanum, particulis subfibrosis.* LINN.

Le jade a une couleur verte, plus ou moins foncée, olivâtre ou brune; il a l'aspect gras des pierres ollaires, & prend la même sorte de poli; il en diffère cependant en ce qu'il est beaucoup plus dur, ce qui le rend très-difficile à travailler. Cette pierre produit des étincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier, ce que ne font pas les autres pierres argilleuses: il paroît que cette propriété ne lui vient que de son extrême dureté; & c'est à tort, comme le remarque M. d'Arçet, que quelques Auteurs l'ont rangé parmi les agates; car le jade rougi au feu & jetté dans l'eau, ne se brise pas; lorsqu'on le

pousse à la violence du feu, il perd sa couleur pour en prendre une jaune, ventre de biche; & loin de devenir plus friable, comme font les agates, il durcit au point de donner beaucoup plus d'étincelles qu'il n'en donnoit avant d'avoir souffert l'action du feu.

E S P E C E III.

Pierre ollaire d'un verd obscur, marqué de petits points noirs. Serpentine.  
*Ollaris solidus griseus, pinguior, polituram non admittens.* WALL.

La serpentine est d'un verd obscur, marqué de petits points noirs & blancs; on en fait différens vases, auxquels on a faussement attribué la merveilleuse propriété de se briser lorsqu'on verse dedans des liqueurs empoisonnées. Cette pierre est absolument infusible, comme toutes celles de ce genre, & elle prend beaucoup de dureré au feu.

M. d'Arcet rapporte à la classe des pierres ollaires, la pierre de chapelet de Galice, qui, étant travaillée, repré-

sente une croix noire, assez semblable aux armes de la maison de Rohan. On peut encore ranger dans la même classe, la macle, qui est une espèce de petite pierre grasse, figurée en losange, qu'on trouve en Bretagne, quoiqu'elle soit plus fusible que les autres pierres ollaires; sa fusibilité paroissant venir d'une assez grande quantité de fer qu'elle contient.

### G E N R E II.

Pierres argilleuses, tendres & onctueuses. Stéatites. *Ollaris mollior.*  
WALL.

Quoique le nom de stéatite ou de smectite appartienne en général à toutes les pierres qui sont grasses au toucher, il est pris ici pour désigner particulièrement des pierres grasses, moins dures que les pierres ollaires, & qui paroissent plus sensiblement feuilletées,





E S P E C E I.

Pierre ollaire, tendre & blanche. Craie de Briançon blanche. *Talcum solidum, semipellucidum, pictorium.* WALL. *Talcum ungue rasile, albo inquinans.* LINN.

La stéatite blanche a été improprement nommée craie de Briançon ; elle n'a rien de commun avec la craie ; elle diffère des talcs, en ce qu'elle n'est pas aussi feuilletée, qu'elle est plus onctueuse & moins transparente : elle a cependant comme eux la propriété de se fondre, mais très-difficilement.

E S P E C E II.

Stéatite verdâtre. Craie verte de Briançon. *Creta Briançonia, viridis.* WALL.

E S P E C E III.

Stéatite verte marbrée. *Steatites viridis, variegata.*

Cette stéatite est tendre & très-grasse au toucher.

## E S P E C E I V.

Stéatite noire. *Steatites Nigra*.

Cette stéatite est onctueuse, mais moins que la précédente. On s'en sert pour tracer des lignes sur les étoffes : les Italiens la nomment *pietra dei farti*.

Cette pierre ne fond point au feu comme les autres espèces de stéatite.

## E S P E C E V.

Stéatite de couleur de plomb. Molybdène. *Mica pictoria nigra, manus inquinans. WALL. Molybdænum, trituratæ cœrulescente.*

La molybdène, appelée *mine de plomb des Peintres*, *mine de plomb savonneuse* & *plombagine*, est une espèce de stéatite ou talc gras, qui salit les doigts lorsqu'on le touche, & les teint d'une couleur de plomb. Plusieurs Minéralogistes ont cru qu'elle contenoit du zinc ; mais cela n'est pas encore bien prouvé.

G E N R E III.

Pierres argilleuses feuilletées, opaques & sèches. Schistes. *Fissilis*. WALL. *Schistus*. LINN.

Les Auteurs ont donné le nom de *schiste* à toutes les pierres feuilletées ; mais ce nom est pris ici dans une acception moins générale, & sert seulement à désigner les pierres argilleuses, qui ne sont point grasses au toucher, & sont composées de feuillets opaques. Les schistes ne donnent point d'étincelles lorsqu'on les frappe avec l'acier, mais ils se fendent tous par l'action du feu.

E S P E C E I.

Schiste noir tendre. Ampélites. *Fissilis mollior, friabilis, pictorius*. WALL. *Schistus scripturæ atræ, ater inquinans*. LINN.

Cette espèce de schiste est noire & excessivement tendre ; elle souffre une

## 226 Introduction à l'Etude

espèce de décomposition à l'air ; on y trouve beaucoup de pyrites, & souvent même de l'alun ; on s'en sert pour faire des dessins grossiers.

### E S P E C E II.

Schiste gris. *Fissilis solidus, durissimus, in lamellas non divisibilis.* WALL.  
*Schistus scripturæ cinereæ.* LINN.

Ce schiste quoique formé de feuillets, ne peut pas cependant se partager dans le sens des lames qui le composent, à cause de sa trop grande dureté.

### E S P E C E III.

Schiste rouge. *Schistus solidus, ruber.*

### E S P E C E IV.

Schiste verd. *Schistus viridis.*

### E S P E C E V.

Schiste d'un bleu obscur. Ardoise. *Fissilis durus, cœrulescens, clangosus.* WALL. *Schistus scripturæ cinereæ, cœrulescenti, niger, tumitans.* LINN.

Cette pierre est feuilletée, & se casse aisément dans le sens des lames; on s'en sert pour couvrir les maisons. Quelquefois cette pierre est tendre, on la nomme alors *fissilis mollior*. WALL.

E S P E C E VI.

Schiste noir dur. *Fissilis subtilior, polituram quodammodo admittens*. WALL. *Schistus scripturæ niveæ, ater, impalpabilis, æqualis, fissilis*. LINN.

Ce schiste se trouve désigné sous le nom d'*ardoise de table*; son grain est fin, & assez dur pour recevoir le poli. On en fait des tables ou planches à des-  
finer.

E S P E C E VII.

Schiste dur, semblable à la pierre ol-  
laire. Pierre à rasoir ou pierre Na-  
xienne. *Fissilis solidus, mollior, lamellis crassioribus*. WALL. *Schistus scripturæ albæ, ater, solidus, poliendus*. LINN.

Ce schiste est ou brun, ou jaune, sou-

## 228 *Introduction à l'Etude*

vent composé de deux couches, dont l'une est brune & l'autre jaune. On se sert de cette pierre pour repasser les rasoirs, après l'avoir frottée d'huile. Elle a beaucoup de rapport avec les pierres ollaires; elle en diffère cependant en ce qu'elle paroît moins grasse, & qu'elle peut se fondre au feu.

### *G E N R E IV.*

Pierres argilleuses tendres, composées de feuillets transparens. *Talc.*  
*Talcum.*

Les pierres de ce genre sont composées de feuillets tendres & flexibles, qui ont une transparence plus ou moins parfaite; quoique leur grain soit fin, leur tissu ne permet pas de les polir. On donne le nom de *talc* à celles d'entre ces pierres, qui sont formées de feuillets assez grands; on les appelle *mica* quand les feuillets sont plus petits; mais elles sont absolument de même nature,

& ne doivent point être regardées comme des genres différens.

E S P E C E I.

Talc blanc. *Talcum albicans*, *lamellis pellucidis*. WALL. *Mica lamellis flexuosis*, *friabilibus*, *virescenti-albidis*, *diaphaneis*. LINN.

On nomme verre de Moscovie, les échantillons les plus transparens de ce talc, & mica blanc ou argent de chat, ceux qui sont composés de feuillets plus petits.

E S P E C E II.

Talc jaune. *Talcum luteum*, *lamellis opacis*, *friabilissimum*. WALL. *Mica lamellis flexuosis*, *fragilibus*, *auratis*. LINN.

On trouve souvent ce talc en petites paillettes jaunes & comme dorées; on le nomme alors mica jaune ou or de chat : quelquefois on le trouve strié. Wallérius le nomme *mica particulis tenuioribus*, *oblongis*, *acuminatis*.

E S P E C E III.

Talc verd. *Talcum viride*. WALL.

E S P E C E IV.

Talc rouge. *Talcum rubrum*. WALL.

E S P E C E V.

Talc noir. *Talcum nigrum*. WALL.

On nomme toujours *mica*, les échantillons de ces espèces, formés de petits feuillets.

Tous les talcs se fondent en verre sans addition, comme M. d'Arcet l'a fait voir; mais il faut pour cela un feu de la dernière violence. Le talc blanc se fond moins aisément que celui qui est coloré. Il est vraisemblable que les matières colorantes servent alors de fondans.

G E N R E V.

Pierres argilleuses composées de filets. Amiantes.

Ce genre en renferme deux, celui de l'asbeste, *Asbestus*, WALL. & celui de



l'amiante, *Amiantus*; WALL. ces deux pierres ne diffèrent pas essentiellement l'une de l'autre.

E S P E C E I.

Amiante blanche à filets flexibles.

Amiante mûre. Lin fossile. *Amiantus fibris mollioribus, parallelis, facile separabilibus*. WALL. *Amiantus fibrosus, fibris separabilibus, flexilibus, tenacibus*, LINN.

Les filets qui composent cette amiante sont longs, soyeux, & d'un blanc argentin. Il est facile de les séparer.

E S P E C E II.

Amiante blanche à filets durs, Amiante non mûre. *Amiantus fibris rigidioribus, parallelis, non separabilibus*. WALL.

E S P E C E III.

Amiante verte à filets flexibles. Asbeste mûre. *Asbestus fibris parallelis, tenacioribus, separabilibus*. WALL.

Cette amiante est d'une couleur grise

verdâtre , & quoique les filets qui la composent soient flexibles , ils sont toujours plus cassans que ceux du lin fossile. La pesanteur de la pierre est aussi plus considérable.

## E S P E C E IV.

Amiante verte à filets durs & cassans:

Asbeste non mûre. *Asbestus fibris parallelis , durioribus , non separabilibus.*

WALL. *Amiantus fibrosus , fibris connatis , angulatis , rigidis , opacis.* LINN.

On rencontre dans cette espèce des échantillons dont les filets sont disposés en étoile. *Asbestus fibris è centro radiantibus.* WALL. Dans quelques-uns ces filets forment des paquets ou faisceaux. *Asbestus fibris fasciculatis , è centro vario radiantibus.* WALL. Dans d'autres enfin , les filets sont dispersés ; on les nomme asbestes en épis. *Asbestus fibris sparsis , lapis acerosus.* WALL.



ESPECE

E S P E C E V.

Amiante blanche à filets entortillés & flexibles. Cuir de montagne. *Amiantus fibris mollioribus, intertextis, in lamellas compactus, levis.* WALL. *Amiantus corticosus, flexilis, membranaceus, natans.* LINN.

Les filets qui composent cette amiante sont entortillés & comme feutrés ; ils représentent des morceaux de carton ; lorsque les feuilles sont plus épaisses, on leur donne le nom de chair fossile. *Amiantus fibris durioribus, in lamellas crassiores compactus, ponderosus.* WALL. *Amiantus corticosus, flexilis, natans* LINN.

E S P E C E VI.

Liege fossile. *Asbestus fibris flexilibus, inordinate se intercussantibus, levissimus.* WALL. *Amiantus corticosus, flexilis, suberosus.* LINN.

Cette espèce d'amiante est grise ; les filets qui la composent sont fort entortil-

## 234 *Introduction à l'Etude*

lés & forment des masses , qui quoiqu'assez volumineuses, sont cependant très-légères, & ressemblent au liege, autant par la couleur , que par la légèreté.

Toutes les amiantes paroissent fusibles. M. d'Arcet a fait couler en un verre noir , mais bien transparent , une amiante filée , & une qui ne l'étoit pas. Henkel avoit dit que le liege fossile se fondoit seul & sans addition : M. d'Arcet soupçonne que la matière colorante du liege fossile pouvoit bien aider cette fusion ; car , ayant répété l'expérience sur du liege fossile lavé avec soin, il n'a pu le fondre ; il est vrai qu'il n'a pas eu dans cette expérience , tout le feu qu'il a pu avoir quelquefois. Il y a bien de l'apparence qu'il se seroit fondu , puisque la chair de montagne , qui est une espèce fort voisine du liege fossile, a coulé en verre.



G E N R E VI.

Zéolite. *Zeolitus. Stalactites spathosus, rufescens.* LINN.

La Zéolite est une pierre d'une nature singulière, & qui n'a pas encore été déterminée. Elle n'a que peu de pesanteur; son tissu paroît comme feuilleté & composé de filets. On en trouve cependant des échantillons plus denses, & qui sont comme crySTALLISÉS. Lorsqu'on met cette pierre au feu, elle se fend, & paroît prendre d'abord une espèce d'enduit vitreux : mais elle ne fond point. J'en ai tenu inutilement pendant cinq heures, au feu le plus violent d'un fourneau capable de fondre très-promptement en verre les schistes, & beaucoup d'autres pierres dures. M. Macquer en a exposé au fourneau qui cuit la porcelaine de Sèvres, sans qu'elle y ait fondu. La légèreté de la zéolite, son tissu feuilleté & son infusibilité, m'ont engagé à la placer à la

suite des pierres argilleuses. Dans la nouvelle *Minéralogie*, attribuée à M. Cronstedt, la zéolite est regardée comme une matière d'une nature singulière : l'auteur lui assigne pour caractère de se durcir lorsqu'on verse dessus de l'acide vitriolique. Cette propriété n'est pas particulière à la zéolite ; l'arsenic se comporte de même avec l'acide vitriolique : il faut dans les deux cas que l'acide soit très-concentré. Lorsqu'on emploie un acide minéral quelconque, un peu foible, la zéolite s'y dissout, & forme une espèce de sel mucilagineux, ou de gelée blanche & bien transparente, comme le chevalier Von-Linné en fait mention dans la dernière édition de son *Systema Naturæ*. Ce caractère gélatineux que prend la zéolite dissoute dans les acides, n'est pas encore particulier à cette substance : l'étain fait une très-belle gelée avec l'eau régale : le lapis lazuli, après avoir été grillé, en forme une semblable avec tous les acides. Quelques Auteurs même n'ont pas

fait difficulté de regarder cette pierre comme une espèce de zéolite ; mais elle en diffère à bien des égards, & la propriété qu'elle a de former un fel gélatineux ne lui est pas seulement commune avec la zéolite , mais encore avec la pierre hématite, & la plupart des mines de fer, qui, comme le lapis, ont besoin d'être grillées, tandis que la zéolite n'a pas besoin de ce grillage préliminaire.

E S P E C E I.

Zéolite blanche. *Zeolitus albus.*

Cette zéolite est d'un blanc brillant, & comme argentin , elle est communément en filets concentriques ; ces filets sont assez semblables à ceux du gyps foyeux de la Chine. On trouve des échantillons plus compacts ; d'autres paroissent comme crySTALLISÉS à leur superficie.

C'est sur la zéolite blanche à filets qu'ont été faites les expériences que je viens de rapporter.

## E S P E C E II.

Zéolite verte. *Zeolitus viridis.*

Cette zéolite est d'un verd obscur ; elle est disposée en filets , comme la zéolite blanche ; mais les filets sont moins apparens. On fait mention d'une zéolite rouge, je n'ai point eu occasion d'en voir : on n'a trouvé encore la zéolite que dans l'Isle de Féro , en Islande. Cette pierre est en masses isolées, ou attachées à la calcédoine , qui est aussi très-abondante dans ce pays.

---

## S E C T I O N IV.

Pierres de roche. *Saxa.* WALL.

**L**ES pierres de roche sont toutes dures ; elles donnent des étincelles , lorsqu'on les frappe avec l'acier : la plus grande partie paroît composée de grains de différente nature : toutes se fondent en verre sans addition.



G E N R E I.

Pierres de roche proprement dites.

*Petro-silex.* WALL.

Wallérius donne le nom de pierre de roche à une pierre dont le grain est assez semblable à celui du jaspe, plus gros dans quelques échantillons, & plus ferré dans d'autres. Cette pierre n'est presque point susceptible du poli; elle n'est point non plus ornée de couleurs vives. Lorsqu'on la casse en fragmens minces, ses bords paroissent avoir une sorte de transparence : enfin, elle se fond au feu, comme l'a démontré M. d'Arcet, ce qui suffit pour la distinguer des jaspes, avec lesquels Wallérius semble avoir eu intention de la réunir.

E S P E C E I.

Pierre de roche blanche. *Petro-silex semi-pellucidus*, *intrinsecè compactior, mollior.* WALL. *Silex rupestris, cortice lacteo, subdiaphanus.* LINN.

240 Introduction à l'Etude

E S P E C E II.

Pierre de roche jaune. *Petro-filix opacus*,  
*intrinsecè compactus*, *mollior*, *flavus*.  
WALL.

E S P E C E III.

Pierre de roche rougeâtre. *Petro-filix*  
*opacus*, *intrinsecè compactus*, *mollior*,  
*rubescens*. WALL.

E S P E C E IV.

Pierre de roche brune. *Petro-filix opa-*  
*cus*, *intrinsecè compactus*, *mollior*, *obs-*  
*cure fuscus*. WALL.

E S P E C E V.

Pierre de roche verte. *Petro-filix opa-*  
*cus*, *intrinsecè compactus*, *mollior*, *vi-*  
*ridis*. WALL.

E S P E C E VI.

Pierre de roche noire. *Petro-filix opa-*  
*cus*, *intrinsecè compactus*, *mollior*, *niger*.  
WALL

ESPECE

E S P E C E VII.

Pierre de roche veinée. *Petro-filix opac-*  
*cus, intrinsecè compactus, mollior, ve-*  
*nosus.* WALL.

G E N R E II.

Feldt-spath. *Spathum durum, late-*  
*ribus nitidis, ad chalybem scin-*  
*tillans.* WALL. *Spathum fixum,*  
*opacum, rufescens, scintillans.*  
LINN.

Cette pierre a toute l'apparence d'un  
spath calcaire ; mais il est aisé de l'en  
distinguer, en ce qu'elle ne fait point  
d'effervescence avec les acides : il n'est  
pas non plus possible de la confondre  
avec les spaths fusibles, parceque tous  
sont dissolubles dans l'eau, tandis  
que cette pierre ne l'est aucunement.  
Le feldt-spath donne beaucoup d'étin-  
celles, lorsqu'on le frappe avec l'acier :  
exposé au feu brusquement, il pétille,  
& finit par se fondre en un beau verre  
transparent.

E S P E C E I.

Feldt-spath blanc. *Spathum pyrimachum*,  
*album*. WALL.

E S P E C E II.

Feldt-spath gris. *Spathum pyrimachum*,  
*cinereum*. WALL.

E S P E C E III.

Feldt-spath rougeâtre. *Spathum pyrima-*  
*chum*, *rubrum*. WALL.

G E N R E III.

Trapp. *Corneus durior*, *niger*, *so-*  
*lidus*. WALL. *Saxum impalpa-*  
*bile*, *schistosum*, *subcalcarium*,  
*fragmentis rhombeis*. LINN.

Cette pierre, à laquelle Wallérius donne le nom de *roche de corne noire*, est décrite dans la nouvelle Minéralogie Suédoise, attribuée à M. Cronstedt, sous celui de *trapp*, qu'on peut lui conserver préférentiellement au nom de *roche de corne*, qui a été appliqué à

beaucoup de substances fort différentes, & qui, pour la plupart, n'ont presque aucune ressemblance avec la corne. Le trapp est parfaitement opaque; exposé au feu, il devient d'une couleur de rouille plus ou moins foncée; & il finit par se fondre en un verre noirâtre. Cette pierre se dissout en partie dans les acides minéraux, & dans toutes les épreuves auxquelles on la soumet, elle donne des indices de fer.

E S P E C E I.

Trapp gris. *Trapp cinereus*.

E S P E C E II.

Trapp verd. *Trapp viridis*.

E S P E C E III.

Trapp noir. *Trapp niger*.

G E N R E IV.

Pierre d'azur. *Lapis lazuli*.

La pierre d'azur a été rangée parmi les jaspes, par le plus grand nombre des Naturalistes: en effet, elle en a la

dureté & le grain; mais elle en diffère par sa fusibilité ; c'est aussi par ce caractère, & par la propriété qu'elle a de donner des étincelles, lorsqu'on la frappe avec l'acier, qu'on peut la distinguer facilement de la zéolite, avec laquelle plusieurs Minéralogistes l'ont confondue. La seule ressemblance qui se trouve entre ces deux pierres, c'est que toutes les deux forment un sel gélatineux par leur dissolution dans les acides ; mais la zéolite le fait sur le champ, au lieu que le lapis a besoin d'être grillé ; d'ailleurs cette propriété lui est commune avec presque toutes les mines de fer. En effet, M. Margraff, célèbre Chymiste de Berlin, a fait voir que cette pierre en contenoit une très-grande quantité ; & que c'étoit de-là que dépendoit sa couleur bleue, plutôt que du cuivre qu'on y avoit faussement soupçonné. Le lapis, dissous dans les acides, perd sa couleur ; les alkalis, versés dans cette dissolution, en précipitent une ocre de fer. Cette pierre mise en pou-

dre, & sublimée avec le sel ammoniac, donne des fleurs jaunes, semblables à celles qu'on nomme *fleurs de sel ammoniac martiales*.

E S P E C E I.

Pierre d'azur. *Jaspis colore cœruleo, alio mixto, cuprifer*. WALL. *Cuprum cœruleum scintillans*. LINN.

Il y a des échantillons de ce lapis, qui sont d'un très-beau bleu; d'autres paroissent couverts de taches jaunes, qui sont produites par les pyrites dont la pierre est remplie.

E S P E C E II.

Pierre d'Arménie. *Lazuli lapis pallide cœruleus, punctulis albis*. WALL. *Cuprum cœruleum calcarium*. LINN.

Cette pierre est d'un bleu clair, parsemé de points blancs. Il n'est point encore parfaitement prouvé que cette pierre soit un véritable lapis lazuli.

On prépare avec le lapis lazuli, la précieuse couleur nommée *bleu d'outre-*

*mer* : elle se fait avec la poudre de lapis, qu'on incorpore avec une pâte faite de cire, d'huile de lin & de poix-résine : on broie ce mélange dans de l'eau chaude ; il s'en détache une partie colorante bleue, qui, avec le temps, se précipite au fond de l'eau.

### G E N R E V.

Schorl, ou Schirl. *Corneus crystallifatus.* WALL.

Le schorl a été regardé par Wallérius comme une roche de corne : on en trouve à la vérité quelques échantillons qui en ont assez l'apparence. Plusieurs Auteurs l'ont regardé comme une pauvre mine d'étain ; d'autres, comme une pauvre mine de fer. On le trouve décrit sous le nom de *basalte*, dans la *Minéralogie* attribuée à M. Cronstedt. Le schorl est fort léger. On le trouve quelquefois cristallisé régulièrement en colonnes à neuf faces inégales, terminées par des pyramides :



quelquefois il est simplement en longs filets, ou en masses informes non crySTALLISÉES.

E S P E C E I.

Schorl rougeâtre. *Corneus crystallifatus ruber.* WALL. *Borax lapidosus, columnaris, politus, pyramidibus triquetris, atrum.* LINN.

Ce schorl est toujours crySTALLISÉ en longs filers, ou en colonnes à neuf faces inégales, terminées par des pyramides triangulaires.

E S P E C E. II.

Schorl verd. *Corneus crystallifatus viridis.* WALL. *Borax lapidosus, columnaris, politus, pyramidibus triquetris, viride.* LINN.

Ce schorl est quelquefois parfaitement compact & sans figure régulière : quelquefois aussi il est crySTALLISÉ en colonnes, comme le schorl violet ou rougeâtre.

Tous ces schorls sont décrits dans

## 248 Introduction à l'Etude

la nouvelle *Minéralogie* attribuée à M. Cronstedt, sous le nom de *bazalte*. Ce nom a encore été donné à une pierre noire qu'on trouve crySTALLISÉE en prismes, & disposée par colonnes, dans le Comté d'Antrim en Irlande, & qu'on appelle communément *pavés de la chaussée des géans*; mais M. Desmarais regarde cette espèce de pierre comme un produit de volcan.

### G E N R E VI.

Porphyre. *Jaspis durissima rubens, lapillulis variis inspersis.* WALL.  
*Saxum impalpabile, striis, punctis maculisque sparsis spathosis.* LINN.

Le porphyre est une pierre qui paroît composée de parties de nature différente. Il donne des étincelles, lorsqu'on le frappe avec l'acier, & se fond en verre par l'action du feu.

E S P E C E I.

Porphyre rouge. *Porphyr rubens*, *lapillis albis*. WALL. *Saxum impalpabile*, *striis*, *punctis*, *maculisque sparsis spathosis*, *purpurascens*, *spathis albis*. LINN.

E S P E C E II.

Ecaille de mer. *Porphyr rubens*, *absque maculis albis*.

L'écaille de mer a été regardée par quelques Auteurs comme une espèce de grais dur. M. d'Arcet dit que cette pierre est parsemée de beaucoup de lames très-petites de talc, ou de mica, & qu'étant exposée au feu, elle y a pris un bon commencement de fusion ; caractère qui détermine à la ranger avec le porphyre.

E S P E C E III.

Porphyre verd. *Saxum impalpabile* ; *striis*, *punctis*, *maculisque sparsis spathosis*, *viride*, *spathis pallidis*. LINN.

Cette espèce ressemble parfaitement

## 250 Introduction à l'Etude

au porphyre rouge, étant, comme lui, mélangée de taches très-petites, noires & blanches. On en trouve dont le fond est de différentes teintes.

### E S P E C E IV.

Porphyre d'un verd foncé, tacheté de blanc. *Ollaris solidus, virescens, maculosus, polituram admittens.* WALL. *Talcum præpoliendum, viridi-maculatum, opacum, particulis granulatis.* LINN.

Cette pierre, qu'on a pris quelquefois pour l'*ophites* de Plinè, ou pour une sorte de serpentine, est d'un verd-foncé, marqué de grandes taches blanches, ou d'un verd clair. Elle prend bien le poli, & donne beaucoup d'étincelles, lorsqu'on la frappe avec l'acier. Elle fond au feu comme le porphyre.



E S P E C E V.

Porphyre noir. *Saxum impalpabile, striis, punctis, maculisque sparsis spathosis, niger spathis albis.* LINN.

Ce porphyre est varié de grandes taches noires & blanches ; il a été pris par quelques-uns pour un granit.

G E N R E VII.

Granit. *Saxum simplex.* WALL.  
*Saxum spathosum, quartzosum micaceumque.* LINN.

Le granit est composé de parties de différente nature , qui sont très-sensibles ; lorsque les particules qui le composent sont fines & bien liées , il prend une sorte de poli qui n'égale jamais celui du porphyre. Les granits fondent au feu. Les espèces de ce genre sont très-multipliées dans les Auteurs : on peut cependant les réduire toutes à trois.



E S P E C E I.

Le granit-blanc ou gris. *Saxum griseum, mixtum.* WALL.

E S P E C E II.

Le granit rouge. *Porphyrrubens, lapillis nigris.* WALL. *Saxum spathosum, quartzosum micaceumque, rufescens.* LINN.

Cette espèce est le *granito rosso*, ou le *granito delle guglie* des Italiens.

E S P E C E III.

Granit noir. *Saxum nigrum, mixtum.* WALL. *Granites Orientalis.* LINN.

Il est composé de quartz, de spath & de mica noir.

G E N R E VIII.

Pudding. *Saxum petrosum, arenaeo-siliceum.* WALL. *Saxum filicibus cretaceis, jaspide connatum.* LINN.

Cette pierre, connue sous le nom

de *pudding* ou *caillou d'Angleterre* , est une sorte de roche composée de cailloux liés par un ciment de la nature du granit. Il y en a des échantillons qui prennent bien le poli , & qui ont quelque ressemblance avec une peau de panthère. On en trouve beaucoup aux environs de Rennes en Bretagne.



---

**C L A S S E III.****S O U F R E. S U L P H U R.**

**L**E soufre est une substance friable, insipide, d'une couleur tantôt rouge, quelquefois blanche ou verdâtre, le plus souvent citronnée. Lorsqu'on le chauffe dans des vaisseaux fermés, il se volatilise en entier sous sa forme naturelle ; mais lorsque l'air a un libre cours dans les vaisseaux, alors il brûle sans laisser de résidu, & se dissipe en une flamme bleue, accompagnée d'une vapeur forte & suffoquante.

Le soufre diffère essentiellement des bitumes, qui laissent une matière carbonneuse après leur déflagration ; c'est mal à propos que les Naturalistes ont confondu ces substances.

On trouve le soufre dans les entrailles de la terre, uni à des matières métalliques dans les mines & dans les py-



rites. On le rencontre aussi pur & mêlé seulement à des terres, à des pierres, à quelques petites portions de métal, ou combiné à l'arsenic, &, pour ainsi dire, minéralisé par lui.

G E N R E I.

Soufre pur. *Sulphur nativum, purum, flavum.* WALL. *Pyrites nudus, diaphanus.* LINN.

Le soufre pur se reconnoît facilement à sa couleur jaune, qui se trouve apparente dans presque tous les échantillons, & lorsqu'elle est moins sensible, l'odeur qui est particulière à cette substance la décèle toujours, & plus facilement encore les vapeurs qu'elle répand, lorsqu'on en jette sur des charbons allumés.



## E S P E C E I.

Soufre en fleur. *Sulphur vivum, pulverulentum, aquis efflorescens.* WALL. *Pyrites nudus, diaphanus, pulvereus.* LINN.

C'est une poudre de soufre très-légère, qui se trouve dans le lit & à la surface de plusieurs eaux minérales, comme celles d'Aix-la-Chapelle.

## E S P E C E II.

Soufre transparent. *Sulphur vivum, pelucidum.* WALL. *Pyrites nudus, diaphanus, clarus.* LINN.

Ce soufre se trouve uni à des pierres de différente nature ; mais le plus souvent à du spath. Il forme quelquefois des masses irrégulières ; quelquefois il est en beaux cristaux octaèdres bien transparens. On trouve le premier abondamment en Suisse ; l'autre en Espagne. Il se sublime souvent du soufre en stalactites, dans les lieux voisins des volcans. Il faut, pour que ces  
stalactites

stalactites se forment, que les vapeurs du soufre se soient rencontrées pendant qu'elles étoient encore très-chaudes.

E S P E C E III.

Soufre mêlé à de la terre. *Sulphur nativum, mixtionis peregrinæ, coloratum.*  
WALL. *Pyrites nudus, impurus.* LINN.

Le terrain de la Solfatara est une espèce de marne grise, légère, fort chargée de soufre.

*Procédés pour extraire le Soufre:*

On retire le soufre des mines qui en contiennent beaucoup, en les grillant. En Saxe & en Bohême on l'extrait des pyrites par la distillation. Cette opération se fait dans des tuyaux de terre, dont l'une des ouvertures est plus large que l'autre. On met dans l'ouverture la plus étroite une étoile de terre; on remplit le tuyau de pyrites, puis on ferme l'ouverture la plus large avec un couvercle de terre, assujéti par un se-

## 258 *Introduction à l'Etude*

cond couvercle de fer lutté exactement : les tuyaux étant placés sur un fourneau , on procède à la distillation.

Le fourneau dont on se sert est long ; il est composé de deux murs de pierre commune, doublés de briques : entre ces deux murs se trouve une cavité ouverte par les deux bouts, qui forme le cendrier. Au-dessus de cette cavité on établit une grille en briques, sur laquelle on met le feu : ce foyer est beaucoup plus étroit que le cendrier, parcequ'on bâtit sur chacun de ces côtés un petit mur de briques, sur lequel on pose les tuyaux. Le fourneau est fermé par un dôme, au-dessus duquel sont plusieurs ouvertures qui donnent issue à la fumée. Le bout le plus mince des tuyaux qui est fermé par une étoile sort du fourneau par des trous pratiqués sur le côté ; & il est reçu dans des caisses quarrées de fonte de fer, dont le dessus est fermé par un couvercle de plomb : c'est dans ces caisses que se rassemble le soufre, à mesure qu'il dis-

tille. Ce soufre après une seconde distillation est fort impur. Pour le raffiner, on le met dans des cucurbites de fer, placées dans un fourneau semblable à celui dans lequel on distille les pyrites: les cucurbites sont fermées par un col de terre qui se courbe un peu, & sort par les trous qui sont aux côtés du fourneau: à chacun des cols de terre, on ajuste une bouteille de terre percée de deux trous; l'un est à la partie supérieure pour recevoir le col de terre qui couvre la cucurbite, l'autre est au bas, & sert à verser le soufre dans un pot de terre placé au-dessous de l'avant-coulant.

On procède à-peu-près de la même manière à la solfatara, pour séparer le soufre de la terre à laquelle il est mêlé; mais les vaisseaux qu'on y emploie, ressemblent davantage à des cornues. Le soufre après une première distillation, est en masses poreuses, mêlées de quelques parcelles de terre ou de substances métalliques; il en est de

même de celui qu'on retire dans le grillage des mines. Pour le purifier, on le fond de nouveau à une chaleur douce, dans une poêle de fer placée sur un fourneau de maçonnerie; lorsqu'il est parfaitement fondu, on le laisse déposer les parties terreuses & métalliques qu'il contient, puis on le verse dans une seconde chaudière de cuivre, où il forme encore un second dépôt. On verse la partie supérieure dans des moules de bois pour avoir le soufre en canons, tel qu'on le débite dans le commerce: le dépôt que le soufre a formé dans la seconde chaudière est gris, on le nomme improprement *soufre vis*.

On peut purifier le soufre une dernière fois, en le faisant fondre à une chaleur douce, & le sublimant dans un appareil de plusieurs pots enfilés qu'on nomme *aludels*: le soufre qui s'y ramasse est parfaitement pur, & sous la forme d'une poudre très-divisée, qu'on nomme *fleurs de soufre*. Le résidu de la sublimation est encore une masse grise

ou espèce de soufre vif qui contient très-peu de cette matière , & beaucoup de corps étrangers qui en altèrent la pureté.

*Combinaisons du Soufre.*

Un canon de soufre tenu dans la main, craque & souvent se casse : cet effet est d'autant plus sensible que la main est plus chaude & que le soufre se dilate plus promptement. Le soufre mis dans un creuset sur le feu, se fond & s'arrange en longues éguilles par le refroidissement.

Le soufre fondu versé dans l'eau pendant qu'il est encore chaud, se ramasse en larmes d'un jaune rougeâtre, qui conservent pendant assez de temps un certain degré de mollesse, qu'elles perdent insensiblement. L'eau dans laquelle on fait bouillir le soufre, ne l'attaque point du tout ; ainsi on doit regarder comme inutile la préparation du *soufre lavé*.

## 262 Introduction à l'Etude

Le soufre se dissout dans l'huile de vitriol bouillante, mais à mesure qu'elle se refroidit, il se précipite en une pâte verte & molle, qui se durcit par un entier refroidissement.

L'alkali fixe dissout le soufre, soit qu'on les fonde ensemble dans un creuset, soit qu'on fasse bouillir sur ce soufre de l'alkali fixe : le produit de cette opération se nomme *foie de soufre* : il est sec dans le premier cas, & d'une couleur rouge foncée ; il attire l'humidité de l'air, & se dissout facilement dans l'eau : après sa dissolution il est parfaitement semblable au foie de soufre fait par le second procédé, ou par la voie humide.

Le foie de soufre dissout dans la plus petite quantité d'eau bouillante, fournit des cristaux rouges par le refroidissement.

Le foie de soufre dissout le charbon & toutes les matières métalliques, excepté le zinc. Il précipite en une poudre noire les dissolutions de bismuth ;



de mercure & de plomb, & produit différentes encres de sympathie. La vapeur qui s'en élève noircit l'argent ; & la litharge qu'on y mêle se réduit facilement en plomb, sans le secours du feu.

Le foie de soufre étendu d'eau , se décompose seul, & se réduit en tartre vitriolé.

Le foie de soufre sec , mis en poudre sur une assiette de terre & exposé à une chaleur telle qu'il ne puisse se fondre ni même se ramollir , perd toute son odeur, & il ne reste que du tartre vitriolé.

Les acides versés sur le foie de soufre s'unissent à l'alkali ; la liqueur se trouble & blanchit ; on lui donne dans cet état le nom de *lait de soufre* : on lave le précipité aussi-tôt qu'il est déposé : on le nomme *magistère de soufre*. La liqueur qu'on retire de dessus ce magistère , contient un sel neutre , différent suivant la nature de l'alkali qui a opéré la dissolution du soufre & de

l'acide dont on s'est servi pour le précipiter.

La chaux dissout le soufre, comme l'alkali fixe sec, & l'eau de chaux comme l'alkali fixe en liqueur.

L'alkali volatil agit aussi sur le soufre; mais il faut que ces deux substances soient très-divisées & réduites en vapeurs. On distille pour cela un mélange de soufre, de chaux, & de sel ammoniac; le sel ammoniac est décomposé par la chaux, l'alkali volatil qui s'en dégage, rencontre les vapeurs du soufre que le feu volatilise, & s'unissant à elles, tombe dans le récipient en une liqueur jaune, qui est un vrai foie de soufre à base d'alkali volatil: ce foie de soufre exposé à l'air, répand des fumées blanches; on le nomme *liqueur fumante de Boyle*, du nom de son inventeur.

Le foie de soufre volatil peut être décomposé par les acides, & fournir un magistère de soufre: la liqueur qui furnage ce magistère, contient un sel ammoniacal, qui diffère en raison de  
l'acide

l'acide qui entre dans sa composition.

Les huiles grasses bouillantes dissolvent le soufre : la dissolution froide forme une masse rouge très-fétide. La dissolution de soufre dans l'huile de noix, fait le *baume de soufre de Rulland*.

Les huiles essentielles dissolvent le soufre en très-grande quantité, sur-tout lorsqu'elles sont bouillantes ; mais en se refroidissant, elles en laissent précipiter une partie qui crystallise. La dissolution quoiqu'elle soit claire est rouge ; on la nomme *baume de soufre*, ayant soin d'y joindre pour épithète le nom de l'huile qu'on a employée.

L'esprit-de-vin attaque & dissout le soufre, quand on les unit sous la forme de vapeurs ; comme on le fait en distillant ces deux matières sous un chapiteau commun , ainsi que l'a indiqué M. le Comte de Lauraguais.

Le soufre s'unit par la fonte avec presque toutes les matières métalliques ou demi-métalliques , excepté le zinc , l'or & la platine. Il rend les métaux

## 266 *Introduction à l'Etude*

durs, tels que le fer & le cuivre, d'une très facile fusion ; les métaux mols au contraire, tels que le plomb & l'étain, deviennent, en s'unissant à lui, beaucoup plus difficiles à fondre. Toutes ces combinaisons imitent assez parfaitement les mines métalliques formées par la nature.

### *Analyse du Soufre.*

Le soufre brûlé sous une cloche, ne fournit que de la flamme & une vapeur acide. La flamme est formée de principe inflammable & d'eau ; la liqueur acide est différente, suivant la manière dont on a opéré pour l'extraire. Si le soufre a brûlé lentement, l'acide qu'il produit a de l'odeur, on le nomme *acide sulfureux* ; mais cette odeur se perd bientôt pour peu qu'on le laisse à l'air, & il se convertit en acide vitriolique. Si au contraire on brûle le soufre très-rapidement, on en tire sur le champ l'acide vitriolique pur. Le soufre peut être encore décomposé par

le fer. Si les masses sont considérables, elles s'échauffent & le fer se calcine, comme dans l'expérience du volcan artificiel de Lémery. Si l'opération se fait lentement, l'acide du soufre s'unit au fer, & le convertit en vitriol, comme dans l'efflorescence des pyrites martiales.

On peut former artificiellement du soufre, en fondant un mélange de charbon, d'un sel formé par l'acide vitriolique & d'alkali fixe. L'acide vitriolique qui constitue le sel s'unit au phlogistique des charbons, avec lequel il forme un soufre que l'alkali fixe dissout & met dans l'état de foie de soufre : la matière est d'un rouge très-foncé; lorsqu'on la dissout dans l'eau, la liqueur est verdâtre, parcequ'elle tient une portion de charbon dissous à la faveur du foie de soufre. Un acide versé sur cette liqueur, en précipite le soufre qu'on peut, par la sublimation purifier de toute la matière charbon-

neuse qu'il a entraînée avec lui dans la précipitation.

La formation artificielle du soufre, la décomposition spontanée du foie de soufre, & celle qui se fait par un grillage lent de cette matière, prouvent que l'acide qui constitue le soufre est le vitriolique uni au principe inflammable, dans la proportion d'environ quinze parties d'acide contre une de phlogistique, comme l'a démontré l'illustre Staal.

### *Usages du Soufre.*

Le soufre est employé en Médecine comme incisif & stimulant ; on s'en sert sur-tout dans certaines maladies de poitrine, comme dans l'asthme humoral.

On prépare avec le soufre lavé, & mieux encore avec les fleurs de soufre & le sucre, des tablettes dont la dose est d'un demi gros à un gros.

De toutes les dissolutions de soufre, on n'emploie que celles qui se font

dans les huiles essentielles de térébentine, d'anis ou de succin; la dose est par gouttes, de vingt à trente, dans des potions béchiques incisives, ou incorporées avec quelques poudres, comme dans les pillules balsamiques de Morton.

On prépare avec le soufre une pommade & un onguent dont on frotte les galeux; comme ils ont quelquefois l'inconvénient de répercuter l'humour & de la faire rentrer; ils ne doivent être employés qu'avec circonspection, & par des Médecins instruits.

Le soufre sert dans l'artifice; il est un des ingrédients de la poudre à canon, & de la poudre fulminante; les vapeurs qu'il exhale en brûlant blanchissent les étoffes de laine & de soie; elles arrêtent la fermentation des vins.



---

---

**C L A S S E IV.****S E L S. S A L I A.**

**L**ES plus habiles Chymistes ont jusqu'aujourd'hui regardé les limites de la classe des sels comme indéterminées, & probablement comme assez indéterminables. En effet, les caractères essentiels des substances salines, comme la saveur & la dissolubilité dans l'eau, appartiennent à plusieurs corps qu'on n'a point rangés parmi les sels : tels sont le foie de soufre, les savons, les gommes, qui possèdent ces qualités dans un degré très-marqué. Mais pour ne pas s'écarter des notions reçues, on peut diviser la classe des sels en deux sections.





## SECTION I.

Sels simples. *Salia simplicia*:

**L**ES sels simples n'ont reçu ce nom que par comparaison avec d'autres plus composés. Ils ont les propriétés salines, dans un degré assez éminent pour les pouvoir communiquer à des corps qui ne sont pas salins.

### G E N R E I.

Sels acides. *Salia acida*.

Les sels acides sont de toutes les matières salines les plus pures & les plus parfaites. Leur saveur est forte, & va jusqu'à détruire les parties qu'ils touchent. Ils se dissolvent dans l'eau avec une facilité telle qu'il n'a pas encore été possible de les obtenir bien purs ni autrement que sous une forme fluide; dès qu'ils sont exposés à l'air, ils en attirent puissamment l'humidité; lorsqu'ils sont

étendus d'eau, ils n'ont plus qu'une saveur aigre. Ils rougissent les teintures bleues végétales, comme celles de tournesol & de violettes. Ils s'unissent avec effervescence aux terres & aux pierres calcaires, aux sels alkalis, soit fixes, soit volatils ; ils dissolvent les matières métalliques, & agissent fortement sur les huiles & sur l'esprit-de-vin.

## E S P E C E I.

Acide vitriolique. *Acidum vitriolicum.*  
*Acidum catholicum crassius.* WALL.

L'acide vitriolique, qu'on nomme aussi acide universel, est le plus parfait de tous les sels. Lorsqu'il est bien pur il est sous la forme d'un fluide, qui n'a ni couleur ni odeur, & dont la consistance approche assez de celle de l'huile ; c'est pour cela que les Chymistes l'ont nommé *huile de vitriol*. La pesanteur de cet acide est un peu plus que double de celle de l'eau ; sa saveur est si forte qu'il cautérise tout ce qu'il touche ; exposé à l'air, il en attire puissamment

l'humidité, & s'en charge de deux fois son poids. Lorsqu'on en verse dans de l'eau, on entend un sifflement pareil à celui que produiroit un fer rouge qu'on y auroit plongé, & il s'excite dans la liqueur un bouillonnement & une chaleur d'autant plus forte, que le mélange a été fait en quantité plus considérable. Ce sel change en rouge la couleur bleue du syrop de violettes ; mais il n'en détruit pas pour cela le principe colorant, puisqu'on peut, en ajoutant un alkali, rendre au syrop sa première couleur.

*Origine de l'Acide vitriolique.*

On ne rencontre en aucun endroit l'acide vitriolique pur : on avoit prétendu qu'il existoit dans l'atmosphère, & qu'il étoit facile de le démontrer, en exposant à l'air des linges imbibés d'une lessive d'alkali fixe, qui, au bout d'un certain temps, se trouvoient couverts d'une espèce de sel neutre formé

par l'union de l'alkali fixe à l'acide vitriolique de l'air ; mais cette expérience répétée avec le plus grand soin , par de très-habiles Observateurs , ne réussit point lorsqu'on emploie de l'alkali fixe bien pur.

L'acide vitriolique se trouve plus communément combiné à quelques corps , comme au principe inflammable , aux sels alkalis , aux terres , aux métaux , aux huiles.

On peut séparer l'acide vitriolique qui se trouve uni au phlogistique , en faisant brûler très-rapidement le soufre qui résulte de cette combinaison , & rassemblant les vapeurs qui s'élèvent pendant la déflagration , à l'aide de l'eau également réduite en vapeurs. Les sels vitrioliques qui ont pour base un alkali , ne se laissent point enlever leur acide par le feu ; ceux qui ont une terre pour base , ne se laissent non plus décomposer que très-difficilement ; mais l'union de l'acide vitriolique aux matières métalliques n'étant pas aussi

forte, les vitriols peuvent assez aisément fournir leur acide par la distillation : c'est sur-tout du vitriol de fer qu'on le retire avec plus d'avantage & moins de frais ; l'opération exige cependant un feu de réverbère violent & continué pendant plusieurs jours.

L'acide qui se sépare du fer, entraînant avec lui une portion du phlogistique de ce métal, prend une couleur noire, & une odeur d'acide sulfureux ; les dernières portions qui passent dans la distillation, sont les plus concentrées ; elles ont une consistance solide, & on leur a donné le nom d'huile de vitriol glaciale.

L'acide vitriolique devient noir, toutes les fois qu'il touche quelques corps abondans en phlogistique ; mais il est facile de lui enlever cette couleur, en le rectifiant à un degré de chaleur capable de le faire bouillir. On le met pour cela dans une cornue de verre, à laquelle on ajuste un récipient ; la première portion qui distille est légè-

## 276 *Introduction à l'Etude*

rement acide ; mais son acidité augmente de plus en plus : on nomme ce produit *esprit de vitriol*. La liqueur qui reste dans la cornue devient d'autant plus blanche que la distillation avance davantage ; toute la matière colorante se dissipe en un acide sulfureux, & la portion qui étoit dans l'état d'huile de vitriol glaciale, devient fluide.

### *Combinaisons de l'Acide vitriolique :*

L'acide vitriolique bien pur & dans un état de fécité parfaite, combiné exactement avec le principe inflammable, produit le soufre ; mais lorsque cet acide est aqueux, & qu'il ne s'unit que foiblement à une petite quantité de phlogistique, il en résulte l'acide sulfureux.

De l'union de l'acide vitriolique aux alkalis, soit fixes, soit volatils, se forment des sels neutres différens.

Cet acide décompose le borax, & en dégage un sel connu sous le nom de *sél sédatif*.

L'acide vitriolique se combine facilement avec les matières terreuses, & forme avec les terres vitreuses, des glaïses ou de l'alun ; avec les terres calcaires il fait des sélénites, des gyps, des spaths fusibles, des albâtres gypseux, des pierres à plâtre.

Il attaque toutes les matières demi-métalliques ou métalliques, excepté l'or & la platine, & leur communique des propriétés salines. On donne à tous ces sels le nom de *vitriols*.

L'acide vitriolique décompose tous les sels neutres formés par l'union des autres acides à une base quelconque.

Il épaisit les huiles grasses, & forme avec elles une espèce de savon acide. Il a une action bien plus vive sur les huiles essentielles, qu'il convertit en un bitume noir & solide.

Une partie d'acide vitriolique, avec trois parties d'esprit-de-vin digérées lentement, forment ce qu'on nomme l'*eau de Rabel* ; dans ce mélange l'acide contracte une sorte d'union avec l'es-

prît-de-vin, & s'adoucit en partie ; mais lorsque l'huile de vitriol est bien concentrée , & qu'on la mêle avec son poids d'esprit-de-vin bien rectifié, elle produit une grande chaleur, & si on soumet le mélange à la distillation , l'acide achève de décomposer l'esprit-de-vin.

Il coagule les sucres muqueux des végétaux, les humeurs des animaux, & dissout la substance terreuse des os.

### *Analyse de l'Acide vitriolique.*

L'impossibilité de décomposer l'acide vitriolique, sa faveur violente, son extrême dissolubilité dans l'eau, la force avec laquelle il adhère aux corps qui lui servent de base , l'ont fait regarder par Stahl comme un sel principe qui sert de base à tous les autres. Ce sel est, suivant l'opinion de cet illustre Chymiste, un composé de l'union intime des principes aqueux & terreux.

Quoique ce système, le plus brillant & le plus ingénieux qu'ait inventé la



Chymie, ne porte pas sur des faits, & qu'il ne puisse être démontré par des expériences ; il n'en est pas moins vrai de dire qu'il est très-satisfaisant, & qu'il cadre parfaitement bien avec un nombre infini de phénomènes chymiques.

Il est d'abord assez généralement avoué, quoique cela souffre exception dans quelques cas, qu'une substance composée de deux principes différens, participe de la nature des principes qui la constituent, & a des propriétés moyennes entre celles des corps qui la composent. Or, l'acide vitriolique a, lorsqu'il est bien pur, la transparence de l'eau la plus limpide, & du verre le plus net ; sa pesanteur beaucoup plus grande que celle de l'eau, est infiniment moindre que celle de la terre : on en peut dire autant de sa fixité. Il est possible de faire passer cet acide en entier dans la distillation, propriété que n'a pas la terre ; mais cette volatilisation ne peut s'opérer qu'à un degré de chaleur bien supérieur à celui qui pro-

duit l'évaporation de l'eau. Les parties de l'huile de vitriol bien concentrée, adhèrent entr'elles beaucoup plus fortement que celles de l'eau, & beaucoup moins que celles qui constituent les pierres dures. Enfin, l'extrême facilité avec laquelle cet acide s'unit à l'eau & aux terres, indique que ces matières entrent dans sa composition.

Les seules propriétés qu'on trouve dans l'acide vitriolique, & qui semblent le distinguer des principes aqueux & terreux, sont sa saveur singulièrement caustique, & l'action dissolvante qu'il a sur certaines matières, qui ne sont attaquées, ni par l'eau, ni par les substances terreuses ; mais cette causticité dépend entièrement de l'état dans lequel l'élément terreux se trouve dans l'acide vitriolique. La terre que les anciens Chymistes appelloient *principe passif*, est, comme le remarque le savant Auteur du *Dictionnaire de Chymie*, le plus actif de tous. Selon cet illustre Ecrivain, les particules terreuses ont entr'elles

entr'elles une force d'attraction très-grande, en raison de leur pesanteur, & conséquemment une très-grande tendance à se combiner; tendance qui ne cesse que lorsque ces particules viennent à s'unir : alors elle se change en force de cohérence. Cela posé, les molécules de terre qui entrent dans la composition de l'acide vitriolique, n'étant pas unies entr'elles, mais attachées aux molécules d'eau qui s'y trouvent interposées, il est clair qu'elles conservent toute leur force d'attraction : si dans cet état elles viennent à toucher les papilles nerveuses, elles les pénètrent avec toute la force qu'elles ont à se combiner, & il en résulte la faveur, qui n'est qu'un ébranlement causé aux nerfs de l'organe du goût ; mais si cet acide vient à toucher un métal, ou tout autre corps, il se combine avec lui fortement ; & si la quantité d'eau est suffisante pour tenir en suspension la terre du métal avec celle qui constituoit l'acide, il en résulte une dissolution du

métal dans l'acide ; lorsqu'au contraire la quantité d'eau est trop petite, une partie de l'acide se précipite avec le métal, & on obtient une masse saline concrète.

A toutes ces vraisemblances, on peut ajouter les expériences qu'on a tentées pour la conversion des substances salines ; & quoiqu'on n'ait point encore de moyens de les changer toutes les unes dans les autres, on vient cependant facilement à bout de convertir l'acide vitriolique en acide sulfureux, & l'acide sulfureux en acide vitriolique.

M. Piech, dans un *Mémoire sur l'origine de l'acide nitreux*, couronné par l'Académie de Berlin, rapporte qu'ayant combiné l'acide vitriolique avec des matières végétales & animales susceptibles de putréfaction, il s'étoit changé en acide nitreux.

Plusieurs phénomènes que présente l'acide marin uni à l'étain dans la liqueur fumante de Libavius, lorsqu'on en forme l'éther marin, rapprochent cet acide de l'acide vitriolique.

L'odeur d'acide marin , qui se fait sentir lorsqu'on fait bouillir du tartre vitriolé ou du sel de glauber dans l'eau-forte , prouve assez que tous ces sels ne diffèrent les uns des autres que par la surabondance ou le défaut de quelques principes.

D'ailleurs , quoique l'art ne puisse composer l'acide vitriolique , en unissant immédiatement l'eau & la terre , il est déjà parvenu à former un sel par l'union de ces deux principes, comme on le voit dans la formation de la crème saline de la chaux ; & il réduit également un sel acide en ses élémens , dans la détonnation du nitre.

*Usages de l'Acide vitriolique.*

On prescrit en Médecine l'acide vitriolique étendu dans une boisson quelconque , jusqu'à une agréable acidité ; il tempère le mouvement des humeurs , & convient dans les fièvres ardentes.

Les chapeliers s'en servent pour ra-

mollir les poils de lièvre, de castor, & lier leurs feutres.

Les teinturiers l'emploient dans les teintures bleues & noires.

### E S P E C E II.

Acide nitreux. *Acidum nitrosum*.

L'acide nitreux tient le second rang parmi les sels ; il est toujours fluide ; sa couleur est d'un brun-rouge ; il répand continuellement des vapeurs de même couleur , qui exhalent une odeur forte & nauséabonde : la saveur de cet acide est très - caustique. Il jaunit la peau lorsqu'il la touche, & les taches qu'il y produit ne s'en vont qu'avec l'épiderme ; sa pesanteur excède d'un tiers celle de l'eau ; exposé à l'air , il en attire l'humidité, moins cependant que l'acide vitriolique ; il s'échauffe aussi moins lorsqu'on le mêle avec l'eau, & prend une couleur verte, qu'il garde tant qu'on le conserve dans un flacon bien fermé ; mais il la perd bientôt , si on le laisse dans un vaisseau ouvert,

& cesse de répandre des vapeurs : dans cet état on le nomme *eau-forte*. L'acide nitreux versé sur le syrop de violettes, le rougit, & détruit tellement le principe colorant de ce syrop, qu'il n'est plus possible de le rétablir dans sa première couleur.

*Origine de l'Acide nitreux.*

On ne rencontre jamais l'acide nitreux pur & jouissant de ses droits, mais toujours engagé dans une base alcaline ou terreuse, dont on peut le séparer, soit par la calcination dans un creuset, soit en distillant les sels nitreux seuls, ou avec un intermède propre à faciliter leur décomposition, comme le sable, l'argille, l'acide vitriolique pur, ou engagé dans quelque base métallique, le sel sédatif & l'arsenic.

*Combinaison de l'Acide nitreux.*

L'acide nitreux, uni au principe inflammable dans l'état de siccité, forme

un soufre nitreux , qui s'embrase au moment même de sa fermentation ; enforte qu'il est impossible de recueillir ce soufre , comme on obtient celui qui résulte de la combinaison de l'acide vitriolique , avec ce même principe inflammable.

L'acide nitreux , joint aux alkalis fixes ou volatils , forme des sels neutres différens.

Versé dans la dissolution du borax , il le décompose & en sépare un sel connu sous le nom de *sel sédatif*.

Il décompose tous les sels neutres formés par l'union de l'acide marin à une base quelconque : il dégage l'acide vitriolique du tartre vitriolé , & du sel de glauber.

Il dissout les substances terreuses , & forme avec elles des sels neutres , qui ne crystallisent que difficilement , & qui attirent l'humidité de l'air. Il dissout aussi toutes les matières métalliques , excepté l'or & la platine ; il coagule les sucs exprimés des végétaux.



Lorsqu'on l'applique aux huiles, il a sur elles beaucoup plus d'action que n'en a l'acide vitriolique ; car il enflamme, plus ou moins promptement, toutes les huiles essentielles, celles qu'on retire des végétaux distillés à feu nud, & que les Chymistes nomment *huiles empyreumatiques*, & même toutes les huiles grasses siccatives, comme celles de lin, de chenevi, de noix. A l'égard de celles qui sont plus abondantes en mucilage, comme celles d'olives, ou d'amandes, elles n'ont pu jusqu'ici être enflammées par l'acide nitreux pur, à moins qu'on ne leur ait appliqué d'abord un mélange de cet acide & d'huile de vitriol concentrée, comme le remarque M. Rouelle, qui a porté les recherches sur cette matière, beaucoup plus loin qu'on ne l'avoit encore fait, & qui les a publiées dans un Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie des Sciences en 1747. L'acide nitreux, mêlé à l'esprit-de-vin, dans la proportion d'une partie d'acide foible, contre deux par-

## 288 *Introduction à l'Etude*

ties d'esprit-de-vin, se combine avec lui, perd son acidité, & forme ce qu'on nomme *esprit de nitre dulcifié*. Lorsqu'on emploie, pour faire ce mélange, un acide nitreux plus concentré, l'esprit-de-vin se trouve décomposé, même sans le secours du feu.

L'acide nitreux coagule les humeurs animales, & détruit leur principe colorant : il dissout la substance terreuse des os.

### *Analyse de l'Acide nitreux.*

L'acide nitreux, suivant l'opinion des Chymistes, est produit par l'acide vitriolique surchargé d'une assez grande quantité de phlogistique : on le voit par l'odeur & la couleur qui sont particulières à cet acide, & qui ne doivent leur existence qu'au principe inflammable. D'ailleurs, comme l'acide nitreux est plus composé que celui qui sert à le former, il possède les propriétés salines dans un degré moins marqué; il adhère moins fortement aux corps  
auxquels

auxquels il est uni, & résiste moins à sa décomposition, qui a lieu toutes les fois que cet acide dans un état de siccité parfaite, s'unit au phlogistique en ignition. Dans cette décomposition, le principe inflammable de l'acide venant à se brûler, l'eau s'élève en vapeurs pendant la déflagration, & la terre reste unie aux matières qui ont servi à décomposer l'acide. Les expériences de M. Piech, qui dit avoir produit l'acide nitreux, en combinant l'acide vitriolique avec des matières végétales & animales susceptibles de putréfaction, servent encore à nous faire connoître la nature de cet acide. On fait d'ailleurs que les plantes contiennent beaucoup de nitre, & que l'acide nitreux ne se forme jamais en plus grande quantité que dans les étables, les latrines & autres lieux, où se pourrissent journellement des matières végétales & animales.

Si on examine avec soin les propriétés de l'acide nitreux, on reconnoît sans

peine la présence du principe inflammable dans cet acide. 1.<sup>o</sup> Il détruit les couleurs, comme l'acide sulfureux qui est également formé par l'acide vitriolique uni au phlogistique. 2.<sup>o</sup> Il a une action très-vive sur toutes les matières qui contiennent abondamment du phlogistique; les substances métalliques, par exemple, sont dissoutes beaucoup plus facilement par cet acide que par les autres, quoique cependant il n'ait pas avec elles la plus grande affinité possible. Toutes ces dissolutions sont accompagnées de chaleur & de vapeurs rousses très-épaisses, quoiqu'on y ait employé un acide fort étendu d'eau. Il y a même plusieurs substances demi-métalliques & métalliques que l'acide nitreux réduit en chaux, en leur enlevant leur phlogistique dans le temps même de la dissolution.

Lorsqu'on applique de l'acide nitreux bien concentré à des corps très-abondans en principe inflammable, il se charge de ce principe par surabondan-

ce, & forme avec lui un soufre nitreux qui s'embrase, sans autre secours que la chaleur produite par le mélange de l'acide avec ces matières : on en a un exemple frappant dans l'inflammation des huiles. Si on verse sur une quantité donnée d'huile essentielle ou empyreumatique, ou même de quelque huile grasse siccativ, un poids égal d'acide nitreux bien fumant, il s'excite une grande chaleur ; on voit s'élever des tourbillons de vapeurs, d'abord rousses, ensuite blanches ; la matière se sèche, s'allume, & produit une flamme vive : mais lorsque les huiles sont surchargées d'une matière mucilagineuse, qui empêche l'action de l'acide sur le principe huileux, alors l'inflammation devient beaucoup plus difficile ; il faut pour qu'elle réussisse, verser d'abord sur l'huile un mélange d'acide nitreux & d'acide vitriolique concentré : ce dernier à raison de sa grande affinité avec l'eau, s'empare du phlegme de l'huile, pendant que l'acide ni-

treux la réduit en charbon , enforte qu'en versant dans l'endroit le plus échauffé , quelques gouttes d'acide nitreux pur , la flamme paroît dans l'instant.

L'acide nitreux s'allume encore beaucoup plus vite , lorsqu'on le présente dans un état de siccité parfaite au phlogistique actuellement en ignition ; comme on peut le voir dans la détonnation du nitre produite par différens corps.

La vivacité prodigieuse avec laquelle l'acide nitreux décompose l'esprit-de-vin , même sans le secours du feu , prouve bien complètement l'action de cet acide sur les matières inflammables , & sert à démontrer que le phlogistique est bien réellement un des principes qui le constituent.

### *Usages de l'Acide nitreux ;*

L'acide nitreux peut être employé en Médecine comme les autres acides ; on lui attribue même une propriété apéritive & diurétique particulière ;

mais son odeur nauséabonde empêche de l'employer. On se sert plus souvent de cet acide dulcifié par l'esprit-de-vin , à la dose de quelques gouttes dans une boisson convenable.

L'esprit-de-nitre sert aux Peintres & aux Graveurs. Les Orfèvres l'emploient pour faire le départ de l'or d'avec l'argent.

### E S P E C E III.

Acide marin. *Acidum marinum.*

L'acide marin est toujours sous la forme d'un fluide jaune qui répand des vapeurs acides, blanches, très-pénétrantes & très-difficiles à condenser. Cet acide a une saveur forte , mais moins désagréable que celle de l'acide nitreux ; on en peut dire autant de son odeur. Il n'attire pas l'humidité aussi puissamment que les deux autres acides minéraux : il ne s'échauffe pas bien sensiblement avec l'eau. La difficulté qu'on a d'obtenir l'acide marin dans un grand degré de concentration , ôte le moyen

d'évaluer le rapport de sa pesanteur à celle de l'eau.

L'acide marin rougit le sirop de violettes ; il en altère même un peu la couleur, mais il ne la détruit pas entièrement, comme fait l'acide nitreux.

### *Origine de l'Acide marin.*

On ne trouve nulle part l'acide marin dans son état de pureté, mais on le rencontre fréquemment uni à quelque base alcaline, calcaire, ou métallique.

On peut enlever l'acide marin uni à la craie par une simple distillation ; mais quand il est uni à des bases alcalines, il faut employer dans la distillation, un intermède qui ait plus d'affinité avec la base alcaline que n'en a l'acide marin : les terres argilleuses, l'acide vitriolique, les sels vitrioliques terreux, ou métalliques, les sels sédarifs peuvent servir à cet usage. On peut encore employer l'acide nitreux ; mais comme ce dernier est volatil, il en



passé une portion dans la distillation , & on obtient au lieu d'un acide marin pur , un acide mixte , nommé *eau régale*.

L'acide marin ne peut être dégagé des matières métalliques auxquelles il est uni par le seul secours de la distillation , parcequ'il en entraîne toujours une portion avec lui , à l'aide d'une sorte de volatilité qu'il leur communique ; ainsi il faut toujours employer quelque intermède pour opérer ce dégagement.

### *Combinaisons de l'Acide marin.*

On n'a pu jusqu'à présent unir l'acide marin au phlogistique , pour en former un soufre marin ; la matière connue sous le nom de *phosphore de Kunkel* , contient bien un acide qui a quelque rapport avec celui-ci , mais il en diffère à beaucoup d'égards ; & M. Margraff a fait d'inutiles tentatives pour produire cette substance avec l'acide marin pur.

L'acide marin produit avec les alkalis des sels neutres parfaits, qui peuvent être décomposés par les acides vitrioliques & nitreux. Cet acide décompose le borax & en dégage un sel sédatif.

Il forme avec les différentes espèces de terres, des sels neutres très-déliquescents.

Il dissout immédiatement plusieurs substances demi-métalliques & métalliques, comme l'arsenic, le cobalt, le bismuth, le régule d'antimoine, le zinc, le plomb, l'étain, le fer & le cuivre : ces dissolutions ne sont pas accompagnées de chaleur & de vapeurs aussi sensibles que celles qui sont faites par l'acide nitreux.

L'argent ne peut être attaqué par cet acide, à moins qu'il ne soit dans l'état de la plus grande concentration, & parfaitement sec.

L'acide marin ne dissout pas le mercure en substance, mais il s'unit parfaitement à ce demi-métal, lorsqu'il a

été auparavant entamé par quelque acide, dont il le dégage avec beaucoup de facilité.

A l'égard de l'or & de la platine, ils ne sont point attaqués par l'acide marin, à moins qu'il ne soit mêlé d'une certaine quantité d'acide nitreux, & dans l'état d'eau régale.

Indépendamment de l'action immédiate que l'acide marin a sur la plupart des métaux & des demi-métaux qu'il dissout, & avec lesquels il forme des sels neutres, il y a une infinité de combinaisons différentes des matières métalliques avec cet acide, d'où résultent des corps salins très-différens, qui tous ont une sorte de volatilité; tels sont, l'huile ou beurre d'arsenic, le beurre d'antimoine & de zinc, le plomb & la lune cornée, la liqueur fumante de Libavius, &c.

L'acide marin coagule les sucç des plantes; il ne se combine jamais parfaitement avec l'esprit-de-vin, soit qu'on fasse digérer ces matières ensem-

ble, soit qu'on les traite par la distillation, comme le veulent quelques Chymistes ; aussi est-il difficile d'avoir un esprit de sel parfaitement dulcifié. L'acide marin n'a point d'action sur les huiles ; il coagule les humeurs animales, & dissout la substance terreuse des os.

*Analyse de l'Acide marin.*

On a regardé l'acide marin comme le troisième des acides, parcequ'il attire moins l'humidité que les deux autres, & qu'il s'échauffe moins avec l'eau ; ce qui dénote une moindre dissolubilité : enfin, parcequ'il adhère moins fortement que l'acide nitreux à plusieurs des bases auxquelles il peut s'unir. Cependant, comme il a plus d'affinité avec certains corps que n'en ont les autres acides, qui d'ailleurs les dissolvent mieux, on est embarrassé de prononcer décidément sur la nature de l'acide marin. On soupçonne néanmoins qu'il est formé par l'acide vitriolique, uni à une portion de phlogistique moins abon-

dante qu'elle ne l'est dans l'acide nitreux.

L'acide marin a de la couleur & de l'odeur ; il altère les couleurs comme l'acide nitreux , mais d'une manière beaucoup moins marquée ; d'ailleurs il n'a pas une action aussi forte sur les huiles & sur l'esprit-de-vin.

Becher admet dans l'acide marin sa terre mercurielle, & tâche d'expliquer par ce moyen les phénomènes que présente cet acide avec les différentes substances métalliques, dans lesquelles il reconnoît également ce principe, dont l'existence n'est point encore assez prouvée.

### *Usages de l'Acide marin.*

L'acide marin peut être employé en Médecine ; il tempère le mouvement des humeurs, de même que les autres acides. On l'a regardé pendant longtemps comme un lithontriptique fameux. Le Prieur de Chabrières en faisoit un remède secret , qui a perdu

beaucoup de ses propriétés en devenant public. On continue cependant de prescrire comme diurétique cet acide étendu dans une boisson convenable. On ordonne aussi le mélange qu'on en fait avec l'esprit-de-vin, & qu'on nomme *esprit de sel dulcifié*. Quelques Médecins croient trouver un excellent remède contre la goutte dans un gros d'esprit de sel étendu dans une pinte de vin, & pris en plusieurs jours; c'est à la pratique à accréditer ce secours peu connu, ou à le rejeter, s'il ne produit pas de bons effets.

On n'emploie guère dans les arts l'acide marin pur; mais l'acide mixte, connu sous le nom d'*eau régale*, est d'usage pour dissoudre l'or, & le séparer de tout alliage.

#### E S P E C E IV.

Acide sulfureux. *Acidum catholicum, tenuius. WALL.*

L'acide sulfureux tient le dernier rang parmi les acides minéraux; ce

n'est pas même, à proprement parler, un acide particulier, mais plutôt une manière d'être de l'acide vitriolique.

L'acide sulfureux est toujours fluide ; il n'a point de couleur lorsqu'il est bien pur ; il a une saveur aigre & désagréable ; son odeur est très-pénétrante ; il s'échauffe avec l'eau lorsqu'il est bien concentré ; il rougit le syrop de violettes & détruit sa couleur, comme il fait à l'égard de presque tous les corps colorés : exposé à l'air, il perd ses propriétés, & devient acide vitriolique.

*Origine de l'Acide sulfureux.*

On ne trouve en aucun endroit l'acide sulfureux, si ce n'est dans les lieux pleins des exhalaisons du soufre, comme dans le voisinage des volcans & des mines sulfureuses qu'on grille. L'art retire cet acide en brûlant le soufre lentement, & condensant sous une cloche les vapeurs qui s'en élèvent, à l'aide de l'eau également réduite en vapeurs. On produit encore cet acide en

plongeant dans l'huile de vitriol un charbon embrasé, ou quelque chose qui en tienne lieu, ou encore en la faisant chauffer avec quelque matière qui puisse lui communiquer un peu de phlogistique.

*Combinaisons de l'Acide sulfureux.*

L'acide sulfureux peut s'unir avec les sels alkalis fixes ou volatils, comme tous les acides minéraux ; mais il adhère à ces bases avec moins de force que les autres, aussi peuvent-ils tous décomposer les sels neutres qu'il a formés : ces sels d'ailleurs se décomposent d'eux-mêmes au bout de quelque temps, & ils prennent les caractères de sels neutres vitrioliques, & ne peuvent plus être décomposés que comme tels.

Les combinaisons de l'acide sulfureux avec les substances terreuses & métalliques ne sont pas encore connues.

*Analyse de l'Acide sulfureux.*

L'acide sulfureux n'est que l'acide



vitriolique uni à une petite portion de phlogistique, qui, en lui donnant des propriétés qu'il n'avoit pas, le rapproche de l'acide nitreux : telles sont l'odeur, la volatilité & la possibilité de détruire les couleurs.

On reconnoît cette origine de l'acide sulfureux : 1.<sup>o</sup> par sa production, qui a lieu toutes les fois qu'on unit à l'acide vitriolique un peu du principe inflammable : 2.<sup>o</sup> par la conversion de l'acide sulfureux en acide vitriolique, & des sels neutres sulfureux en sels neutres vitrioliques, lorsqu'ils sont exposés à l'air : 3.<sup>o</sup> enfin, par la facilité avec laquelle les Chymistes produisent à volonté l'acide sulfureux, ou l'acide vitriolique, en brûlant le soufre. Dans le premier cas, il faut que la combustion soit très-lente ; dans le second au contraire, elle doit se faire très-rapidement.

*Usages de l'Acide sulfureux.*

L'acide sulfureux, à cause de la pro-

priété qu'il a de détruire les couleurs, est employé dans les arts pour blanchir les soies.

On en imprègne le moût du raisin, & même les tonneaux dans lesquels on le renferme ; il arrête la fermentation.

### *G E N R E II.*

Sels alkalis. *Salia alkalina.*

Les sels alkalis ont les propriétés salines dans un degré assez éminent pour pouvoir les communiquer à des corps non salins : ils ne tiennent cependant que le second rang parmi les sels simples : leur saveur, quoique forte & cautérifante, est moindre que celle des acides : ils ont aussi moins de dissolubilité qu'eux, puisqu'il est possible de les obtenir très-purs, sous forme concrète & crySTALLINE, tandis que les acides sont toujours en liqueur : enfin, ils adhèrent moins fortement aux substances auxquelles ils sont unis, puisque la plupart des combinaisons qu'ils forment

ment avec des corps non salins, se décomposent d'elles-mêmes.

E S P E C E I.

Alkali déliquescent. *Alkali fixum, aeris humiditatem attrahens.*

L'alkali fixe déliquescent a une saveur caustique & urineuse ; il n'a point d'odeur lorsqu'il est sec ; mais il en prend une de lessive, lorsqu'on le dissout dans l'eau : la dissolution d'alkali déliquescent est accompagnée d'un peu de chaleur, produite par l'activité avec laquelle il s'unit à l'eau. En effet, ce sel est si dissoluble, qu'étant exposé à l'air, il se charge de trois fois son poids d'humidité, suivant le rapport de M. Gellert.

L'eau, qui tient autant d'alkali qu'elle en peut dissoudre, passe difficilement à travers les filtres : elle paroît grasse lorsqu'on la touche, parcequ'elle dissout une portion de la matière huileuse de la peau, ce qui la rend comme sa-

vonneuse, & lui a fait donner le nom d'*huile de tartre* : on appelle huile de tartre par défaillance , *oleum tartari per deliquium* , la dissolution d'alkali déliquescent faite par l'humidité de l'air.

Si l'on fait évaporer rapidement la dissolution d'alkali déliquescent , on obtient ce sel en une masse informe ; mais si l'évaporation se continue lentement , jusqu'à ce qu'il se forme une très-légère pellicule à la surface de la liqueur , & qu'on la laisse refroidir insensiblement , on obtient de très-beaux cristaux ; enfin , lorsqu'on laisse la pellicule devenir plus épaisse , on ne retire que des cristaux très-petits, mêlés d'une grande quantité de sel alkali qui s'est précipité confusément.

: L'alkali exposé dans un creuset entre des charbons ardents , se fond assez aisément , & acquiert de la causticité ; il ne se volatilise qu'à la dernière violence du feu : c'est pour cela qu'on le nomme *alkali fixe*. Ce sel fait efferves-

cence avec tous les acides, & verdit le  
fyrop de violettes.

*Origine de l'Alkali déliquescent.*

On ne trouve pas l'alkali déliquescent pur dans le Règne Minéral, il est toujours uni à quelqu'acide, & dans l'état de sel neutre : il est beaucoup plus abondant dans les plantes ; c'est pour cela qu'on l'appelle ordinairement *alkali végétal* : on le nomme aussi *alkali du tartre*, parcequ'on le retire de cette substance en grande quantité. On obtient l'alkali fixe déliquescent en décomposant les sels neutres, dans la combinaison desquels il est entré ; ou en brûlant les plantes & le tartre du vin, lessivant leurs cendres, & faisant évaporer cette lessive.

*Combinaisons de l'Alkali déliquescent.*

L'alkali fixe ajouté au sable, augmente considérablement la fusibilité de

cette substance, & produit avec elle une masse vitreuse, d'autant plus attaquable par les différens menstres, qu'il est entré plus de sel dans sa composition.

Lorsque la proportion d'alkali excède beaucoup celle du sable, comme de sept à huit parties contre une, alors la matière fond avec beaucoup de facilité, & la terre se trouve mêlée au sel avec tant d'exactitude, que tout le produit peut se dissoudre dans l'eau : c'est cette dissolution qu'on nomme *liqueur des cailloux*.

L'alkali fixe calciné avec des terres calcaires, acquiert beaucoup de causticité, & perd la propriété qu'il avoit de faire effervescence avec les acides.

Ce sel augmente la fusibilité des argilles, & lorsqu'on le mêle avec l'eau qui tient une quantité de cette terre en dissolution, il y produit un précipité, parcequ'en s'unissant à l'acide vitriolique, il en sépare la base qui lui étoit unie.

L'alkali fixe appliqué au soufre le dissout, soit qu'on fasse fondre ces deux matières ensemble dans un creuset sur le feu, soit qu'on fasse bouillir sur du soufre une liqueur bien chargée de ce sel.

L'union que cet alkali contracte avec tous les acides, est accompagné d'effervescence, & il en résulte les sels composés les plus parfaits.

L'alkali fixe décompose tous les sels neutres qui ont pour base un alkali volatil, une matière terreuse ou métallique.

Il attaque presque tous les métaux & demi-métaux, sur-tout lorsqu'ils ont été préalablement engouffrés par quelque autre menstree, & mis dans un grand état de division.

Il rend les bitumes qu'on triture avec lui plus faciles à dissoudre dans l'esprit-de-vin.

Il s'unit aux sucs acides des plantes, & aux produits acides des végétaux fermentés.

Il se mêle aux huiles avec beaucoup de facilité, & produit des savons par cette combinaison.

Il a de l'action sur l'esprit-de-vin, & le décompose ; il coagule le lait des animaux.

*Analyse de l'Alkali déliquescent.*

L'alkali déliquescent paroît formé de l'union des principes aqueux & terreux, de même que l'acide vitriolique, mais dans une proportion différente. La terre paroît ici beaucoup plus abondante ; car si on filtre une lessive d'alkali fixe pour l'avoir parfaitement claire, qu'on la renferme en cet état dans un flacon bien bouché, la liqueur se trouble bientôt, & laisse précipiter une grande quantité de flocons terreux ; qu'on la filtre de nouveau & qu'on la renferme avec le même soin, au bout d'un certain temps, il se forme un nouveau précipité, & on ne sait pas encore où peut s'arrêter cette précipitation de la terre que dépose l'alkali.



Quelques Chymistes veulent que l'alkali fixe soit formé d'acide & de terre, ce qui revient au même, puisque, comme on le suppose ici, c'est la surabondance du principe terreux qui distingue un acide d'un alkali; ils ajoutent aussi le phlogistique; mais l'existence de ce principe dans l'alkali fixe, n'est pas encore bien prouvée: il paroît même que s'il s'y trouve, ce n'est qu'en petite quantité.

*Usages de l'Alkali déliquescent.*

L'alkali fixe peut être employé en Médecine comme un très-grand fondant; mais sa dose ne doit être que de quelques grains, parcequ'il a beaucoup de causticité. On le prescrit plus ordinairement sous la forme de savon.

E S P E C E II.

Alkali fixe marin. *Alkali fixum Marinum.*

L'alkali marin a une saveur caustique & urineuse comme l'alkali déli-

quescent ; il n'a point d'odeur tant qu'il est sec, mais il en acquiert une de lessive, lorsqu'on le fait dissoudre dans l'eau ; sa dissolution est accompagnée d'un peu de chaleur ; elle passe difficilement à travers les filtres , & paroît grasse lorsqu'on la touche, comme celle de l'alkali déliquescent.

La lessive d'alkali marin évaporée lentement fournit des très-beaux cristaux , qui loin d'attirer l'humidité de l'air , se sèchent & tombent en poussière ; ce qui dénote dans ce sel moins de dissolubilité que n'en a l'alkali déliquescent ; aussi c'est pour cette raison qu'on lui donne le second rang parmi les sels de ce genre.

L'alkali marin se liquéfie très-facilement lorsqu'on le fait chauffer ; il acquiert de la causticité par la calcination , & ne se volatilise qu'à l'extrême violence du feu : il fait effervescence avec les acides , & verdit le sirop de violettes.

*Origine*

Origine de l'Alkali marin.

L'alkali marin , autrement nommé *alkali minéral* , *alkali de la soude* ou *natron* , se trouve naturellement cristallisé en Egypte. Les Minéralogistes en ont distingué un grand nombre d'espèces, qui ne diffèrent que par les lieux où elles se rencontrent. Ils ont appelé *natron* , ou *sel alkali terreux* , *alkali Orientale impurum* , WALL. celui qui se trouve dans la terre ; *natrum nudum* , *terrestre* , LINN. *sel alkali de fontaine* , *alkali in acidulis vel thermis hospitans* , WALL. *Natrum nudum* , *fontanum* , *saturatum* , LINN. celui qui est dissous dans l'eau , soit seul , soit uni à quelque acide. *Aphronatron* , ou *sel mural* , *alkali compactum crystallisable* , *corporibus superficialiter adhærens* , WALL. *Natrum nudum* , *calcarium* , LINN. celui qui se trouve cristallisé sur les murailles ; & *halinatron* , *alkali non crystallisable superficialiter corporibus striatim adhærens* , celui qui se ren-

contre dans les mêmes lieux, mais qui n'est pas sous une forme crySTALLINE. Il faut observer que c'est à tort que les Minéralogistes ont rangé avec l'alkali le sel d'epsom, de Sedlitz & même le sel de Glauber, qui sont des sels neutres,

Toutes ces espèces de sels ne sont pas assez bien caractérisées dans les Auteurs pour qu'on puisse les reconnoître pour de vrais alkalis; & quand elles en feroient, ces différentes manières d'être ne changent rien à leur nature.

On trouve encore l'alkali marin servant de base à différens sels neutres qu'on retire de la mer. On peut l'obtenir pur en le dégageant des acides avec lesquels il est uni. On peut encore le retirer de la soude & de presque toutes les plantes maritimes qui en contiennent une grande quantité, soit par la voie de l'incinération, soit en faisant macérer ces plantes dans des acides.

*Combinaisons de l'Alkali marin.*

L'alkali marin s'unit au sable de même que l'alkali déliquescent. Lorsqu'on le fait fondre avec des substances calcaires, il devient très-caustique, acquiert une très-grande dissolubilité dans l'eau; & perd en même-temps la propriété qu'il avoit de faire effervescence avec les acides. Cette matière est employée par les Chirurgiens sous le nom de *pierre à cautère*. Sa dissolution dans l'eau fait la *liqueur des Savonniers*.

L'alkali marin opère sur les argilles & sur le soufre, de la même manière que l'alkali déliquescent.

Il se combine également avec les acides, & forme avec eux des sels composés parfaits.

Il détruit l'union que les acides ont contracté avec les alkalis volatils, les matières terreuses & les substances métalliques.

Il dissout les métaux & les demi-métaux.

### 316 *Introduction à l'Etude*

Il facilite la dissolution des bitumes dans l'esprit-de vin,

Il s'unit aux sucres acides des plantes, & aux produits acides des végétaux fermentés.

Il se combine aux huiles avec lesquelles il forme facilement des savons, sur-tout lorsqu'il a été rendu caustique par la chaux,

Il décompose l'esprit-de-vin, & coagule le lait des animaux,

#### *Analyse de l'Alkali marin.*

L'alkali marin est composé des mêmes principes que l'alkali déliquescent, mais dans une proportion un peu différente. Il paroît que le premier contient plus de terre que l'autre, & que cette terre est moins atténuée. Les cristaux d'alkali marin, qu'on fait dissoudre dans l'eau, déposent une grande quantité de flocons terreux qu'on peut en séparer par la filtration. En répétant plusieurs fois les cristallisations & dissolutions de ce sel, on le

dépouille peu - à - peu d'une grande quantité de cette terre, & il finit par ne plus fournir que de très-petits cristaux, & fort difficilement. On peut hâter encore la décomposition de l'alkali marin en calcinant chaque fois les cristaux avant de les dissoudre.

On lit dans le *Dictionnaire Encyclopédique*, que le natron contient encore plus de terre que le véritable alkali marin.

*Usages de l'Alkali marin.*

On peut employer en Médecine l'alkali marin de même que l'alkali déliquescent, mais il faut toujours que ce soit à des doses très-modérées. Les savons qu'on en fait en l'unissant aux huiles grasses, sont usités comme de très-bons fondans dans les obstructions; on les prescrit par grains: il en est de même des composés savonneux qu'il forme avec les huiles essentielles; mais comme ils ont une action encore plus

### 318 *Introduction à l'Etude*

forte, il faut les donner en moindre dose.

Le sel alkali marin est employé dans la fabrique du verre & du savon. Il est aussi d'usage dans la teinture. Ce sel formoit un des principaux ingrédiens dont se servoient les Egyptiens pour embaumer les morts, comme on peut le voir dans le savant Mémoire que M. Rouelle a donné sur les embaumemens à l'Académie des Sciences, en 1750.

### E S P E C E III.

*Borax. Borax crudus, cœrulefcens, hexangularis. WALL. Borax, nudus. LINN.*

Le borax est un sel dont la couleur varie; il est très-blanc lorsqu'il est pur; on le trouve aussi d'une couleur grise, & tirant sur le verd: c'est ce dernier qu'on nomme plus particulièrement *borax brut* ou *tinkal*. Sa saveur est légèrement alkaline. Ce sel se dissout difficilement dans l'eau froide: l'eau bouillante en dissout à-peu-près un seizieme



de son poids , & laisse déposer en refroidissant , des cristaux dont la figure varie beaucoup : ce sont assez ordinairement des cubes dont les angles ont été tronqués. La dissolution de borax verdit le sirop de violettes comme les alkalis : ce sel ne fait cependant pas effervescence avec les acides.

*Origine du Borax.*

On ne fait pas encore au juste la véritable origine du borax. On lit dans une note de la *Minéralogie* de M. Valmont de Bomare l'extrait d'une lettre écrite d'Ispahan à ce Naturaliste , sur l'origine de ce sel : il se retire d'une pierre grasse & tendre qu'on trouve en Perse , dans les royaumes de Golconde & de Visapour , & dans l'empire du Grand Mogol. On en obtient encore , en faisant évaporer une eau épaisse & verdâtre qu'on trouve ramassée dans des fosses voisines d'une mine de cuivre de Perse. Le premier sel qu'on retire de cette eau est excessivement gras &

fale ; on le fait dissoudre une seconde fois ; on retire un sel moins gras , mais toujours fort impur : c'est celui qu'on nomme *borax brut* dans le commerce. Les Hollandois le purifient ; mais on ignore quel est leur procédé ; on soupçonne qu'ils le font dissoudre dans l'eau de chaux. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il est plus blanc que celui qui se purifie en France.

### *Combinaisons du Borax.*

Le borax exposé au feu , commence par se gonfler considérablement , & finit par se fondre en une espèce de verre qui se sèche & se réduit en poudre à l'air , comme l'alkali marin. Ce verre se dissout dans l'eau comme le borax lui-même , & fournit des crystaux par le refroidissement.

Si dans une dissolution chaude de borax on verse un acide quelconque , il se sépare de la liqueur , à mesure qu'elle se refroidit , un sel qui crystallise en petites lames brillantes , & qu'on nom-

*me sel sédatif.* L'eau-mère qui reste après sa crySTALLISATION fournit un sel neutre semblable à celui qui résulteroit du mélange de l'alkali marin avec l'acide qu'on a employé pour retirer le sel sédatif. M. Homberg , qui le premier a découvert ce sel, en combinant le borax avec le vitriol verd , croyoit qu'il étoit contenu dans le vitriol, & que le borax ne servoit qu'à le dégager : il le nommoit aussi *sel volatil narcotique de vitriol* , parcequ'il le retiroit par la voie de la sublimation. Plusieurs Chymistes depuis Homberg ont été dans le même sentiment ; mais feu M. Rouelle fit voir que ce sel ne devoit sa volatilité qu'à l'eau de sa crySTALLISATION , & qu'après l'en avoir dépouillé, il étoit très-fixe. M. Lémery avoit prouvé que ce sel, loin d'être un produit du vitriol, venoit au contraire du borax , & qu'on pouvoit l'en séparer par le moyen de l'acide vitriolique pur. M. Geoffroi fit voir que le sel sédatif pouvoit s'obtenir par la crySTALLISATION , d'une manière

### 322 *Introduction à l'Étude*

beaucoup plus prompt que par la sublimation, quel que fût l'acide minéral qu'on employât pour le dégager. Il a aussi le premier examiné les sels neutres qui restent après la crySTALLISATION du sel sédatif. Enfin, M. Baron a démontré que les acides végétaux pouvoient également produire un sel sédatif avec le borax, parfaitement semblable à ceux qui se font par le secours des acides minéraux.

Le sel sédatif est très-peu dissoluble dans l'eau, beaucoup moins même que le borax : exposé au feu, il se fond en un verre qui est un peu moins attaquant à l'air que celui qu'on prépare en fondant le borax : ce verre n'est que le sel sédatif lui-même, qui n'est nullement altéré.

Le sel sédatif se dissout facilement dans l'esprit-de-vin, & cette dissolution produit une flamme verte lorsqu'on la brûle.



*Analyse du Borax.*

Le plus grand nombre des Chymistes pensent que le borax est composé de l'alkali marin uni au sel sédatif, qui fait en quelque sorte fonction d'acide, en empêchant l'alkali de faire effervescence avec les acides, même les plus forts. Il paroît néanmoins que cet alkali du borax n'est pas parfaitement saturé, puisque ce sel a une saveur urineuse, & qu'il verdit le syrop de violettes. Il paroît aussi que le sel sédatif ne contracte qu'une foible adhérence avec sa base, puisque les acides les plus foibles peuvent le dégager.

L'existence de l'alkali marin dans le borax, est suffisamment prouvée par l'examen des sels qu'on en retire après la séparation du sel sédatif. M. Baron assure que le sel sédatif lui-même est tout contenu dans le borax, & que l'acide qu'on emploie à le séparer n'entre point du tout dans sa formation ; puisque ce sel est toujours absolument

le même , quel que soit l'acide qu'on ait employé pour décomposer le borax. En effet, tous ces sels sédatifs , préparés par différens acides, n'ont à l'extérieur que quelques différences assez légères; mais ils paroissent tous avoir le même degré de volatilité; ils ont tous la propriété de décomposer le nitre & le sel marin. Enfin, M. Baron assure qu'on peut former de véritable borax , en unissant par la fusion le sel sédatif avec l'alkali marin. Il ne resteroit plus après les expériences de M. Baron , qu'à connoître la nature du sel sédatif; M. Bourdelin a tenté inutilement un grand nombre d'expériences sur ce sel qu'il a combiné avec toutes sortes de corps.

M. Cadet a donné à l'Académie des Sciences différens Mémoires sur le borax : il prétend que le sel sédatif n'existe pas tout formé, & qu'il est produit par une terre vitrifiable mise dans l'état de sel neutre par l'acide qu'on a employé à décomposer le borax. A

cette opinion , qui étoit celle de plusieurs Chymistes, & qu'on trouve encore énoncée dans la table des fels du Dictionnaire Encyclopédique, il ajoute que le sel sédatif retient opiniâtrément quelques portions d'alkali , & même d'acide marin, qui se trouvoient dans le borax. On peut voir le détail de ses raisons & de ses expériences dans le cinquième volume des *Mémoires* lus à l'Académie des Sciences par des Savans étrangers.

*Usages du Borax & du Sel sédatif.*

Le sel sédatif a été regardé comme calmant & anti-spasmodique ; on le prescrit depuis quelques grains jusqu'à un scrupule, & même demi-gros : mais la plupart des bons Médecins ne reconnoissent guère cette vertu au sel sédatif.

Le borax est employé comme fondant par les ouvriers ; il sert pour souder les métaux.

## E S P E C E I V.

Alkali volatil. *Alkali volatile, minerale.*  
WALL.

L'alkali volatil a une faveur caustique & urineuse ; il a une odeur forte, pénétrante & également urineuse ; il attire l'humidité de l'air , mais moins que l'alkali fixe déliquescent ; il se dissout dans l'eau avec facilité, & en plus grande quantité lorsqu'elle est chaude que lorsqu'elle est froide ; il produit de beaux cristaux par le refroidissement de sa dissolution.

L'alkali volatil s'unit avec effervescence aux acides, & verdit le syrop de violettes comme les autres alkalis. Son odeur , & la propriété qu'il a de se volatiliser à une chaleur assez médiocre , lui ont fait donner le nom qu'il porte.

*Origine de l'Alkali volatil.*

L'alkali volatil ne se trouve jamais



pur & sous sa forme saline ; mais il se rencontre assez fréquemment uni à un acide, & dans l'état de sel neutre. Suivant le rapport de Wallérius, on le retire par la distillation de plusieurs pierres, & sur-tout de celles qui sont calcaires. Lorsque ce sel est combiné à un acide, il faut employer dans la distillation un intermède, tel que l'alkali fixe, la craie, la chaux, les matières métalliques ou leurs chaux, qui, en décomposant le sel neutre, en dégagent l'alkali volatil.

*Combinaisons de l'Alkali volatil,*

L'alkali volatil dissout le soufre, lorsqu'on unit ces deux substances dans l'état de vapeurs : il en résulte un foie de soufre à base d'alkali volatil, connu sous le nom de *liqueur fumante de Boyle*.

L'alkali volatil forme avec les sels acides des sels composés parfaits, connus sous le nom de *sels ammoniacaux* : il décompose ceux qui ont pour base une terre ou une matière métallique.

### 328 *Introduction à l'Etude*

Ce sel dissout les métaux & les demi-métaux, d'autant plus aisément qu'ils ont déjà été séparés de quelques dissolvans, & qu'ils se trouvent dans l'état d'une terre précipitée : il en est pourtant qu'il dissout immédiatement avec assez de facilité.

Il s'unit aux sucres acides des plantes, & aux produits acides des végétaux fermentés.

Il forme avec les huiles grasses ou essentielles des plantes, une espèce de savon.

La dissolution d'alkali volatil mêlée à l'esprit-de-vin, fait une pâte nommée *offa helmontii* : il coagule le lait des animaux.

#### *Analyse de l'Alkali volatil.*

L'alkali volatil est formé des principes aqueux & terreux, de même que l'alkali fixe ; mais la terre qui entre dans sa composition est beaucoup plus atténuée ; elle se trouve d'ailleurs combinée avec une certaine quantité d'huile,

le, ce qui se prouve par plusieurs expériences. 1.<sup>o</sup> Lorsqu'on combine de l'alkali fixe & de l'huile, & qu'on leur fait subir une action violente de la part du feu, il se produit toujours de l'alkali volatil : la même chose arrive si la matière a souffert la fermentation. 2.<sup>o</sup> Lorsqu'on distille l'alkali volatil sur des matières capables de lui enlever son principe huileux, comme la chaux vive par exemple, il perd plusieurs de ses propriétés. C'est au principe huileux de l'alkali volatil que sont dues son odeur & sa volatilité; c'est encore à la présence de l'huile dans ce sel, qu'on doit attribuer la propriété que le sel ammoniacal nitreux a de détonner seul, lorsqu'on le fait chauffer.

*Usages de l'Alkali volatil.*

La Médecine emploie l'alkali volatil comme sudorifique & anti-hystérique. On le regarde aussi comme cordial, lorsqu'il est aromatisé. On le prescrit par gouttes dans des boissons convenables.

Ce remède est très-vanté contre la morsure des animaux venimeux, & particulièrement de la vipère : on en fait prendre à l'intérieur, & on l'applique à l'extérieur.

---

## S E C T I O N II.

Sels neutres. *Salia neutra.*

**L**ES sels neutres sont formés par l'union d'un acide à une substance qu'on appelle la *base*, de manière à ne plus faire qu'un corps très-différent de ceux qui ont servi à le former.

Ces sels ont une saveur salée, qui n'est ni acide, ni urineuse ; ils ne changent pas la couleur du fyrop de violettes, & ne peuvent communiquer leurs propriétés salines à d'autres corps.



G E N R E I.

Sels neutres parfaits à base d'alkali fixe. *Salia neutra perfectissima, fixa.*

Les sels de ce genre sont les plus parfaits de tous les sels neutres; ils ont une saveur bien marquée, mais moindre que celle des sels simples; ils ont aussi moins de facilité à se dissoudre dans l'eau; ils prennent aisément une forme concrete & crySTALLINE, & résistent à leur décomposition plus fortement que tous les autres sels neutres.

E S P E C E I.

Tartre vitriolé. *Tartarus vitriolatus.*

Le tartre vitriolé est un sel neutre parfait, formé par l'union de l'acide vitriolique à l'alkali déliquescent. Ce sel a une saveur amère & désagréable. Il demande environ dix-huit fois son poids d'eau pour être tenu en dissolution: l'eau bouillante en dissout une

quantité un peu plus considérable. La figure des cristaux de ce sel varie beaucoup ; le plus ordinairement il forme des cubes dont tous les angles sont coupés. Le tartre vitriolé exposé sur des charbons ardents, petille, & ses cristaux se brisent. Les Chymistes nomment ce phénomène *décrépitation*. Ce sel ne fond qu'à la plus grande violence du feu, & ne se volatilise que très-difficilement.

### *Origine du Tartre vitriolé.*

Le tartre vitriolé ne se trouve pas ordinairement dans le Règne Minéral ; quelques Auteurs prétendent cependant que l'eau de la mer en tient en dissolution ; mais ce fait n'est pas encore complètement avéré. L'art produit le tartre vitriolé : 1.° En combinant directement l'acide vitriolique & l'alkali déliquescent , jusqu'au point de saturation ; ce qu'on connoît , lorsqu'après l'effervescence passée, la liqueur n'altère point la couleur du syrop de vio-

lettes. 2.<sup>o</sup> En décomposant par le moyen de cet alkali, les sels neutres vitrioliques qui ont pour base un alkali volatil, une terre, ou une substance métallique. 3.<sup>o</sup> En lessivant le résidu de la distillation de l'acide nitreux opérée par l'acide vitriolique pur, la glaise, l'alun, les vitriols, ou celui qui reste après avoir décomposé le sel fébrifuge de Sylvius par les mêmes moyens. 4.<sup>o</sup> En précipitant par l'alkali fixe déliquescent la dissolution d'argille dans l'eau. 5.<sup>o</sup> En faisant détonner le soufre avec le nitre dans un creuset rougi au feu, & retirant par la dissolution & la crySTALLISATION le nouveau sel qui se trouve dans le creuset après la détonnation. 6.<sup>o</sup> En laissant le foie de soufre se décomposer de lui-même. 7.<sup>o</sup> Enfin, en mettant évaporer à l'air le sel sulfureux de Stahl, ou le faisant calciner.

*Analyse du Tartre vitriolé.*

La manière dont on fait artificielle-

ment le tartre vitriolé , prouve assez que ce sel est composé d'acide vitriolique uni à l'alkali fixe déliquescent ; puisque de quelque manière qu'on unisse ensemble ces deux substances , il en résulte toujours un sel absolument le même , quoiqu'on lui ait donné des noms différens , comme ceux d'*arcanum duplicatum*, de sel de *duobus*, de sel polychreste de Glafer , de panacée du duc d'Holface, &c. Sa décomposition le prouve également ; elle peut s'opérer de plusieurs manières. La première se fait par l'intermède du phlogistique. Pour y parvenir , on mêle le tartre vitriolé avec la poudre de charbon , & un peu d'alkali fixe ; on fait fondre le tout dans un creuset : il en résulte une masse d'un rouge obscur , qui se dissout dans l'eau & lui communique une couleur d'un verd noirâtre. Cette masse n'est autre chose qu'un foie de soufre formé par l'acide vitriolique , qui a quitté l'alkali fixe avec lequel il étoit combiné dans le tartre vitriolé , pour



s'unir au phlogistique des charbons , & former avec lui un soufre que l'alkali a dissous. Ce foie de soufre tient aussi en dissolution une portion de charbon qui le colore. On peut en versant un acide sur la liqueur de ce foie de soufre, en précipiter le soufre, & le débarrasser ensuite par la sublimation de la matière charbonneuse qu'il a entraînée avec lui.

La voie des doubles affinités, offre encore un moyen de décomposer le tartre vitriolé. On prend pour cela un sel à base métallique, tel que l'argent ou le mercure dissous dans l'acide nitreux; on mêle de la dissolution de ce sel avec une de tartre vitriolé; le mélange se trouble; le métal se précipite uni à l'acide vitriolique, & on retrouve dans la liqueur un sel de nitre produit par l'acide nitreux, qui a quitté le métal pour se porter sur l'alkali fixe.

M. Baumé a indiqué un troisième moyen de décomposer le tartre vitriolé en employant l'acide nitreux; l'opé-

### 336 *Introduction à l'Etude*

ration réussit très - facilement, comme l'a remarqué ce Chymiste. Il suffit de faire bouillir du tartre vitriolé dans de bonne eau-forte ; il s'en élève des vapeurs qui ont une forte odeur d'acide marin , & lorsque la dissolution est achevée , la liqueur fournit par le refroidissement des véritables crystaux de nitre.

Suivant l'opinion de feu M. Rouelle , on peut en quelque sorte surcharger le tartre vitriolé d'acide ; il suffit pour cela de mettre du tartre vitriolé en poudre dans une cornue de verre, & de verser dessus une certaine quantité d'acide vitriolique qu'on retire ensuite par la distillation ; il en reste toujours assez d'adhérent au tartre vitriolé, pour qu'il ait une saveur très - sensiblement acide. M. Baumé s'est élevé contre cette expérience, & prétend que l'acide vitriolique surabondant n'est pas combiné avec le tartre vitriolé, mais seulement attaché à ce sel, & qu'il suffit de le laver & de le  
faire

faire effuyer exactement sur du papier pour lui enlever; & persiste à croire que le tartre vitriolé est un sel parfaitement neutre, qui ne peut s'unir par surabondance à aucun des principes qui le constituent.

*Usages du Tartre vitriolé.*

Le tartre vitriolé est employé en Médecine, comme fondant & apéritif, à la dose d'un demi-gros ou d'un gros, dans quelque bouillon ou tisane apéritive; pris en quantité plus considérable, il devient purgatif; c'est ce même sel qu'on vante dans les suites de couches, & qu'on administre fréquemment sous le nom de *sel de duobus*.

E S P E C E II.

Sel de Glauber. *Sal Glauberianum, neutrum, purum.* WALL. *Natrum nudum fontanum, saturatum, mirabile Glauberi.* LINN.

Ce sel qui a reçu le nom de *sel admi-*

### 338 *Introduction à l'Etude*

*able* par son inventeur Glauber, est du nombre des sels composés parfaits. Il est le résultat de l'union de l'acide vitriolique à l'alkali fixe marin ; sa saveur est excessivement amère ; il se dissout assez facilement dans l'eau, même froide ; l'eau bouillante en dissout presque son poids : aussi ce sel est-il du nombre de ceux qui crySTALLISENT le plus facilement par le refroidissement de leur dissolution. Les cristaux de sel de Glauber forment assez ordinairement de grosses colonnes striées dans leur longueur & terminées par des pyramides ; mais la moindre circonstance fait varier cette figure. Le sel de Glauber exposé à l'air, se sèche & se réduit en poudre, parcequ'il perd facilement l'eau qui est très-abondante dans sa crySTALLISATION ; c'est encore à cette quantité d'eau que le sel de Glauber doit la propriété qu'il a de se liquéfier à la moindre chaleur ; mais en perdant son humidité, il se sèche & ne peut entrer dans une véritable fu-

tion ignée, qu'à un degré de chaleur très-considérable.

*Origine du Sel de Glauber.*

Le sel de Glauber est une des substances salines qui existent en plus grande abondance ; l'eau de la mer & des fontaines salées en tient une grande quantité en dissolution ; on le retire même dans les salines de Franche-Comté des eaux-mères du sel marin qu'on fait rapprocher sur le feu. Une partie de ce sel forme de beaux cristaux qu'on débite sous le vrai nom de *sel de Glauber* ; l'autre portion cristallisée plus confusément en petites éguilles, se vend sous le nom de *sel d'epsom* ; mais il ne doit pas être confondu avec le véritable sel d'epsom d'Angleterre, qui est d'un blanc beaucoup plus mat, & qui ne s'effleurit point à l'air, comme le faux sel d'epsom. Si on dissout chacun de ces sels séparément, dans une quantité suffisante d'eau, & qu'on verse dans chacune des dissolutions un peu d'alkali

fixe en liqueur , le véritable sel d'epsom forme un précipité blanchâtre très-apparent , ce que ne fait pas le sel d'epsom factice. On attribue dans le *Dictionnaire Encyclopédique* la formation du vrai sel d'epsom à la combinaison de l'acide vitriolique avec le natron ou alkali terreux. Ce même sel se trouve dans les eaux de Sedlitz & dans beaucoup d'autres endroits ; il ne paroît différer du sel de Glauber que par un petit excès de terre qui se trouve dans sa base.

L'art produit journellement du sel de Glauber. 1.<sup>o</sup> En unissant directement l'acide vitriolique à l'alkali marin. 2.<sup>o</sup> En décomposant le sel marin par l'intermède de l'acide vitriolique , comme le pratiquoit Glauber , qui retiroit par ce moyen un acide marin pur , & trouvoit l'acide vitriolique uni à la base alkaline de ce sel , formant ce qu'il nommoit son *sel admirable*. 3.<sup>o</sup> Le sel d'epsom du commerce dissous dans l'eau chaude , & crySTALLISÉ par un refroidissement très-lent , fournit un beau sel.

de Glauber. Les fels à base terreuse qui altéroient la pureté de ce faux sel d'epsom, restent dans l'eau-mère après sa crySTALLISATION.

*Analyse du Sel de Glauber.*

Les différens procédés employés pour fabriquer le sel de Glauber, démontrent assez qu'il doit son origine à l'acide vitriolique & à l'alkali marin. La décomposition de ce sel prouve la même chose, & les moyens d'y parvenir sont les mêmes que ceux qu'on emploie pour décomposer le tartre vitriolé ; savoir, le phlogistique, la voie des doubles affinités, & l'acide nitreux dans lequel on fait bouillir le sel de Glauber. Il s'élève encore, pendant la dissolution, des vapeurs qui ont l'odeur d'acide marin ; & après que la liqueur a été évaporée, on retrouve un véritable nitre cubique.

Le sel de Glauber, quoique formé du même acide que le tartre vitriolé, en diffère cependant par sa saveur qui

### 342 *Introduction à l'Etude*

est bien plus marquée , par la grosseur de ses crystaux , par la quantité d'eau qu'il retient dans sa crySTALLISATION ; enfin par sa dissolubilité qui est beaucoup plus grande. Toutes ces différences ne peuvent venir que de l'alkali , qui , quoique de nature fixe , s'éloigne assez de l'alkali déliquescent , pour que la combinaison qu'il forme avec l'acide vitriolique soit moins exacte. On voit en effet que le tartre vitriolé , qui est formé des deux sels simples les plus parfaits en leur genre , ceux dont la tendance à la combinaison étoit la plus forte , est aussi celui dans lequel cette combinaison est le mieux satisfaite ; car si on compare aux propriétés de l'acide vitriolique & de l'alkali déliquescent , celles qu'on retrouve dans le tartre vitriolé , on ne trouvera dans ce sel qu'une saveur assez médiocre , & très-peu de dissolubilité dans l'eau ; tandis que le sel de Glauber qui a pour base un alkali moins dissoluble , se dissout cependant avec une très-grande facilité.



*Usages du Sel de Glauber.*

Le sel de Glauber est d'usage en Médecine, comme fondant lorsqu'on le prend en petite dose, & étendu de beaucoup d'eau : il devient purgatif quand il est rapproché, & pris en quantité plus considérable.

E S P E C E III.

Nitre. *Nitrum*. WALL. *Nitrum humosum*. LINN.

Le nitre est un sel neutre parfait formé par l'union de l'acide nitreux à l'alcali déliquescent. La saveur de ce sel est fraîche & un peu amère. Il se dissout dans environ six parties d'eau froide ; l'eau bouillante en dissout une bien plus grande quantité ; aussi ce sel est-il du nombre de ceux qui crySTALLISent avec facilité par le refroidissement lent de leur dissolution. Les crySTaux de nitre sont des prismes hexagones, dont les extrémités sont souvent taillées en bi-

#### § 44 *Introduction à l'Etude*

zeau ; ils sont communément percés d'un canal dans toute leur longueur ; mis sur des charbons ardens, ils fusent & s'enflamment, les Chymistes ont nommé ce phénomène *détonnation*.

#### *Origine du Nitre.*

On croit que le nitre se forme journellement : on en trouve de naturel aux Grandes-Indes crySTALLISÉ sur des pierres ; on le nomme *nitre* ou *salpêtre de houffage*. Wallérius parle d'une espèce de roche grise qu'on trouve en Finlande, qu'on appelle *raptakivi*, & dans laquelle il entre beaucoup de spath : cette pierre se décompose à l'air, & fournit beaucoup de nitre par la lixiviation, au rapport de ce Naturaliste : il la nomme, *saxum in aere deliquesçens, nitrosum*. On trouve beaucoup de terres nitreuses. M. Rouelle le jeune, dit qu'on retire du nitre de l'eau des puits de Paris ; cet habile Chymiste assure que les pierres calcaires en contiennent, & qu'il existe dans un grand

nombre de substances du Règne Minéral. Les plantes sont les matrices ordinaires du nitre, on en trouve cependant dans quelques humeurs animales.

La plus grande partie du nitre qui se débite dans le commerce, est tiré des démolitions des vieux bâtimens par les Salpêtriers. Ils prennent pour leur travail vingt-quatre tonneaux disposés en trois rangs, de huit chacun; le fond de ces tonneaux est percé d'un trou qu'on bouche avec des pailles, comme les cuviers dont se servent les blanchisseuses pour couler leur lessive: on met dans chaque tonneau un faux-fonds porté sur des nattes de paille, & c'est sur ce faux fonds qu'on met premièrement des cendres, environ la sixième partie de ce que peut contenir le tonneau; on le remplit ensuite avec des platras cassés en petits morceaux; puis on verse de l'eau pour en faire la lessive; cette eau sort par les pailles, & est reçue dans un baquet qu'on a mis au-dessous. La liqueur sortie des

tonneaux de la première rangée, est reverfée fur ceux de la feconde; celle-ci, fur ceux de la troifième, & lorsqu'on ne la trouve pas encore aflez chargée, on la fait paffer fur une nouvelle rangée de tonneaux pleins de matières neuves. Les Salpétriers ont toujours le foin de verfer de nouvelle eau fur les platras, qu'ils foupçonnent ne contenir que peu de fel, afin qu'elle le diffoive; ils la font paffer enfuite fucceffivement fur des matières qui en contiennent davantage : enfin, lorsque l'eau eft fuffifamment chargée, on la fait évaporer dans des chaudières de cuivre; pendant l'évaporation, il fe fait une pellicule à la furface des chaudières; les ouvriers la nomment le *grain*; ils l'enlèvent avec des écumoires de cuivre, & la mettent à égoutter dans des paniers d'osiers, fufpendus au-deffus de chaque chaudière: ce grain eft une portion de fel marin, qui cryftallife par évaporation. Lorsque la lessive eft fuffifamment rapprochée,

ce qu'ils connoissent lorsqu'en en mettant sur une assiette, elle crystallise, ils la versent dans des baquets de bois, ou dans des chaudières de cuivre qu'ils nomment *recevoirs* : après qu'elle y est restée une demi-heure, pour y déposer les ordures qu'elle peut contenir, on la tire par le moyen d'un robinet, placé à quatre pouces au-dessus du fond du recevoir, & on la met à crystalliser dans des bassines de cuivre : au bout de quatre jours, on sépare le sel de l'eau-mère dans laquelle il s'est crystallisé : on le nomme *nitre de la première cuite* : il est gras, & contient encore beaucoup de sel marin ; pour le purifier, on le met dans une chaudière de cuivre sur le feu, & on facilite sa dissolution en y ajoutant un peu d'eau ; il s'élève une première écume qu'on enlève, après quoi on verse dans la liqueur une certaine quantité de colle d'Angleterre dissoute dans l'eau ; cette colle y produit une seconde écume noirâtre, qu'on enlève aussi exacte-

ment : on continue de faire bouillir la lessive, & il se forme du grain que les Salpétriers enlèvent comme dans la première cuite. Lorsque le grain cesse de paroître, & que la liqueur de nitre est suffisamment rapprochée, on la puise & on la met à crySTALLISER dans des bassines de cuivre, fermées d'un couvercle de bois ; on laisse la crySTALLISATION se faire lentement : quatre jours après on vuide les bassines ; on sépare le sel de l'eau-mère ; c'est le nitre de la seconde cuite.

Les Distillateurs l'emploient pour en tirer l'eau-forte : on purifie de nouveau le nitre de la seconde cuite, comme on a fait pour celui de la première, en observant seulement d'employer moins de colle-forte pour la clarification. Les eaux-mères des différentes crySTALLISATIONS étant évaporées, fournissent encore du nitre, mais qui est très-impur, & qu'on peut regarder comme celui de la première cuite. Enfin, lorsque ces eaux ne sont plus

en état de fournir de salpêtre, les ouvriers les jettent sur des platras épuisés, & après un laps de temps, ils les exploitent comme neufs.

Plusieurs Chymistes ont cru que les platras ne contenoient que du nitre à base terreuse, & que les cendres qu'on ajoutoit dans leur lessive fournissoient la quantité d'alkali nécessaire pour précipiter la terre, saturer l'acide, & le convertir en un véritable nitre : mais M. Rouelle le jeune a démontré que ce sel existoit tout formé, à base d'alkali fixe, dans les platras : d'ailleurs ce célèbre Chymiste a observé très-judicieusement, que la plus grande partie des cendres qu'on emploie dans le travail du salpêtre, étant produite par la combustion des bois flottés, elles ne contiennent que peu ou point d'alkali fixe, & que leur principal usage est de dégraisser le nitre & de le rendre plus pur. Quoi qu'il en soit, on trouve dans les eaux-mères une assez grande quantité de nitre à base calcaire, dont

on peut tirer parti, en y versant une lessive d'alkali fixe déliquescent, qui en précipite la terre nommée *magnésie*, & forme avec l'acide nitreux de véritable salpêtre. On prépare aussi une magnésie différente, en faisant évaporer ces eaux-mères & les calcinant; mais ces magnésies sont toujours fort impures, parcequ'on n'est jamais certain d'enlever tous les sels marins & nitreux qui sont contenus dans ces eaux-mères.

Le nitre de la troisième cuite est le plus pur des arsenaux; c'est celui qu'on emploie pour la fabrique de la poudre à canon. Les Chymistes ne le trouvent point encore tel qu'ils le desirerent pour leurs opérations; ils le raffinent de nouveau en le dissolvant dans l'eau bouillante, & le laissant refroidir le plus lentement possible, pour qu'il forme de beaux cristaux. Il faut observer que quoique le nitre de la troisième cuite contienne encore du sel marin, ce sel ne cristallise point avec le nitre;



la raison en est que ce sel, n'étant presque pas plus dissoluble dans l'eau bouillante que dans l'eau froide, reste en dissolution dans l'eau même refroidie; tandis que tout le nitre, qui n'étoit dissous qu'à l'aide de la chaleur, est déjà cristallisé.

*Analyse du Nitre.*

On reconnoît que le nitre est composé d'acide nitreux & d'alkali déliquescent, parcequ'en combinant ces deux sels ensemble jusqu'à parfaite saturation, on en forme du nitre. La même chose a lieu lorsqu'on décompose le tartre vitriolé par l'intermède de l'acide nitreux, ou le sel fébrifuge par le même acide; ou enfin tout autre sel dont la base soit l'alkali fixe déliquescent. La décomposition du nitre prouve la même chose, & peut s'opérer de plusieurs manières.

1.° Si on met du nitre dans un creuset sur le feu, il se liquéfie de même que tous les sels qui se dissolvent en quan-

tité beaucoup plus considérable dans l'eau chaude que dans l'eau froide ; il se sèche ensuite à mesure qu'il perd de son humidité, puis il entre de nouveau en une véritable fusion ignée. Si on le tient dans cet état pendant plusieurs heures, on trouve qu'une très-grande quantité d'alkali fixe a perdu son acide : on nomme ce produit *nitre alkalisé par lui-même*. Du nitre, mis seul en distillation dans une cornue de grais, perd un peu de son acide qui passe dans le récipient qu'on a eu soin d'ajuster à la cornue. Il faut observer que cette opération a été faite dans une cornue de grais, & que peut-être réussiroit-elle autrement dans des vaisseaux de verre ; d'ailleurs la distillation ne peut jamais être poussée fort loin, parceque le feu nécessaire pour opérer la décomposition du nitre est plus que suffisant pour faire fondre la cornue qui le contient, & à laquelle il sert même de fondant.

2.<sup>o</sup> Le nitre distillé avec du sable  
laisse

laisse échapper son acide ; mais cette opération ne peut être poussée plus loin que la précédente, par la même raison. Le résidu est une espèce de *fritte* dont le fond est entièrement vitrifié, & la partie supérieure sensiblement alcaline.

3.<sup>o</sup> Les argilles décomposent le nitre avec beaucoup de facilité, sur-tout celles qui sont colorées. Si l'argille qu'on emploie est humide, & que le nitre ne soit pas bien desséché, on retire un acide très-phlegmatique, qu'on nomme *eau-forte* ; si les matières qu'on met en distillation sont plus sèches, on retire un acide plus concentré : le résidu de cette opération est une masse terreuse rougeâtre, dont on tire par le lavage beaucoup de l'alkali fixe qui serroit de base au nitre, & de plus une petite portion de tartre vitriolé, formé par une partie de cet alkali fixe qui s'est combiné à l'acide vitriolique de l'argille.

4.<sup>o</sup> L'acide vitriolique versé sur du

### 354 *Introduction à l'Etude*

nitre le décompose & en dégage l'acide. Si on fait l'opération dans une cornue tubulée, à laquelle on ait adapté plusieurs ballons enfilés, pour condenser les vapeurs qui distillent & recevoir la liqueur, on obtient un acide nitreux, auquel les Chymistes ont donné le nom d'*esprit de nitre à la manière de Glauber*. Cet acide est d'autant plus coloré, & répand des vapeurs d'autant plus épaisses, que le nitre qui a été décomposé, étoit plus sec, & l'acide vitriolique qui en a opéré la décomposition plus concentré : le résidu de cette distillation est un vrai tartre vitriolé qu'on a désigné sous le nom particulier de *sel de duobus*, ou *arcanum duplicatum*.

5.<sup>o</sup> Les sels vitrioliques à base métallique, mis en distillation avec le nitre, en dégagent l'acide. Le vitriol de fer est celui qu'on emploie communément à cet usage : on le fait dessécher sur le feu jusqu'à ce qu'il soit blanc ; on le mêle ensuite avec le nitre dans une

cornue placée dans un fourneau de reverbère ; après avoir adapté un grand ballon , lutté exactement avec le lut gras couvert d'une bande de linge enduite de chaux éteinte & de blanc d'œuf, on procède à la distillation d'abord très-lentement ; à mesure que les vaisseaux se dessèchent & s'échauffent , on augmente le feu , jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien : le produit de cette distillation est un acide nitreux d'un jaune-rougeâtre, qui répand des vapeurs assez épaisses. Cet acide ne diffère presque point de l'esprit de nitre préparé à la manière de Glauber : la masse qui reste dans la cornue est rouge ; en la lessivant avec de l'eau bouillante, & filtrant la lessive, on en obtient par l'évaporation un tartre vitriolé : on délaye dans une nouvelle quantité d'eau la masse qui est restée sur le filtre, privée de toute matière saline ; après avoir laissé déposer la portion la plus grossière, on décante l'eau trouble, & on la laisse précipiter. Ce second dépôt qu'elle

forme est une terre ferrugineuse très-fine, nommée *terre douce de vitriol* : c'est en effet la terre du fer qui étoit tenue en dissolution par l'acide vitriolique. Lorsqu'on distille le nitre bien desséché avec un vitriol qui ait été calciné jusqu'au rouge, on a un acide d'une couleur très-rembrunie, qui exhale des vapeurs très-rousses & très-épaisses : on l'a nommé, à cause de sa couleur, *sang de la salamandre*. Enfin, si on a fait fondre le nitre avant de le distiller, & qu'on emploie pour le décomposer le vitriol martial calciné jusqu'à ce qu'il ait pris une couleur rouge très-foncée, on obtient un premier esprit de nitre d'un verd obscur, qui exhale des vapeurs très-rouges & très-épaisses : cette liqueur en furnage une seconde qui a beaucoup plus de consistance, & dont la couleur est d'un blanc jaunâtre ; ces deux liqueurs ne se mêlent point ensemble. Sur la fin de la distillation il passe une matière saline concrète ; c'est une véritable *huile de vitriol glaciale*,

qui se dissout dans l'eau avec beaucoup de rapidité, produit une chaleur considérable, & laisse échapper, dans le moment de sa dissolution, des vapeurs d'acide nitreux très-épaisses : enfin, elle forme par son union à l'alkali déliquescent un vrai tartre vitriolé. On doit procéder dans cette opération le plus lentement possible, parceque les vapeurs sont sujettes à rompre les luts. Il faut cependant, sur la fin, employer un feu d'une violence extrême, & tel que le fer qui servoit de base au vitriol martial se fonde : on le retrouve en masses, plus ou moins grosses, dans le résidu de la distillation, & on n'en peut séparer ni tartre vitriolé, ni terre douce de vitriol.

6.° Les sels sédatifs séparés du borax par les différens acides, ont également la propriété de décomposer le nitre & d'en dégager l'acide. le résidu de cette opération est une espèce de borax dont la base est un alkali déliquescent.

7.° L'arsenic décompose aussi le nitre, dégage son acide, & forme avec sa base alkaline un sel que M. Macquer a le premier fait connoître, & qu'il a nommé *sel neutre arsenical*. Comme l'arsenic est fort sec, il faut mettre de l'eau dans le ballon qui reçoit les vapeurs, afin qu'elles puissent se condenser : c'est cette eau qui produit la couleur verte de l'esprit de nitre tiré par l'arsenic.

Dans toutes ces décompositions du nitre, on retrouve son acide & l'alkali qui lui servoit de base ; mais il est des moyens de décomposer ce sel qui en détruisent l'acide.

1.° Si on jette du nitre sur des charbons embrasés, il détonne, & on ne retrouve plus après sa détonnation que de l'alkali fixe.

2.° Un mélange de nitre & de charbon, projeté par cuillerées dans un creuset rougi, produit une détonnation vive, & il ne reste après que de l'alkali fixe uni à la cendre des charbons.

3.° Si on mêle parties égales de tartre



& de nitre en poudre, & qu'on leur applique un charbon allumé, toute la masse brûle rapidement, & ne laisse après la détonnation qu'une matière nommée *flux blanc* : c'est un mélange de l'alkali du tartre & de la base du nitre. Lorsqu'on met deux parties de tartre contre une de nitre, la détonnation est moins rapide, & le produit est noir, parcequ'il contient une portion de tartre, qui, n'ayant pas été parfaitement calcinée, reste dans l'état de charbon : cette matière forme le *flux noir*. Ce nom de flux leur a été donné, parcequ'on emploie ces alkalis pour fondre les métaux. On les désigne aussi sous les noms de *nitre alkalisé par le tartre*, *alkali extemporané*.

4.<sup>o</sup> Les métaux abondans en phlogistique, tels que l'antimoine, le zinc, l'étain, le fer, peuvent également opérer la détonnation du nitre, lorsqu'on mêle leur limaille avec ce sel réduit en poudre, & qu'on leur applique un charbon allumé, ou qu'on les projette dans

un creuset rougi : la détonnation qui arrive dans ce cas est très-vive, & on retrouve, après qu'elle est achevée, l'alkali fixe qui servoit de base au nitre, & le métal réduit en une chaux d'autant plus parfaite, que la quantité de nitre étoit plus considérable.

Toutes ces détonnations du nitre ont lieu, parceque l'acide nitreux qui est dans ce sel s'y trouve dans l'état de la plus grande siccité possible ; cet acide ayant d'ailleurs une très-grande affinité avec le phlogistique qu'il trouve tout développé, s'unit à lui, & forme un soufre nitreux qui s'embrase avec rapidité dans l'instant même de sa formation. Dans cette inflammation, non-seulement le phlogistique surabondant est brûlé, mais encore tout celui qui constituoit l'acide nitreux, comme on peut s'en assurer par les *clyffus du nitre*. Pour faire cette opération, on prend une cornue tubulée, de terre ou de fer, qu'on place sur un fourneau ; on ajuste à son col un appareil de plusieurs grands ballons

ballons enfilés; observant que le dernier ait un petit trou qu'on laisse ouvert pour prévenir la rupture des vaisseaux. On fait rougir le fond de la cornue, puis on verse par la tubulure le mélange du nitre, & de la matière inflammable qui doit opérer sa décomposition; la détonnation a lieu; les vapeurs qui s'en élèvent enfilent l'appareil des ballons; & lorsqu'elles sont condensées, on ne retrouve dans les derniers que de l'eau pure. Le premier contient un peu d'alkali volatil, mais pas un atôme d'acide; ce qui prouve qu'il a été complètement détruit & réduit en ses principes d'eau, de terre & de phlogistique. A l'égard de l'alkali volatil qu'on retrouve dans le premier ballon, il paroît produit par une portion de l'alkali fixe du nitre, qui a été volatilisée par la violence de la détonnation, & à l'aide peut-être d'un peu du principe inflammable de l'acide, ou des corps qui ont servi à sa décomposition.

5.<sup>o</sup> Le soufre jetté sur du nitre en

### 362 *Introduction à l'Etude*

fusion, le fait détonner; il se produit une flamme très-vive dont la couleur est blanche, & non pas bleue comme seroit celle du soufre. Lorsque la détonnation est achevée, on retrouve dans le creuset une masse saline qu'on nomme *sél polychreste de Glaſer*: cette masse dissoute & évaporée n'est que du tartre vitriolé. Dans cette opération le phlogistique quitte l'acide vitriolique auquel il est uni dans le soufre, pour se joindre à l'acide nitreux, avec lequel il forme un nouveau soufre nitreux qui s'embrase, & l'acide vitriolique se combine avec l'alkali fixe qui seroit de base au nitre; ainsi il paroît que la décomposition du soufre a lieu, en vertu de la loi déjà reconnue des doubles affinités.

### *Usages du Nitre.*

Le nitre est employé en Médecine comme diurétique & rafraîchissant. On le prescrit à petites doses, comme d'un scrupule ou d'un demi gros, étendu

dans une pinte de liqueur. On fait en Pharmacie une préparation fort usitée, connue sous le nom de *crystal minéral*, en faisant fondre du nitre dans un creuset, & jettant dessus, lorsqu'il est en parfaite fusion, une petite quantité de fleurs de soufre. On coule le sel en fusion sur une pierre ou dans une bassine; il s'étend en une espèce de matière vitreuse & non transparente. On peut s'en servir comme du nitre. Ce n'est en effet que ce sel privé de son eau de cristallisation, & uni à un peu de tartre vitriolé, formé par l'acide du soufre uni à l'alkali fixe du nitre, dont l'acide a été enlevé au moment de la détonnation. C'est sur-tout dans les lavemens qu'on fait usage du crystal minéral.

Les Médecins emploient la magnésie comme absorbante. En effet, celle qui a été précipitée de l'eau-mère du nitre & lavée avec soin, est une terre calcaire très-divisée. On en prépare une autre par la calcination; celle-ci est plus ou moins purgative; mais son usa-

#### 364 *Introduction à l'Etude*

ge n'est pas constant, parcequ'un degré de feu un peu plus, ou un peu moins fort, peut en enlevant ou en laissant quelques-uns des sels neutres qu'elle contient, changer singulièrement ses propriétés.

La facilité avec laquelle le nitre détonne, le rend d'un très-grand usage dans l'artifice. Soixante-quinze parties & demie de ce sel, quinze parties & demie de charbon, neuf parties & demie de soufre, forment la poudre à canon. On pile le mélange pendant douze heures de suite dans un mortier de bois avec un pilon semblable, en ajoutant de temps en temps un peu d'eau pour empêcher que la matière ne s'enflamme. Dans les travaux en grand, plusieurs pilons sont mis à l'aide d'une roue que l'eau fait tourner. La pâte étant presque sèche, on l'étend sur un crible, & on la presse avec une plaque de bois horizontale, qui la fait passer par les trous du crible en grains plus ou moins gros; les plus gros

font la poudre pour les canons ; on lisse les plus petits par un moyen fort simple. On prend un tonneau percé dans son milieu par un axe sur lequel il est mobile ; on emplit ce tonneau de poudre , & on le fait tourner rapidement ; les grains de poudre se lissent par les frottemens qu'ils éprouvent. La poudre lissée a le grain plus égal & plus fin : on s'en sert pour les fusils.

On fait avec trois parties de salpêtre , une de soufre , & deux d'alkali fixe bien sec , une poudre dont les effets sont beaucoup plus violents que ceux de la poudre à canon : on la nomme *poudre fulminante*. Si on la met sur une pelle de fer , & qu'on la fasse chauffer lentement , elle détonne avec un bruit considérable. Dans cette opération le feu fait fondre le soufre , qui forme avec l'alkali une espèce de pâte ou foie de soufre qui enveloppe le nitre & l'embarasse ; lorsqu'enfin une molécule de soufre vient à s'allumer , le nitre détonne , & fait d'autant plus de

bruit qu'il a plus de résistance à vaincre.

#### E S P E C E IV.

Nitre cubique. *Nitrum cubicum*, seu quadrangulare.

Le nitre cubique est un sel neutre parfait, formé par la combinaison de l'acide nitreux uni jusqu'à parfaite saturation à l'alkali marin. La saveur de ce sel ne diffère pas beaucoup de celle du nitre. Il se dissout assez facilement dans l'eau froide : l'eau chaude n'en dissout guère plus ; aussi n'en obtient-on jamais de plus beaux cristaux, que par l'évaporation très-lente de sa dissolution. Ces cristaux sont des cubes réguliers qui fusent sur les charbons ardents, comme ceux du nitre.

#### *Origine du Nitre cubique.*

On ne trouve en aucun endroit le nitre cubique formé par la nature ; il est toujours un produit de l'art qui le fait en combinant directement l'acide



nitreux à l'alkali marin, ou en dégageant l'acide vitriolique qui est dans le sel de Glauber par l'ébullition dans l'eau-forte ; ou enfin en décomposant le sel marin par l'acide nitreux.

*Analyse du Nitre cubique.*

La formation du nitre cubique suffit pour faire connoître la nature de ce sel. Les moyens de le décomposer, sont les mêmes que ceux qu'on a employés pour opérer la décomposition du nitre.

Ce sel n'est point d'usage.

E S P E C E V.

Sel fébrifuge de Sylvius. *Sal febrifugum Sylvii.*

Le sel fébrifuge de Sylvius est formé par l'acide marin uni à l'alkali déliquescent. Ce sel a une saveur salée un peu amère & désagréable. Il se dissout dans environ trois fois son poids d'eau froide ; l'eau chaude n'en dissout guère

### § 68 *Introduction à l'Etude*

plus; les plus beaux crystaux s'obtiennent par l'évaporation lente, & forment des cubes; ils décrépitent sur le feu, ne se fondent que difficilement, & ne se volatilisent qu'à l'extrême violence du feu.

#### *Origine du Sel fébrifuge.*

Le sel fébrifuge se trouve dans presque tous les lieux où se forme le nitre. On le tire aussi de plusieurs plantes. L'art le produit, soit en combinant directement l'acide marin à l'alkali déliquescent, soit en décomposant le sel ammoniac ou quelque sel marin à base terreuse ou métallique, par l'intermède de cet alkali fixe.

#### *Analyse du Sel fébrifuge.*

La formation artificielle du sel fébrifuge fait connoître assez quels sont les principes qui le constituent. La décomposition de ce sel le prouve également, & peut se faire à l'aide des acides vitrioliques & nitreux, purs ou

engagés dans quelque base avec laquelle ils aient moins d'affinité qu'ils n'en ont avec l'alkali fixe. Les sels sédatifs peuvent également décomposer ce sel.

*Usages du Sel fébrifuge.*

Le sel fébrifuge a été regardé pendant long-temps comme un excellent remède dans les fièvres lentes ; il est en effet fondant & apéritif ; mais ces propriétés lui sont communes avec tous les sels amers ; il est même inférieur à ceux qui ont une saveur plus marquée que lui, comme le sel de Glauber & le tartre vitriolé ; aussi se sert-on aujourd'hui de ces derniers par préférence.

E S P E C E V I.

Sel marin. *Sal marinum. Muria marina.*  
WALL. *Muria nuda, marina.* LINN.

Le sel marin est un sel neutre parfait, formé par l'union de l'acide marin à l'alkali marin. Sa saveur est salée. Il se dis-

sont dans deux parties & demie d'eau froide ; l'eau chaude n'en dissout pas davantage ; aussi obtient-on les plus beaux cristaux de ce sel par l'évaporation lente de sa dissolution : leur figure est un cube & souvent une espèce de trémie formée de plusieurs cubes qui laissent un vuide entr'eux. Ce sel décrépite sur le feu & ne se fond que difficilement : il ne se volatilise non plus qu'à un degré de chaleur très-considérable.

### *Origine du Sel marin*

On trouve le sel marin naturellement cristallisé en cubes très-réguliers. Souvent il forme des masses transparentes ; quelquefois aussi il est teint par quelques matières colorantes : on a donné à ce sel qui se trouve dans les entrailles de la terre, & qui a la transparence des pierres vitreuses, le nom de sel gemme. *Muria fossilis pura* ; WALL. *Muria nuda fossilis*. LINN. Les lieux où on rencontre le sel gemme, sont la Cata-

logne, la Calabre, la Hongrie, la Transylvanie, la Moscovie, le Tirol, & sur-tout la Pologne, près des endroits nommés *Wieliczka* & *Bochnia*. Les mines de *Wieliczka* situées au pied des Monts *Crapacks*, environ à deux lieues de Cracovie, sont placées dans une plaine bornée au Nord & au Midi de montagnes d'une hauteur médiocre ; ces mines sont creusées sous la ville même ; les galeries souterraines s'étendent même beaucoup au-delà ; elles ont six mille pieds de longueur d'Orient en Occident, deux mille du Nord au Midi, & huit cent pieds de profondeur : on ne fait même encore où finissent ces couches immenses de sel gemme. Les mines de *Bochnia* sont également placées dans une plaine entourée de montagnes ; elles ont beaucoup moins d'étendue que celles de *Wieliczka* ; elles sont beaucoup plus sujettes à produire de ces vapeurs qui s'enflamment à l'approche d'une lumière, & que les ouvriers nomment

*moufettes*. Indépendamment des masses de sel gemme, on le trouve aussi mêlé à de la terre : Wallérius le nomme *muria fossilis terrâ mineralisata*. L'eau de la mer & les fontaines salées tiennent en dissolution une très grande quantité de sel marin qu'on en retire par plusieurs procédés différens.

La plus simple de toutes ces opérations est celle qui se fait dans des marais salans, comme à *Peyrac*, à *Sijan* & à *Pecais* en Languedoc. On choisit un terrain argilleux & bas, dans lequel on forme plusieurs bassins dont un est plus grand que les autres : ils sont partagés par de petites digues, & on peut à volonté faire passer l'eau dans chacune des séparations. Lorsque la terre est bien unie, on y fait entrer l'eau à la marée montante, à la hauteur de quelques pouces ; on ferme ensuite le marais à l'aide des écluses ; le soleil venant à frapper cette eau en procure l'évaporation, & le sel cristallise à la surface. Lorsque la pellicule a acquis

une certaine épaisseur, on la casse & on la fait tomber au fond; on la retire ensuite avec des rateaux de bois, & on la met en petits monceaux au bord du marais pour la faire sécher. On dresse ensuite le sel en piles plus considérables, qu'on couvre de joncs pour le préserver de la pluie. Le sel ne peut cristalliser de cette manière que depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre. Plus le temps est sec & l'air agité, & plus on en retire: la pluie gâte tout l'ouvrage en dissolvant ce sel déjà formé, & en étendant dans une plus grande quantité d'eau celui qui étoit prêt à cristalliser. Il est même nécessaire, lorsque les pluies ont été fort abondantes, de faire sortir l'eau des marais, & d'en faire entrer de nouvelle.

Le sel qu'on retire des marais salans est toujours en assez gros cristaux; parceque l'évaporation est très-lente, mais sa couleur est grise, parcequ'il contient des molécules terreuses qui le salissent.

On fait dans les salines de l'*Avranchin* un travail différent, qui a été décrit par M. Guettard dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1758. La côte de Normandie forme dans cet endroit, avec une partie de la basse Bretagne, une baie dans laquelle se trouvent placés les rochers de S. Michel & de Tombelaine. La plage est très-plate, & est couverte d'un sable très-fin. Lorsque la mer est calme elle entre doucement dans cette baie, & n'entraîne avec elle presque aucun corps étranger, si ce n'est une portion de glaise excessivement fine, dans laquelle les voyageurs sont sujets à s'enfoncer. Comme l'eau ne monte dans cet endroit que dans les hautes marées, & qu'elle forme une sorte d'étang assez tranquille, le sel se dépose facilement; lorsque la mer est retirée, on relève le sable avec un râteau, & on le met en petits tas dont on forme ensuite une pyramide, construite de manière à représenter un escalier en vis. On couvre



ces pyramides de petits fagots enduits de terre glaise, & on les laisse en cet état jusqu'à ce qu'on en fasse le lavage. Le lavoir est établi sur une masse de terre glaise, de neuf pieds en quarré, sur laquelle on pose deux pierres qui doivent porter la fosse : elle est faite de quatre planches assemblées qui forment un châssis ; le fond est composé de plusieurs petites solives équarries, dont les bouts portent sur les deux pierres, de manière à laisser quelque distance entre la fosse & la base de terre qui la supporte ; on étend de la paille sur les solives qui forment le fond de la fosse, & on pose dessus un second fond fait de planches qui laissent quelque intervalle entr'elles, pour laisser couler l'eau des lavages. La fosse étant remplie de sable, on met au-dessus, dans un des coins, un petit fagot de bois, sur lequel on verse de l'eau de mer, qui, par ce moyen, ne creuse pas le sable, & s'étend par-tout également. L'eau qui a servi au lavage s'écoule par

un canal placé sur le fond, à une des extrémités de la fosse : ce canal va jusques dans l'atelier verser l'eau salée dans des cuves destinées à la recevoir. On éprouve cette eau en y jettant une petite boule de cire lestée d'un peu de plomb dans son centre ; lorsqu'elle surnage la liqueur, la liqueur est assez chargée de sel : on la met alors évaporer dans des chaudières de plomb quarrées, qui ont vingt-six pouces de long sur vingt-deux de large, & environ deux de profondeur. Trois de ces chaudières sont placées sur un fourneau fait de glaise délayée dans de l'eau salée : on met le bois par des ouvertures circulaires, pratiquées dans le fourneau au-dessus de chaque chaudière, & la fumée passe entre les plombs & les fourneaux. On pousse le feu vivement d'abord, pour faire bouillir la liqueur & lui faire pousser ses écumes qu'on enlève avec soin ; après qu'elles ont été enlevées, on diminue un peu le feu, & on continue l'évaporation. Lorsqu'elle est presque

que

que achevée, il faut avoir soin de remuer le sel, de peur qu'il ne brûle au fond, & que les chaudières ne se fondent. Enfin, lorsqu'il est desséché au point convenable, on le met dans des paniers suspendus au-dessus des chaudières, pour que l'eau s'égoutte dans la nouvelle liqueur qu'on met à évaporer ; le sel qu'on retire par ce moyen est très-blanc, parcequ'il ne contient aucune des saletés qu'on trouve dans les marais salans ; mais comme on le fait évaporer très-rapidement, il ne forme pas des cristaux aussi réguliers ; il est d'ailleurs fort impur, & contient, indépendamment du sel marin, une quantité plus ou moins grande de sel de Glauber, qui étoit tenu en dissolution dans l'eau de la mer, & un peu de sel à base terreuse. Le sable qui reste après qu'on en a enlevé la partie saline par la lavage, est employé par les payfans du lieu pour engraisser leurs terres.

A Moyenwic on suit un autre route

### 378 *Introduction à l'Etude*

pour tirer le sel des fontaines salées qui se trouvent abondamment répandues dans le terrain de la Lorraine. Toutes ces eaux se rassemblent dans deux puits d'où on les retire par le moyen d'une chaîne sans fin, à laquelle sont attachés des espèces d'outres de cuir, qui puisent l'eau & la versent dans un réservoir, d'où elle est ensuite portée par le moyen de conduits aux poëles dans lesquelles s'en fait l'évaporation. Ces poëles sont faites de feuilles de fer battu, & liées par de gros clous rivés des deux côtés ; chaque poële a vingt-quatre pieds en quarré, & environ deux pieds de profondeur ; elles sont placées sur un fourneau, & soutenues par quatre faumons de fer qui sont aux quatre angles ; le fourneau est ouvert en devant pour mettre le bois, & derrière chaque poële sont deux trous qui servent de cheminée, à l'ouverture desquels sont placées deux poëles plus petites, qui reçoivent l'eau du réservoir & la versent ensuite dans la grande

poêle, après lui avoir fait prendre un certain degré de chaleur. Le premier coup de feu qu'on donne est très-fort, & la liqueur ne tarde pas à bouillir ; l'évaporation même est si forte que l'eau qui est versée continuellement des petites poêles dans la grande, ne suffit pas pour remplacer celle qui se dissipe. Lorsqu'on voit paroître une crême saline à la surface de la liqueur, on empêche l'eau de tomber du réservoir, en fermant le robinet qui la conduit : on continue le feu avec un peu moins de violence, & à mesure que l'évaporation se fait, & que la pellicule devient plus épaisse, elle tombe dans des vases placés dans le fond, & sur le derrière de la poêle où le bouillon rejette les écumes. Ces petits vases, qu'on nomme *angelots*, sont des espèces de poêles de fer dont les bords sont élevés de quatre pouces de haut ; la matière qui y tombe ne recevant pas d'agitation par l'ébullition n'en peut sortir. Le premier précipité qui se forme est entièrement

dû à la sélénite, qui, comme sel moins dissoluble, crystallise d'abord : les ouvriers nomment *schlot* ce premier précipité. Lorsqu'on voit paroître de petits cubes à la surface de la liqueur, on enlève les augelots pleins de *schlot*, & après les avoir vidés, on les remet dans les poëles pour recevoir les pellicules de sel marin à mesure qu'elles se précipitent. On fait ensuite égoutter ce sel sur des claies, puis on le met dans une sebile de bois ; on l'arrose d'un peu d'eau pour que les crystaux s'attachent les uns aux autres, & que le sel se mette en masses qu'on fait dessécher dans une étuve.

Dans quelques salines de Franche-Comté & de Lorraine, on réunit l'action de l'air & celle du feu, pour produire l'évaporation de l'eau & la crySTALLISATION du sel. Le lieu où commence l'évaporation se nomme *bâtiment de graduation* ; c'est un hangar long, garni de tablettes, sur lesquelles sont posés de petits fagots d'épines ; les eaux sa-

lées tombant sur ces fagots, d'une auge qui est placée au haut du bâtiment, présentent une surface considérable à l'air qui circule sous le hangar, & qui en évapore une partie, en sorte qu'elle retombe dans une auge pratiquée au-dessous des fagots, beaucoup plus salée qu'elle n'étoit auparavant ; elle est reprise de cette auge & portée, par le moyen d'une pompe, au haut du bâtiment, d'où elle retombe sur de nouveaux fagots ; en sorte qu'après avoir répété plusieurs fois cette manœuvre, l'eau se trouve fort chargée de sel : on continue de la faire évaporer dans des chaudières de fer.

Dans les différentes cuites du sel, il se forme toujours au fond des chaudières une quantité de dépôts salins qui se durcissent, & qu'on ne peut enlever qu'à coups de marteau : on les nomme *écailles*. Les eaux-mères ou *muires*, qui restent après la crySTALLISATION du sel marin, fournissent, par l'évaporation rapide & le refroidissement, un sel de

### 382 *Introduction à l'Etude*

Glauber mal crySTALLISÉ, qu'on vend sous le nom de *sel d'epsom* : quelquefois aussi on en prépare du sel de Glauber pur & bien crySTALLISÉ.

On trouve encore le sel marin dans quantité de plantes ; mais principalement dans celles qui croissent au bord de la mer. On retire ce sel de plusieurs humeurs animales.

L'art peut former le sel marin, en combinant directement l'acide marin à l'alkali marin, ou en décomposant par l'intermède de cet alkali le sel ammoniac, ou les sels formés par l'union de l'acide marin à une base terreuse ou métallique.

#### *Analyse du Sel marin.*

Les moyens de faire artificiellement le sel marin, démontrent de quels principes il est formé ; sa décomposition le prouve également. Plusieurs Chymistes prétendent pouvoir décomposer le sel marin par le seul secours du feu, soit en le calcinant dans un creuset,



soit en le distillant sans intermède à un feu violent ; mais on convient assez généralement que le sel marin ne fournit par ces moyens qu'une très-petite quantité de son acide ; encore cet acide paroît-il être produit par la décomposition d'un peu de sel marin à base terreuse, dont le sel marin se trouve toujours embarrassé lorsqu'on ne l'a pas purifié d'une manière convenable. Cette purification se fait en dissolvant le sel marin dans de l'eau très-pure, & ajoutant quelques gouttes d'alkali marin qui dégagent la terre & la précipitent : on obtient ensuite par la cristallisation un sel parfaitement pur.

Les agens qu'on peut employer pour opérer la décomposition du sel marin, sont : 1.<sup>o</sup> les argilles, soit qu'elles agissent en raison de l'acide vitriolique qu'elles contiennent, soit qu'elles opèrent simplement comme matières terreuses, ainsi que le prétendent quelques Auteurs : 2.<sup>o</sup> l'acide vitriolique pur, qui versé sur du sel marin en dégage

### 384. *Introduction à l'Etude*

l'acide , & produit un esprit de sel fumant , à la manière de Glauber. L'opération se fait en mettant du sel marin dans une cornue tubulée , à laquelle on adapte un appareil de plusieurs ballons enfilés ; on verse par la tubulure de la cornue une partie de bon acide vitriolique sur deux de sel ; les vapeurs s'élèvent aussi-tôt & se condensent dans les ballons. La distillation peut aller assez long-temps sans le secours du feu ; & lorsqu'elle commence à cesser , on la facilite à l'aide de quelques charbons allumés qu'on met sous la cornue. Le résidu de cette distillation est un sel admirable de Glauber qu'on retrouve dans la cornue après que l'acide marin a été totalement distillé.

Les sels vitrioliques dont la base n'est pas l'alkali fixe , peuvent également décomposer le sel marin.

L'acide nitreux versé sur le sel marin , le décompose ; mais l'acide qui s'en dégage n'est pas pur , parceque l'esprit de nitre étant lui-même volatil ,  
il

il passe en vapeurs avec l'esprit de sel, & en fait une eau régale. On en peut dire autant des sels nitreux à base terreuse ou métallique distillés avec le sel marin. Enfin, les sels sédatifs décomposent le sel marin.

On donne dans le *Dictionnaire Encyclopédique* le résultat d'une expérience qui prouve la possibilité de convertir le sel marin en nitre. Elle consiste à prendre une certaine quantité de terre qu'on lave avec soin ; après l'avoir mise sous un hangar, on la lessive de temps en temps avec une dissolution de sel marin, & au bout de six mois on la trouve remplie de nitre, à ce que rapporte l'Auteur de cet article.

*Usages du Sel marin.*

Le sel marin est très-employé dans les assaisonnemens ; il facilite la digestion des alimens. Mêlé en grande quantité aux matières végétales ou animales, il arrête leur fermentation ; mais lorsqu'on l'ajoute à ces mêmes substances

en dose plus petite, il en accélère la putréfaction.

- Il paroît que dans le premier cas, lorsque le sel est en grande quantité, il s'interpose entre les pores des corps fermentescibles, & enveloppe chacune de leurs parties, comme chaque grain de raisin est enveloppé de sa pellicule, ou comme chacun des petits tas de miel qui composent une ruche, est renfermé dans son alvéole par la cire qui l'environne; or, on sait que dans cet état, ni le suc des raisins, ni le miel, ne peuvent subir de fermentation, quoiqu'ils y soient très-disposés, parcequ'ils sont en masses trop peu considérables: on en peut dire autant des parties végétales & animales qui sont séparées par le sel, & réduites presque à l'unité. Lorsqu'au contraire le sel est mêlé à des matières fermentescibles en petite quantité, il trouve assez d'humidité pour se dissoudre, & devenant un moyen d'union entre l'eau & les parties huileuses des corps, il facilite

leur combinaison, & les dispose à fermenter plus promptement.

E S P E C E VII.

Sel sulfureux de Stahl. *Sal sulfureum Stahl.*

Le sel sulfureux de Stahl est du nombre des sels neutres parfaits. Il est formé par l'union de l'acide sulfureux à l'alkali déliquescent. Il a une saveur amère & nauséabonde. Il se dissout dans environ seize fois son poids d'eau froide : l'eau bouillante n'en dissout guère davantage : ce sel fournit les plus beaux cristaux par l'évaporation insensible, & ils ressemblent parfaitement à ceux du tartre vitriolé.

*Origine du Sel sulfureux.*

Le sel sulfureux n'existe nulle part tout formé : il est toujours un produit de l'art qui le fait en unissant directement l'acide sulfureux volatil à l'alkali déliquescent.

*Analyse du Sel sulfureux.*

La formation artificielle du sel sulfureux fait connoître sa nature. Tous les acides versés sur ce sel le décomposent & en dégagent un acide très-pénétrant qu'on reconnoît sans peine à l'odeur pour l'acide sulfureux. Le sel sulfureux exposé à l'air, change de nature au bout de quelque temps, & devient tartre vitriolé. La même chose arrive, si on fait calciner ce sel dans un creuset.

Le sel sulfureux n'est point d'usage.

## E S P E C E V I I I.

Sel sulfureux marin. *Sal sulfureum marinum.*

Le sel sulfureux marin est un sel neutre parfait, formé par l'union de l'acide du soufre à l'alkali marin. La saveur de ce sel est fortement amère & très-désagréable. Il se dissout facilement dans l'eau froide ; l'eau bouillante en dissout beaucoup plus ; aussi

obtient-on les plus beaux crystaux de ce sel par le refroidissement de sa dissolution : ces crystaux sont parfaitement semblables à ceux du sel de Glauber.

*Origine du Sel sulfureux marin :*

On ne trouve nulle part ce sel formé par la nature. Il est toujours un produit de l'art qui le fait en combinant l'acide du soufre à l'alkali marin, ou en exposant des linges imbibés d'une lessive de sel de soude à la vapeur du soufre qui brûle.

*Analyse du Sel sulfureux marin :*

Les moyens qu'on emploie pour former ce sel font assez connoître sa nature. Tous les acides même les plus foibles sont en état de le décomposer, & d'en dégager l'acide sulfureux ; mais il faut que ce sel soit récemment fait, car il perd avec le temps son caractère sulfureux, & se convertit en un véritable sel de Glauber.

Le sel sulfureux minéral n'est d'aucun usage.

## G E N R E II.

Sels neutres parfaits demi-volatils.

Sels ammoniacaux. *Salia neutra perfecta semivolatilia*, seu *salia ammoniacalia*.

Les sels ammoniacaux sont formés par l'union des acides à l'alkali volatil. Ils ont tous une saveur piquante & urineuse; ce qui indique que la combinaison est moins intime dans ces sortes de sels que dans ceux qui ont pour base un alkali fixe. Tous les sels ammoniacaux se dissolvent en plus grande quantité dans l'eau chaude que dans l'eau froide, & crystallisent très-aisément par le refroidissement de leur dissolution. Exposés au feu il se volatilisent en entier avant de se fondre. Ils peuvent être décomposés par les alkalis fixes, la craie, la chaux, les matières métalliques & demi-métalliques & leurs chaux.



E S P E C E. I.

Sel ammoniacal vitriolique. *Sel ammoniacale vitriolicum.*

Le sel ammoniacal vitriolique est formé par l'union de l'acide vitriolique à l'alkali volatil. La saveur de ce sel est piquante & urineuse. Il se dissout dans deux parties d'eau froide ; l'eau bouillante en dissout une plus grande quantité : aussi ce sel crystallise-t-il par le refroidissement. Les crystaux qu'on obtient par ce moyen, sont des éguilles plus ou moins grosses ; mais lorsqu'ils sont produits par l'évaporation lente de leur dissolution, ils sont plus gros & ressemblent davantage aux crystaux de sel de Glauber. Le sel ammoniacal vitriolique exposé au feu se volatilise entièrement.

*Origine du Sel ammoniacal vitriolique.*

On ne connoît point encore ce sel formé par la nature : l'art le produit

## 392 *Introduction à l'Etude*

en combinant directement l'acide vitriolique à l'alkali volatil, ou en décomposant les autres sels ammoniacaux, par l'intermède de l'acide vitriolique, qui dégage leur acide & s'unit à l'alkali volatil qui lui servoit de base.

### *Analyse du Sel ammoniacal vitriolique.*

La formation artificielle du sel ammoniacal vitriolique fait connoître sa nature. Ce sel peut être décomposé par l'alkali fixe, la craie, la chaux, les métaux & leurs chaux, qui dégagent l'alkali volatil & s'unissent à l'acide. Peut-être pourroit-on enlever à ce sel son acide, à l'aide du phlogistique de l'acide nitreux ou des doubles affinités, comme on le pratique pour les sels vitrioliques à base d'alkali fixe; mais ces expériences n'ont point encore été tentées.

Le sel ammoniacal vitriolique n'est d'aucun usage,

E S P E C E II.

Sel ammoniacal nitreux. *Sal ammoniacale nitrosum.*

Le sel ammoniacal nitreux est formé par l'union de l'acide nitreux à l'alkali volatil. Ce sel a une saveur piquante & urineuse. Il se dissout assez bien dans l'eau froide, mais l'eau bouillante en dissout une beaucoup plus grande quantité : aussi obtient-on les plus beaux cristaux de ce sel par le refroidissement de sa dissolution. Ces cristaux sont de longues éguilles assez grosses appliquées les unes contre les autres.

Le sel ammoniacal nitreux exposé au feu dans un creuset, détonne de lui-même aussi-tôt que le fond du creuset commence à rougir ; & comme ce degré de feu est précisément celui qui est nécessaire pour le volatiliser, on ne peut pas encore savoir positivement si ce sel est volatil ; on le conjecture seulement, parcequ'il a toutes les pro-

priétés des sels ammoniacaux qui sont tous demi-volatils.

*Origine du Sel ammoniacal nitreux:*

On trouve le sel ammoniacal nitreux dans les lieux où se forme le salpêtre. L'art produit ce sel, en unissant directement l'acide nitreux à l'alkali volatil, ou en décomposant le sel ammoniac par l'intermède de l'acide nitreux.

*Analyse du Sel ammoniacal nitreux:*

La formation artificielle du sel ammoniacal nitreux fait connoître assez la nature des principes qui le forment. La décomposition de ce sel peut être produite par la seule action du feu, puisque mis dans un creuset rougi au feu, il détonne sans addition; parceque l'alkali qui sert de base à ce sel contenant un principe huileux, l'acide que la chaleur tend à volatiliser, entraîne avec lui le phlogistique de cette huile avec lequel il forme un soufre nitreux

qui s'embrase. L'alkali fixe, la craie, la chaux, les matières métalliques &c. leurs chaux, peuvent décomposer le sel ammoniacal nitreux, & enlever sa base alkaline. L'acide vitriolique versé sur ce sel en dégage l'acide, & forme avec sa base un sel ammoniacal vitriolique.

Le sel ammoniacal nitreux n'est point d'usage.

E S P E C E III.

Sel ammoniac. *Sal ammoniacum.*

WALL.

Le sel ammoniac est formé par l'acide marin combiné à l'alkali volatil. Il se dissout dans l'eau bouillante beaucoup plus facilement que dans l'eau froide, à laquelle il communique encore un degré de froid très-considérable, & qui va jusqu'à dix-huit ou vingt degrés au-dessous de sa température. Il crystallise très-facilement par le refroidissement de sa dissolution. Les crystaux de sel ammoniac sont de longues éguilles hérissées de petites pointes ; ils ref-

semblent assez à des barbes de plume, ou à des feuilles de fougère. Lorsque ces crystaux ont été formés à grande eau, ils ont une sorte de flexibilité, propriété qui est particulière à ce sel. Le sel ammoniac renfermé dans un vaisseau qu'on fait chauffer assez fortement, se volatilise en une masse composée de plusieurs filets. Ce sel mêlé à du nitre en fusion le fait détonner en partie. Il contracte une union très-intime avec le sublimé-corrosif, & forme avec lui une espèce de sel nommé *sel alembroth*.

### *Origine du Sel ammoniac:*

Le sel ammoniac se trouve naturel en Egypte & dans la Sibérie. Wallérius le nomme *sal ammoniacum in laminas sole concretum*, & dit qu'il se trouve en croûtes & en fleurs, dans du sable ou adhèrent au sol des étables. Les volcans en rejettent dans leur éruption une très-grande quantité, & Wallérius le nomme *sal ammoniacum in glebas igne*.

*subterraneo concretum* ; il est souvent teint de quelques couleurs , & mêlé à du soufre. On soupçonne que ce sel est formé par l'acide marin que le feu a dégagé de sa base , & qui s'est uni à l'alkali volatil des bitumes & des substances animales & végétales qui se trouvent brûlées par ces mêmes volcans. Indépendamment de la quantité de ce sel que la nature fournit , l'art le produit , soit en combinant directement l'acide marin à l'alkali volatil , soit en décomposant par cet alkali les sels formés par l'union de l'acide marin aux terres ou aux métaux. Enfin , on le retire de plusieurs matières , telles que les suies végétales & animales : c'est sur-tout en Egypte qu'on le fabrique. Messieurs Lemaire & Granger ont donné des Mémoires sur le travail qu'on fait dans ce pays. M. Hasselquist a aussi rapporté dans les Mémoires de Stokolm en 1751 , les détails de cette opération. Elle se fait avec les suies des fientes de vaches & de chameaux , dont on em-

plit les trois quarts d'un grand ballon de verre mince ; on place plusieurs de ces ballons sur un fourneau long , qu'on chauffe avec des mottes de fiente desséchée ; il s'élève d'abord des vapeurs très-épaisses & très-fétides. Au bout de quarante-cinq ou cinquante heures de feu , le sel ammoniac se sublime à la voûte du ballon : on a soin de fourrer de temps en temps une baguette dans le col pour empêcher qu'il ne se bouche, ce qui, en ôtant l'issue aux vapeurs, feroit casser le vaisseau. Lorsque la sublimation est faite , & que les ballons sont refroidis, on les casse & on en tire le sel en pains plus ou moins gros , & toujours noircis par les fuliginosités qui montent lors de la sublimation. On peut purifier ces pains, soit en les sublimant de nouveau , soit en les dissolvant dans l'eau pour en obtenir des cristaux.

Il paroît que la fiente des chameaux n'est pas d'une nécessité absolue pour la fabrique du sel ammoniac ; car



M. Baromé, qui vient d'établir une manufacture de ce sel, emploie pour le faire la suie de toutes sortes de matières. Quoiqu'on retire le sel ammoniac de la suie, il n'est pas bien décidé qu'il y soit contenu. M. Macquer dit qu'il est possible que l'acide marin soit uni dans la suie à un alkali fixe; mais qu'en étant dégagé par la violence du feu, il s'unit à l'alkali volatil, que chacun fait être un des produits de la suie distillée, & forme avec lui un sel ammoniac. Cette théorie, quoique hasardée, comme le dit cet illustre Chymiste, peut pourtant être confirmée par ce qui arrive aux plantes maritimes, qui contiennent toutes une prodigieuse quantité de sel marin, & ne fournissent plus que son alkali après leur combustion. Il y a toute apparence que le feu a donné des ailes à l'acide & l'a volatilisé.

*Analyse du Sel ammoniac.*

La composition artificielle du sel ammoniac suffit pour faire connoître quels

sont les principes qui le constituent. Sa décomposition prouve la même chose, & se fait en dégageant son acide par un acide plus fort, ou bien en dégageant l'alkali volatil, & offrant à l'acide un corps avec lequel il ait plus d'affinité.

1.<sup>o</sup> Si on met du sel ammoniac dans une cornue tubulée, à laquelle on ait ajusté plusieurs ballons enfilés, & qu'on verse sur deux parties de ce sel une partie d'acide vitriolique, on voit s'élever des vapeurs d'acide marin, qui vont se condenser dans les ballons en un véritable esprit de sel. On peut, en aidant la distillation sur la fin avec quelques charbons allumés, retirer tout l'acide marin, qui étoit contenu dans le sel ammoniac: ce qui reste dans la cornue est un sel ammoniacal vitriolique, qu'on peut faire sublimer au col de la cornue: en poussant davantage le feu.

2.<sup>o</sup> Au lieu d'acide vitriolique pur, on peut employer cet acide engagé dans une base terreuse ou métallique: on

on mêle alors le sel vitriolique & le sel ammoniac par égales portions dans une cornue qu'on place dans un fourneau de reverbère ; on ajuste deux ballons enfilés, & on distille en augmentant le feu par degrés : on obtient dans les ballons de l'acide marin, comme dans le premier cas, & on retrouve dans la cornue le sel ammoniacal vitriolique, mêlé à la terre ou au métal qui ser voit de base à l'acide vitriolique : on peut l'en séparer, en dissolvant ce résidu dans l'eau bouillante, filtrant la liqueur & la faisant crySTALLISER. La sublimation ne suffit pas dans ce cas pour purifier le sel ammoniacal vitriolique, parceque ce sel entraîne toujours avec lui une portion des matières qui s'y trouvent mêlées.

3.<sup>o</sup> L'acide nitreux versé sur du sel ammoniac dans une cornue tubulée, le décompose de même que l'acide vitriolique. Les vapeurs qui s'élèvent dans cette opération ne sont pas de l'acide marin pur, mais de l'eau régale.

La matière qui reste dans la cornue est un sel ammoniacal nitreux, qu'il faut bien se garder de trop chauffer, car il détonneroit, & briseroit les vaisseaux au grand danger de l'Artiste.

On pourroit employer au lieu d'acide nitreux pur, un nitre à base calcaire ou métallique, & le distiller avec le sel ammoniac; mais il faudroit user de grandes précautions sur la fin pour empêcher la détonnation. On obtiendrait également de l'eau régale par ce procédé, & le sel ammoniacal nitreux se trouveroit dans le résidu uni à la substance qui seroit de base à l'acide nitreux, dont on pourroit le séparer par la dissolution, la filtration & la cristallisation.

Indépendamment des moyens que la Chymie emploie pour enlever l'acide du sel ammoniac, elle en fournit d'autres pour séparer l'alkali volatil qui lui sert de base. Les corps qui peuvent servir d'intermède à cette décomposition sont l'alkali fixe, la craie, la chaux,

plusieurs substances métalliques & leurs chaux : toutes ces matières, quoique propres à dégager l'alkali volatil du sel ammoniac, ne le font cependant pas toutes de la même manière, & il y a des différences très-marquées dans les produits qu'on retire par chacun de ces intermèdes.

1.<sup>o</sup> Lorsqu'on se sert d'alkali fixe, on en mêle deux parties & même plus, avec une de sel ammoniac : on les met dans une cornue de grès qu'on place dans un fourneau de reverbère ; on adapte à la cornue un ballon qu'on lutte exactement ; il s'élève des vapeurs urineuses qui commençoient à se dégager, même pendant le mélange : en poussant le feu par degrés on en obtient de l'esprit alkali volatil, en proportion de l'humidité contenue dans les sels, & de plus une grande quantité de sel alkali volatil concret : le poids de ce sel est presque égal à celui du sel ammoniac qu'on a employé ; ce qui prouve que l'alkali volatil donne des

ailes à l'alkali fixe, & en enlève avec lui une quantité assez considérable, dont il est difficile de le dépouiller, comme l'a prouvé M. Duhamel. Ce qui reste dans la cornue est un sel formé par l'union de l'acide marin à l'alkali fixe, c'est-à-dire, un sel fébrifuge de Sylvius, si on a employé l'alkali fixe déliquescent, & un vrai sel marin, si on s'est servi d'alkali marin.

2.<sup>o</sup> Trois parties de craie mêlées avec une partie de sel ammoniac n'en dégagent pas aussi-tôt l'alkali volatil; mais si on met ce mélange en distillation, il passe une très-petite quantité d'esprit volatil, & beaucoup de sel volatil concret très-pesant, très-difficile à dissoudre dans l'eau, & qui n'a qu'une odeur foible. Ce sel a emporté avec lui beaucoup de la matière qui a servi à le dégager. On trouve dans la cornue après cette opération, un sel marin à base calcaire, qui peut à son tour être décomposé par l'alkali volatil, conformément à l'ordre reconnu des affinités chimiques.

On se sert plus commodément pour ces distillations de sel ammoniac, d'une cucurbite de terre qu'on couvre d'un chapiteau de verre, au bec duquel on ajuste un récipient, parceque l'esprit volatil passant dans ce récipient, le sel se sublime dans le chapiteau, d'où on le retire avec beaucoup de facilité.

3.<sup>o</sup> Si on mêle trois parties de chaux éteinte à l'air & une de sel ammoniac, il s'en élève aussi-tôt des vapeurs très-pénétrantes d'alkali volatil. Le mélange mis en distillation dans une cornue de grès au fourneau de reverbère, donne un esprit alkali volatil très-pénétrant. Cet alkali ne fait point effervescence avec les acides ; il ne précipite point les dissolutions des sels à base terreuse, & ne forme point de *coagulum* avec l'esprit de vin.

Lorsqu'on emploie la chaux sortant du four, & un sel ammoniac bien desséché, on ne retire, d'une quantité considérable de mélange, que quelques gouttes d'un alkali volatil très-pénétrant.

Il paroît que la chaux agit dans la décomposition du sel ammoniac , non-seulement comme terre calcaire , mais encore en vertu de sa partie saline , qui , étant de la nature des alkalis fixes , donne lieu au dégagement des vapeurs qui se font sentir à l'instant du mélange. Quelques Chymistes ont cru que l'alkali volatil entraînoit avec lui , dans cette opération , une portion du principe igné de la chaux qui lui donnoit son odeur pénétrante , & que son état de liquidité étoit dû à une certaine quantité d'eau que lui fournissoit cette terre. Il paroît que non-seulement la chaux dégage l'alkali volatil de l'acide auquel il étoit uni dans le sel ammoniac , mais qu'elle attaque l'alkali lui-même , & lui enlève une matière grasse qui lui est essentielle , & à laquelle peut-être il est redevable de la propriété qu'il a de crySTALLISER. L'existence de cette matière grasse est prouvée , non-seulement par la détonnation du sel ammoniacal nitreux qui s'opère sans addition , mais



encore par les expériences de M. Duhamel. Ce Savant ayant distillé plusieurs fois de l'alkali volatil sur de la chaux, s'apperçut qu'une portion de son sel se décomposoit à chaque distillation; & ce ne fut qu'après avoir impregné sa chaux d'autant de matiere grasse qu'elle pouvoit en prendre, qu'il parvint à retirer, par son intermède, un alkali volatil concret.

La chaux sur laquelle M. Duhamel avoit distillé plusieurs fois de l'alkali volatil, étant mise sur une pelle & exposée au feu, exhaloit une forte odeur de graisse brûlée.

En réduisant à l'état de craie, par des lavages répétés, une quantité donnée de chaux, & distillant le sel ammoniac avec cette craie, le même Chymiste parvint à en tirer un sel volatil sous forme concrète.

Enfin, si on distille quatre parties de sel ammoniac avec une de chaux seulement, on obtient de l'alkali volatil sous forme fluide, & un peu d'alkali volatil

concret. Cet alkali fait effervescence avec les acides ; il décompose les sels neutres à base terreuse , & se coagule avec l'esprit-de-vin , de même que les alkalis volatils bien purs.

Le résidu du sel ammoniac décomposé par la chaux, est un sel marin calcaire, qu'on nomme *sel ammoniac fixe*, tant qu'il est parfaitement sec ; mais aussi-tôt qu'il est exposé à l'air , il en attire l'humidité , & prend alors le nom d'*huile de chaux*. Le sel ammoniac fixe calciné devient lumineux, & forme une espèce de phosphore pierreux, connu sous le nom de *phosphore de Homberg*.

M. Duhamel prétend prouver encore que la chaux a absorbé une partie grasse de l'alkali volatil , parcequ'en jettant de l'acide vitriolique sur le sel ammoniac fixe, il s'en élève avec l'acide marin une odeur très-pénétrante d'acide sulfureux.

M. Macbride prétend que la propriété particulière de l'alkali volatil, tiré par la chaux, dépend de ce que la chaux

a enlevé à cet alkali son air fixe, & qu'en lui restituant, on le met dans l'état des alkalis volatils tirés par les autres intermèdes. Le moyen qu'il donne pour cela, est de saturer un acide avec un alkali, dans un flacon qui soit fermé par un tube de verre dont un bout plonge dans un autre flacon, dans lequel on a mis de l'alkali volatil tiré du sel ammoniac par la chaux. L'air, qui se dégage pendant l'effervescence, va se combiner avec cet alkali volatil, & lui rend la propriété de faire effervescence avec les acides, & de se coaguler avec l'esprit-de-vin.

Quelque vraies que soient les expériences de M. Macbride, il faudroit pour conclure d'après lui, être certain qu'il ne s'élève que de l'air dans l'union d'un acide avec un alkali, & qu'aucune portion de matière grasse ne se détache dans le temps de la combinaison : or, rien ne paroît moins prouvé. Il est constant d'ailleurs que l'air qui se dégage dans l'effervescence

d'un acide avec un alkali, n'est plus dans l'état de l'air fixe qui étoit contenu dans chacun de ces deux corps; mais qu'il est devenu air élastique parfaitement semblable à celui de l'atmosphère, qu'on peut faire entrer à volonté dans l'alkali volatil tiré du sel ammoniac par la chaux, sans lui donner les propriétés des autres alkalis volatils.

4.<sup>o</sup> Un mélange de deux parties de limaille de fer contre une de sel ammoniac, mis en distillation dans une cornue chauffée par degrés, donne une petite quantité d'alkali volatil fluide qui fait effervescence avec les acides. Il se dégage pendant l'opération une quantité considérable d'air qui fait souvent briser les vaisseaux, lorsqu'on n'a pas soin de lui donner une issue. Cette décomposition ne peut être poussée bien loin, parceque la chaleur nécessaire pour l'achever, suffit pour volatiliser le sel ammoniac qui entraîne avec lui une portion du métal. Le fer

n'est pas la seule matière métallique qui puisse décomposer le sel ammoniac; toutes ont cette propriété.

Les chaux des métaux décomposent le sel ammoniac beaucoup plus efficacement que les matières métalliques elles-mêmes; & les produits de ces décompositions sont semblables à ceux qu'on retire du sel ammoniac décomposé par la chaux pierreuse.

Les résidus sont différens suivant la nature des métaux qu'on a employés.

Toutes les décompositions du sel ammoniac opérées par la craie & les matières métalliques sont contraires à l'ordre des affinités, & paroissent tenir à une autre cause. Le sel ammoniac ne doit sa volatilité qu'à l'alkali qui lui sert de base, puisque si cet alkali étoit fixe le sel ne pourroit se volatiliser; or, dans la sublimation du sel ammoniac, on doit considérer l'alkali volatil comme emportant avec lui l'acide marin, qui le suit tant qu'il ne rencontre aucun corps auquel il puisse adhérer; mais

#### 412 *Introduction à l'Etude*

aussi-tôt qu'il trouve une base à laquelle il peut s'unir, il s'y-engage, quoiqu'il ait avec elle une affinité moindre qu'avec l'alkali volatil.

#### *Usages du Sel ammoniac.*

Le sel ammoniac est employé en Médecine comme un très-bon fondant & un excellent fébrifuge : il divise les humeurs épaisses qui embarrassent les vaisseaux capillaires, & qui occasionnent les fièvres lentes. On le prescrit dans les opiates à la dose de quelques grains ou d'un scrupule, mêlé aux extraits des plantes amères, comme ceux d'absinthe, d'aunée, de petite centaurée. Quelques Praticiens l'ordonnent avec le sel fixe de genêt ou d'autres plantes ; mais ces sels, étant pour la plupart des alkalis fixes, dégagent l'alkali volatil du sel ammoniac, & forment avec son acide un sel fébrifuge de Sylvius : c'est ce qui a engagé plusieurs bons Médecins à faire prendre le sel ammoniac & les sels fixes des plantes,

chacun séparément dans une quantité donnée d'extrait.

L'alkali volatil dégagé par la chaux est d'usage dans la syncope pour exciter le cours des esprits animaux. Avec cet alkali, & quelques gouttes d'une dissolution d'huile de succin dans l'esprit-de-vin, on fait une liqueur à laquelle on a donné le nom d'*eau de luce*. C'est une espèce de savon formé par l'alkali volatil uni à l'huile de succin. Lorsqu'elle est bien préparée elle doit être laiteuse. Les Chymistes ont essayé, pour lui conserver cette couleur, d'ajouter quelque corps qui pût faciliter la suspension de l'huile de succin dans l'alkali volatil. Quelques grains de savon blanc dissous dans l'esprit-de-vin, produisent cet effet. M. Rouelle le jeune prétend que cette addition est inutile, & que l'eau de luce reste laiteuse, lorsqu'on a employé pour la faire un alkali volatil tiré par la chaux qui ne fasse absolument aucune effervescence avec les acides. On se sert de cette pré-

#### 414 *Introduction à l'Etude*

paration comme de l'alkali volatil lui-même.

Le sel ammoniac entre dans la foudre des métaux.

Les Chaudronniers se servent de ce sel pour étamer le cuivre ; il a la propriété d'en ronger la surface & de la décaper, & le peu de matière grasse qu'il contient, suffit pour empêcher que la surface de ce métal ne se calcine, & fait adhérer plus fortement l'étamage.

#### *G E N R E III.*

Sels neutres imparfaits à base terreuse. *Salia neutra imperfecta terrea.*

Tous les sels de ce genre sont formés par l'union d'un acide à une terre. Ils n'ont pas tous à beaucoup près la même saveur, ni le même degré de dissolubilité dans l'eau. Ils peuvent être décomposés par les alkalis soit fixes, soit volatils.



E S P E C E I.

Vitriol de sable. *Vitriolum arenosum*.

Ce sel suivant M. Baumé, ne diffère point de l'alun.

On le fait par art en dissolvant dans l'acide vitriolique la terre précipitée de la liqueur des cailloux.

E S P E C E II.

Nitre de sable. *Nitrum arenosum*.

Le nitre de sable est encore, suivant M. Baumé, semblable au nitre d'argille. Il est très-déliquescant.

On ne trouve ce sel en aucun endroit formé par la nature. L'art le produit en dissolvant dans l'acide nitreux la terre précipitée de la liqueur des cailloux.

E S P E C E III.

Sel marin de sable. *Sal arenosum*.

Le sel de sable ressemble au sel d'ar-

#### 416 Introduction à l'Etude

gille. Il est également très-déliquescant.

On ne le trouve point formé par la nature : mais l'art le fait en dissolvant dans l'acide marin la terre précipitée de la liqueur des cailloux.

#### E S P E C E IV.

\* Vitriol de craie , Sélénite. *Vitriolum cretaceum. Selenites.*

Le vitriol de craie est de tous les sels terreux, celui qui a le moins de saveur & de dissolubilité. Tous les échantillons de ce sel chauffés jusqu'à un certain point deviennent phosphoriques. Si on les expose au feu, ils se calcinent sans prendre le caractère de chaux vive. Dans cet état ils forment le plâtre, qui étant mêlé avec l'eau prend corps, & peut se durcir considérablement. La sélénite poussée à un feu très-violent, peut fondre sans addition, comme l'a démontré M. d'Arcet.

*Origine du Vitriol de craie.*

Le vitriol de craie est de tous les sels, celui qui paroît sous le plus grand nombre de formes différentes. On le trouve crySTALLISÉ régulièrement en cubes, en rhombes, en triangles, en lames, en filets, quelquefois aussi il est en masses non crySTALLISÉES. Il est des échantillons de ce sel qui ont une très-grande pesanteur ; d'autres sont fort légers. Les variétés les plus connues de cette espèce, dont pour ainsi dire deux individus ne se ressemblent pas, sont

1.° La sélénite, *gypsum lamellis rhomboïdalibus, pellucidum*, WALL. *Natrum lapidosum, gypseo-spatosum, fusiforme, pellucidum*. LINN. On donne ce nom au vitriol de craie crySTALLISÉ en lames rhomboïdales transparentes, & formant des masses légères.

2.° Le gyps, *Gypsum lamellis inordinatis, pellucidum*, WALL. lorsqu'il est formé de lames demi-transparentes, le plus communément coniques. Tel est celui qu'on trouve à Montmartre.

## 418 Introduction à l'Etude

3.° Le gyps soyeux ou gyps strié, *Gypsum filamentis parallelis compositum*, WALL. *Stirium pellucidum*, *fixum*, *fibrosum*, LINN. lorsqu'il est composé d'un assemblage de filets blancs, semblables à ceux de l'amiante. On le trouve dans tous les Cabinets d'Histoire Naturelle, sous le nom de gyps soyeux de la Chine.

4.° Le spath vitreux, *Spatum solidum*; *plus minusve pellucidum*, *particulis non distinguibilibus*, WALL. *Muria lapidosa*, *subquartzosa*, *aggregata*, *sparsa*, *fixa*, LINN. lorsqu'il est en masse transparente & sans figure déterminée.

5.° Le spath fusible, *Spatum rhomboïdale*, *opacum*, WALL. *Natrum lapidosum*; *gypseo-spatosum*, *decaedrum*, *rhombeum*, LINN. lorsqu'il est cristallisé en cubes & qu'il est fort pesant. Il s'en trouve cependant de très-pesant, & qui est formé de filets; tel est celui qu'on connoît sous le nom de pierre phosphorique de Bologne, *Gypsum irregulare*, *lamellosum*, *calcinatum*, *in tenebris lucens*,

WALL. *Muria lapidosa, spatosa, aggregata, lenticularis, centricoso-fissilis, subeffervescens*. LINN.

6.° L'Albâtre gypseux, ou Alabastrite, *Gypsum particulis minimis, punctatis, nitens, polituram-admittens*, WALL. *Stirium diaphanum, solubile, fibrosum*, LINN. lorsqu'il est en masses composées de petites particules fines & brillantes, & qu'il est assez dur pour prendre le poli.

7.° La pierre à plâtre, *Gypsum particulis parallelepipedis & globosis concretum*, WALL. lorsque ce sel forme des masses composées de petites écailles & de parcelles de craie.

Les pierres à plâtre font effervescence avec les acides, en raison de cet excès de craie qu'elles contiennent. On peut les regarder comme les échantillons les moins purs du vitriol de craie. On rencontre souvent ces sels teints de quelques-unes des couleurs des pierres précieuses. Dans cet état, on leur donne le nom des pierres auxquelles elles

ressemblent, en y ajoutant l'épithète de *fausses* : mais cette dénomination est mauvaise, parcequ'elle confond ces substances avec les quartz & crystaux colorés, qui sont d'une nature toute différente.

Il n'est pas rare de trouver des échantillons de vitriol de craie qui ont une odeur très-fétide : ils sont désignés, dans la nouvelle *Minéralogie* attribuée à M. Cronstedt, sous le nom de *pierres hépatiques* : ce Naturaliste réservant celui de *pierres porc* aux échantillons de pierres calcaires qui ont également une mauvaise odeur.

L'art forme la sélénite, en combinant directement l'acide vitriolique à la craie, ou en décomposant par l'intermède d'une terre calcaire le sel ammoniacal vitriolique ou les vitriols métalliques. On tire de la sélénite des eaux de la mer dans la fabrique du sel marin. Les eaux des puits de Paris en contiennent en quantité.

*Analyse du Vitriol de craie.*

Le vitriol de craie a , comme toute substance saline , de la saveur , de la dissolubilité dans l'eau , & la propriété de cristalliser. Comme sel vitriolique il peut être décomposé par le phlogistique des charbons avec lequel il forme un foie de soufre à base calcaire ; & comme sel vitriolique terreux, il peut encore être décomposé par les alkalis fixes & volatils qui en dégagent la terre calcaire , & forment avec son acide un tartre vitriolé , un sel de Glauber , ou un sel ammoniacal vitriolique , suivant la nature de l'alkali qui a opéré la décomposition. Enfin , la facilité avec laquelle l'art peut produire un vitriol semblable par la combinaison de la craie à l'acide vitriolique , achève de démontrer la nature du vitriol de craie.

*Usages du Vitriol de craie.*

On calcine tous les échantillons de ce sel , pour en former le plâtre. On em.

ploie sur-tout à cet usage l'espèce qu'on connoît sous le nom de *pierre à plâtre*, & qui contient un excès de craie.

Dans la calcination, la partie vraiment saline de la pierre à plâtre perd son eau de crySTALLISATION, tandis que la portion crétacée se réduit à l'état de chaux vive. Lorsqu'on mêle le plâtre à l'eau en certaine proportion, le mélange s'échauffe, bouillonne, répand une odeur de foie de soufre, & finit par former une pâte dure. Les phénomènes de la chaleur & du bouillonnement dépendent de la portion de chaux vive qui se mêle à l'eau avec rapidité. L'odeur est produite par un vrai foie de soufre calcaire qui s'est formé pendant la calcination, aux dépens de l'acide vitriolique de la sélénite, du phlogistique des matières employées pour la calciner, & d'une portion de chaux vive. La partie saline qui n'a point été décomposée, & qui a seulement perdu son eau de crySTALLISATION, la reprend, & crySTALLISANT subitement au



milieu de la chaux, elle forme avec elle un mortier à peu près semblable à celui qu'on fait en mêlant le sable à cette même chaux.

On peut séparer la partie saline d'avec la partie calcaire, en dissolvant le plâtre dans une suffisante quantité d'eau.

On fait depuis long-temps que la pierre de Bologne acquiert par la calcination une qualité phosphorique. Ce corps, que M. Margraff a rangé avec raison parmi les spaths pesans ou fusibles, ne jouit pas seul de cette propriété: elle lui est commune avec tous les sels séléniteux. Tous étant réduits en poudre & mêlés à une certaine quantité de mucilage, pour en former des gâteaux minces qu'on fait calciner à travers les charbons, forment un véritable phosphore.

Il paroît que la calcination de ces sélénites formant d'une part un vrai soufre, par la combinaison de l'acide vitriolique au phlogistique des charbons, &

## 424 *Introduction à l'Etude*

de l'autre, mettant la craie dans l'état de chaux, il en résulte un foie de soufre à base calcaire, qui, s'embrasant dans l'instant même de sa formation, continue de brûler très - lentement, & assez pour être lumineux dans l'obscurité, quoiqu'il ne puisse brûler aucun des corps qu'il touche. Cette lumière, qui va toujours en s'affoiblissant, peut cependant durer plusieurs jours ; & lorsqu'elle paroît cesser entièrement, on peut la reproduire, en exposant le phosphore à une nouvelle lumière, ou en le mettant sur un poêle qui ne produise point assez de chaleur pour être lumineux. Si on considère que cet éclat du phosphore acquiert une nouvelle vigueur toutes les fois que la chaleur le pénètre, on sera convaincu que sa lumière dépend de la combustion réelle & continuée d'un soufre dont la chaleur favorise l'inflammation, qui ne devient très-lente que par la surabondance de matière non combustible dont ce soufre est environné.

On

On fait contre cette théorie deux objections. La première, c'est que suivant les expériences que M. Dufay a rapportées à l'Académie des Sciences, en 1730, les fêlénites ne sont pas les seules substances minérales propres à former un phosphore ; la plupart des pierres calcaires étant capables de prendre par la calcination un éclat semblable.

Mais d'abord il est à observer que M. Dufay n'avoit pas fait l'examen chimique des pierres qu'il a employées ; & quoique calcaires pour la plus grande partie, elles pouvoient contenir une portion d'acide vitriolique. De plus, il est probable que ces pierres calcaires ne sont que pénétrées d'un feu étranger, dont la dissipation & la scintillation peuvent produire quelque temps de la lumière dans l'obscurité. D'ailleurs M. Dufay avoue que les pierres calcaires ont besoin d'une plus longue calcination, dont l'effet est sans doute de les abreuver d'une plus grande quantité de la

matière de la lumière. On pourroit apporter en preuve une expérience familière aux Physiciens ; c'est qu'un corps blanc, du papier par exemple, exposé quelque temps à la lumière du soleil, & porté aussi-tôt dans une obscurité parfaite, y paroît lumineux ; mais ces qualités phosphoriques ne sont que momentanées, & se dissipent bientôt.

L'autre objection, c'est que le phosphore préparé avec les sels séléniteux peut produire sa lumière sans le concours de l'air, étant renfermé dans un flacon bouché hermétiquement, ou même plongé dans l'eau ou dans quelque autre liquide.

Pour répondre à cette objection, il faut faire attention que la quantité de soufre qui brûle à la fois dans ce phosphore, étant excessivement petite, la combustion peut avoir lieu sans le concours de l'air, ou n'en exiger du moins qu'une quantité infiniment petite. A l'égard de la propriété de luire dans l'eau, elle est commune à tous les phos-

phores qui continuent d'y brûler & de s'y consumer d'une manière très-lente, & qui va toujours en s'affoiblissant, jusqu'à ce qu'enfin ils s'éteignent entièrement. Il est vrai qu'on ne reconnoît pas au soufre la propriété de brûler dans l'eau ; mais peut-être que réduit à l'état d'un foie de soufre à base calcaire, & brûlant très-lentement, il présenteroit ce même phénomène.

# E S P E C E V.

Nitre de craie. *Nitrum cretaceum.*

Le nitre de craie est un sel formé par l'union de l'acide nitreux à la terre calcaire. Sa saveur est amère. Il se dissout très-facilement dans l'eau. Exposé à l'air il en attire puissamment l'humidité ; en sorte qu'il est difficile d'obtenir ce sel cristallisé. Cependant, en laissant refroidir sa dissolution suffisamment rapprochée, on en obtient des cristaux en forme d'éguilles.

*Origine du Nitre de craie.*

On rencontre assez communément l'acide nitreux uni à la craie, dans la lessive qu'on fait des platras pour en tirer le salpêtre. Il reste dans les eaux-mères du nitre qu'on prépare à l'Arse-nal. L'art le produit, en combinant l'acide nitreux à la craie, ou en dé-composant, par l'intermède d'une terre calcaire, le sel ammoniacal nitreux, & les sels nitreux à base métallique.

*Analyse du Nitre de craie.*

L'acide vitriolique pur, versé sur du nitre de craie, en dégage l'acide & s'unit à sa base, avec laquelle il forme une sélénite.

Les vitriols à base métallique mis en distillation avec le nitre calcaire, en dégagent l'acide nitreux. On trouve dans la cornue, après l'opération, la sélénite mêlée à la base des sels vitrio-liqués qu'on a employés.

Les alkalis fixes ou volatils versés

dans une dissolution de nitre de craie, précipitent la terre qui servoit de base à l'acide nitreux, & s'unissant à cet acide, ils forment un vrai salpêtre, un nitre cubique, ou un sel ammoniacal nitreux, suivant la nature de l'alkali qui a opéré la précipitation.

La terre précipitée forme une sorte de magnésie.

Le nitre calcaire calciné forme encore une autre espèce de magnésie, qui paroît lumineuse dans l'obscurité, lorsqu'elle est récemment préparée: c'est le phosphore de *Balduinus*.

Le nitre de craie n'est point d'usage, à moins qu'il ne soit calciné, & dans l'état de magnésie. La terre qu'on en précipite par les alkalis est une sorte de magnésie plus pure.

#### E S P È C E V I.

Sel marin de craie. *Sal cretaceum*.

Le sel de craie est formé par l'union de l'acide marin à la terre calcaire; ce sel a une saveur très-amère. Il est

## 430 *Introduction à l'Etude*

très-dissoluble dans l'eau, & sa dissolution suffisamment rapprochée, fournit, par le refroidissement, des cristaux en aiguilles qui attirent l'humidité de l'air.

### *Origine du Sel marin de craie.*

On trouve le sel de craie en dissolution dans les eaux de la mer & des fontaines salées. L'art le produit en saturant l'acide marin avec la craie, ou en décomposant, par l'intermède d'une terre calcaire, le sel ammoniac, ou les sels marins à base métallique.

### *Analyse du Sel marin de craie.*

L'acide vitriolique pur, ou engagé dans quelque base métallique, décompose le sel de craie, en dégage l'acide & forme avec sa base une sélénite.

L'acide nitreux décompose aussi ce sel; mais les vapeurs qui s'en dégagent ne sont pas un acide marin pur, mais de l'eau régale.

Les alkalis fixes & volatils séparent



la terre calcaire de l'acide marin auquel elle est unie, & forment avec cet acide un sel fébrifuge, un sel marin, ou un sel ammoniac, suivant la nature de l'alkali qu'on a employé pour décomposer le sel de craie.

La terre qui a été précipitée par ce moyen, forme une sorte de magnésie. Le sel de craie calciné forme une autre magnésie, qui paroît lumineuse lorsqu'elle est récemment préparée : c'est le phosphore d'*Homborg*.

On peut employer la magnésie du sel comme la magnésie du nitre.

E S P E C E VII.

Vitriol d'argille, alun. *Alumen*.

L'alun est formé par l'union de l'acide vitriolique à la terre argilleuse. La faveur de ce sel est stiptique. Il se dissout assez facilement dans l'eau froide ; mais l'eau chaude en tient une beaucoup plus grande quantité en dissolution : aussi ce sel crySTALLISE-t-il facilement par le simple refroidissement.

## 432 Introduction à l'Etude

Les crysiaux qu'on en obtient varient singulièrement pour leur forme; ils sont quelquefois formés de deux pyramides tétraèdres jointes base à base; souvent ils forment des hexaèdres dont la surface est une espèce de triangle, & dont les trois angles sont coupés.

L'alun exposé à l'air s'effleurit & tombe en poussière. Mis au feu il se liquéfie à la faveur de l'eau de sa cristallisation; mais à mesure que cette humidité s'évapore, le sel se sèche & se boursoffle: on le nomme en cet état *alun calciné*.

### Origine de l'Alun.

On trouve l'alun naturel en masses & sous la forme de stalactites, *Alumen nativum*, WALL. *Alumen nudum*, LINN. Certaines ardoises & plusieurs pyrites en contiennent, *Alumen lapide fissili mineralisatum*, WALL. *Alumen schisti*, LINN.

On retire de l'alun d'une espèce de terre grise, *terra aluminaris*, WALL. qui

qui se trouve aux environs de Naples, dans un lieu appelé la *Solfatare*. On met cette terre avec de l'eau dans six chaudières de plomb, placées sur deux lignes : la chaleur du sol dans lequel les chaudières sont enfoncées, suffit pour hâter la dissolution du sel. A mesure qu'il commence à crySTALLISER, on puise la dissolution claire, on la porte dans une autre chaudière plus grande, placée entre les six petites : cette chaudière est également chauffée par la chaleur du terrain, & l'alun s'y crySTALLISE lentement & en grandes masses. On l'envoie dans le commerce sous le nom d'*alun de roche*.

On trouve à *Civita-Vecchia* près de Rome, dans un endroit appelé l'*Aluminière della tolfa*, une pierre grise un peu rougeâtre, semblable à une argille desséchée. *Alumen lapide calcareo mineralisatum*. WALL. *Alumen marmoris*. LINN. On fait calciner cette pierre, puis on la met en tas sur un terrain environné de fossés : on jette de l'eau

#### 434 *Introduction à l'Etude*

dessus, & au bout de quelque temps elle s'effleurit. On continue de l'arroser avec la même eau dont on s'est déjà servi, & qui s'est ramassée dans les fossés qui bordent le terrain : chaque lessive dissout une nouvelle quantité de matière saline, & lorsque l'eau en est bien chargée, on la fait évaporer & on la met à cristalliser dans des grandes caisses de bois. Cet alun est en petites masses irrégulières, couvertes d'une efflorescence rougeâtre. On le connoît sous le nom d'*alun de Rome*.

L'art produit encore l'alun, en versant de l'acide vitriolique dans une dissolution de terre glaise dans l'eau, & faisant évaporer la liqueur.

#### *Analyse de l'Alun.*

L'alun comme tous les sels vitrioliques peut être décomposé par le phlogistique : il résulte de cette décomposition une espèce de soufre nommé *pyrophore d'Homberg*. Pour le faire, on prend trois parties d'alun & une partie de sucre; on les fait calciner, & après

les avoir réduits en poudre, on en emplit la moitié d'une phiole de verre; on la place dans un creuset plein de sable qu'on fait rougir : il s'exhale de la phiole des vapeurs sulfureuses; & enfin lorsqu'on voit paroître une flamme bleue qui en remplit tout le col, on la retire du feu & on la bouche exactement. Ce pyrophore fut d'abord découvert par M. Homberg : ce Chymiste travaillant sur la matière fécale humaine pour en tirer une huile blanche & inodore qui devoit fixer le mercure en argent, s'aperçut que le feu prenoit au résidu d'une distillation de matière fécale & d'alun. On a été long-temps depuis dans l'opinion que la seule matière fécale étoit en état de produire ce phénomène singulier; mais M. Lejay de Suvigny a donné la vraie théorie de cette opération; & tous les Chymistes savent à présent que ce n'est qu'un soufre formé par l'union de l'acide vitriolique de l'alun avec la matière inflammable, & qu'il est pos-

#### 436. *Introduction à l'Etude*

sible de faire le pyrophore avec toute matière végétale ou animale abondante en phlogistique, & même avec tout autre sel vitriolique que l'alun.

Dans cette opération le soufre qui se forme ne trouvant pas de dissolvant propre à le mettre dans l'état de foie de soufre, reste tel qu'il est, & conséquemment plus disposé à s'enflammer. Le phénomène de l'inflammation qui se produit lorsque cette matière est exposée à l'air, dépend de ce qu'une portion d'acide vitriolique n'ayant pas eu le temps de se combiner avec le phlogistique, reste dans l'état d'une huile de vitriol concentrée, & attire l'humidité de l'air avec une telle force, qu'il en résulte beaucoup de chaleur & l'embrasement du soufre.

Lorsqu'on veut hâter l'embrasement du pyrophore, il suffit de l'exposer à un air humide ou sur un papier mouillé.

Si on laisse le pyrophore dans une bouteille mal fermée, comme il reprend peu-à-peu de l'humidité, il ne s'excite point de chaleur ; & quand il

s'en est ainsi saturé lentement, il a perdu la propriété de s'enflammer; mais on peut la lui rendre en le calcinant de nouveau.

Il faut prendre garde dans l'opération du pyrophore, de pousser trop loin la calcination, parceque la portion d'acide surabondant qui est la cause de l'inflammabilité, venant à se dissiper, on ne peut plus avoir de pyrophore.

L'alun peut être décomposé par les alkalis fixes ou volatils qui s'unissent à son acide, & en dégagent une terre blanche parfaitement semblable à celle qu'on retire par le même moyen d'une dissolution d'argille. Cette terre d'alun retient avidement les dernières portions d'humidité: elle est ductile, se durcit en séchant, & est susceptible de prendre, par le frottement, un beau poli comme les argilles. Elle prend beaucoup de retraite lorsqu'on la chauffe; elle se fendille même lorsqu'on lui applique le feu trop brusquement. La terre de l'alun se charge avidement du phlogistique, & prend de la couleur. Elle

se dissout dans les acides avec effervescence, & beaucoup plus facilement lorsqu'elle est récemment précipitée, que lorsqu'elle a été desséchée.

L'alun peut lui-même dissoudre sa terre, & s'en saturer au point de devenir une véritable argille ; de même que l'argille peut passer à l'état d'alun, lorsqu'on lui ajoute un peu d'acide vitriolique. Pour faire cette argille artificielle, on prend une quantité donnée d'alun, on le fait dissoudre dans l'eau bouillante, & on jette dans la dissolution quatre fois autant de terre précipitée de l'alun bien lavée & encore humide, on aperçoit un mouvement d'effervescence ; on étend le tout d'eau, & on laisse quelque temps l'alun bouillir sur sa terre ; il perd peu-à-peu sa saveur, & lorsqu'elle est entièrement détruite ; on filtre la dissolution, & on obtient par l'évaporation des feuillets de véritable argille, comme l'a démontré M. Baumé.

M. Baron pensoit que la terre de l'alun étoit de la nature des terres métalliques. M. Macquer croit que ce sen-



timent n'est pas dénué de vraisemblance. Ce savant Chymiste regarde les argilles comme très-propres à former des terres métalliques par la facilité qu'elles ont à s'unir en phlogistique.

*Usages de l'Alun.*

L'alun est employé en Médecine. Il entre dans les décoctions & les collyres astringens ; on le prescrit aussi à l'intérieur , depuis quelques grains jusqu'à un scrupule & même davantage pour arrêter des écoulemens immodérés de quelque nature qu'ils soient ; mais ce remède ne doit être employé que par un Médecin habile, car il ne convient que dans les cas de relachement , & s'il y avoit inflammation ou éréthisme , il augmenteroit considérablement par son astriction les symptômes de la maladie.

L'alun calciné absorbe l'humidité des plaies , détruit les chairs baveuses des vieux ulcères, & les conduit à cicatrice.

Les Teinturiers font un grand usage de l'alun, & sur-tout de celui de Rome.

## E S P E C E. VIII.

Nitre d'argille. *Nitrum argillaceum.*

Ce sel est formé par l'union de l'acide nitreux à la terre argilleuse. Il est très-déliquescent, & peut se décomposer comme tous les autres sels à base terreuse. On ne trouve point ce sel formé par la nature, il est toujours un produit de l'art, qui le fait en dissolvant dans l'acide nitreux la terre précipitée par un alkali de la dissolution des argilles dans l'eau.

## E S P E C E IX.

Sel marin argilleux. *Sal argillaceum.*

Ce sel est formé par l'union de l'acide marin à la terre de l'argille. Il est très-déliquescent, & peut se décomposer comme tous les autres sels à base terreuse. On ne le trouve point formé par la nature. L'art le produit en dissolvant dans l'acide marin la terre précipitée par un alkali fixe de la dissolution d'argille dans l'eau.

*Fin du premier Volume.*

---

# EXPLICATION

## *DES PLANCHES.*

---

### PLANCHE PREMIERE.

#### **F**IGURE I. Fourneau de décoction.

- A. Le fourneau vu par-dessus, avec quatre échancrures servant de cheminée.
- B. Porte du foyer.
- C. Porte du cendrier.

#### FIGURE II. Fourneau de réverbère.

- A. Porte du cendrier.
- B. Porte du foyer.
- C. Cercle dans lequel se met la cornue.
- D. Dôme qui recouvre la cornue ; on a ouvert ces deux portions D & C , pour laisser voir la cornue E.
- E. Cornue.
- F. Echancrure circulaire formée en partie par le cercle & en partie par le dôme , & servant à passer le col de la cornue.
- G. Cheminée du fourneau.
- H. Grand ballon de verre servant de récipient pour les distillations qui se font à la cornue.

#### FIGURE III. Fourneau de coupelle.

- A. Porte du cendrier servant aussi de foyer.
- B. Porte qui répond à celle du foyer dans

442 *Explication des Planches.*

les autres fourneaux, & qui forme ici  
l'ouverture de la moufle.

C. Dôme du fourneau.

D. Cheminée.

FIGURE IV. Moufle vue par - devant &  
dans laquelle on apperçoit la coupelle.

FIGURE V. Moufle vue par derrière.

FIGURE VI. Alambic de verre d'une seule  
pièce.

FIGURE VII.

A. Cornue de verre.

B.B. Allonges de verre.

FIGURE VIII. Récipient servant à la distil-  
lation des huiles essentielles.

A. Corps du récipient.

B. Le syphon.



P L A N C H E II.

**F**IGURE I. Appareil d'une distillation à l'alambic de cuivre.

- A. Fourneau servant à porter l'alambic.
- B. Porte du foyer.
- C. Porte du cendrier.
- D. La cheminée du fourneau.
- E. La cucurbite de cuivre.
- F. Le réfrigérant qui renferme le chapiteau.
- G. Bec du chapiteau.
- H. Robinet servant à vuidier le réfrigérant.
- I. Seau de cuivre renfermant un serpentín d'étain.
- K. Extrémité du serpentín par laquelle sort le produit de la distillation.
- L. Robinet pour vuidier l'eau contenue dans le seau du serpentín.
- M. Ballon de verre pour recevoir le produit des distillations.

FIG. II. Cucurbite de cuivre.

FIG. III. Cucurbite d'étain servant pour les distillations qui se font au Bain-Marie.

FIG. IV. Coupe du chapiteau & du réfrigérant.

- A. Le chapiteau.
- B. Le bec du chapiteau.

444 *Explication des Planches.*

C. Le réfrigérant.

D. Robinet pour vuidier l'eau du réfrigérant.

FIG. V. Développement du serpentín.

FIG. VI. Appareil pour la sublimation des fleurs de soufre.

A. Fourneau.

B. Cucurbite de terre dans laquelle on met le soufre.

C. Aludels.

D. Chapiteau qui recouvre les aludels.



differentes Substances,



|   |   |    |    |    |     |     |
|---|---|----|----|----|-----|-----|
| ☾ | ☾ | ♂  | ☑  | ▽  | *▽S | *▽S |
| ☾ | ♂ | ☑  | ♂  | ▽S | *▽  | *▽  |
| C | ♀ | ♂♀ | ♂♀ | ⊖  | *⬢⬢ | *R  |
|   |   |    |    |    |     |     |
|   |   |    |    |    |     |     |
|   |   |    |    |    |     |     |
|   |   |    |    |    |     |     |
|   |   |    |    |    |     |     |
|   |   |    |    |    |     |     |
|   |   |    |    |    |     |     |

Substances Me. ♁ Etain.

iques Lunaires. ♂ Plomb.

♀ Mercure.


ent.

♂ Linc.




ore.

PC Pierre Calaminaire

☑ Regule d'Antimoine.













*Fig 2.*



3





*Fig 1.*

I



# TABLE

## DES MATIÈRES

*Contenues dans ce Volume.*

### A

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> CIDES, (Sels) | Agate zoomorphite ,     |
| pages 14, 19, 271.     | 155.                    |
| — minéraux, 19.        | — anthropomorphi-       |
| — vitriolique, 19,     | te, 156.                |
| 272.                   | — uranomorphite ,       |
| — nitreux, 20,         | <i>ibid.</i>            |
| 284, 354.              | Aigue-Marine, 175.      |
| — marin, 20, 293.      | Air, 58.                |
| — sulfureux, 20,       | Alambic, 25.            |
| 266, 300.              | — aveugle, 36.          |
| — végétaux, 20.        | Albâtre calcaire, 210.  |
| — phosphorique, 21.    | — gypseux, 419.         |
| Affinités, 6.          | Alkalis (Sels) 21, 304. |
| — d'aggrégation,       | — déliquescent, 305,    |
| <i>ibid.</i>           | — marin, 311.           |
| — de composition,      | — volatil, 326.         |
| <i>ibid.</i>           | Allonges, 35.           |
| — doubles, 17.         | Aludels, 37.            |
| — réciproques, 18.     | Alun, 431.              |
| Agate, 151, 153        | ( fabrique de )         |
| & suiv.                | ( analyse de )          |
| — onyce, 154.          | ( usage de )            |
| — herborisée, 155.     | Améthiste, 186.         |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Amiante, 230 & <i>suiv.</i>  | — non ductiles, 121.        |
| Analyse chymique, 6          | — à foulon, 122.            |
| & <i>suiv.</i>               | (analyse des) 124.          |
| Ardoise, pag. 226.           | (usages des)                |
| Aréomètre, 68 & <i>suiv.</i> | Asbeste, 230 & <i>suiv.</i> |
| Argilles, 116.               | Avanturine, 156.            |

## B

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| B A I N, page 28.          | — de Rulland, 265.    |
| — marie, 29.               | Bérille, 175.         |
| — de vapeurs, <i>ibid.</i> | Blanc de Craie, 123.  |
| — de sable, 30.            | Bleu d'Ostremer, 245. |
| Ballon, 33.                | Bol d'Arménie, 119.   |
| Basalte, 246.              | Borax, 318.           |
| Beaume de Soufre, 265.     | Brèche, 202.          |
|                            | Buccin, 106.          |

## C

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| C A I L L O U gris, page 147.  | Chrysoprase, page 177.   |
| — d'Egypte, 148.               | Clyffus du Nitre, 360.   |
| — à fusil, 151.                | Cœur, 106.               |
| Cailloux, (analyse des) 158.   | Cohobation, 35.          |
| Calcédoine, 152.               | Congellation, 209.       |
| Calcination, 38.               | Conques anatifères, 106. |
| Cames, 106.                    | Coquille univalve, 105.  |
| Gamée, 154.                    | — bivalve, 106.          |
| Capsule, 12.                   | Cornaline, 151.          |
| Chapiteaux, 25.                | Corne d'ammon, 105.      |
| Chatoyance de Lapidaires, 156. | Cornet, 106.             |
| Chaux, 212 & <i>suiv.</i>      | Corne, 310.              |
| Chrysobérille, 177.            | Coupelle, 42.            |
| Chrysolite, <i>ibid.</i>       | Craie, 98.               |
|                                | Crapaudine, 109.         |

# DES MATIERES. 447

|                          |                 |      |
|--------------------------|-----------------|------|
| Cryſtal de Madagaſcar,   | — minéral, page | 369. |
|                          | page            | 161. |
| — vermiculaire,          | Cron,           | 104. |
|                          | Creuſet,        | 38.  |
| — de roche, <i>ibid.</i> | — de France     | 130. |
| — noir,                  | Cucurbite,      | 25.  |

## D

|                               |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| <b>D</b> ENDRITE, p. 155.     | — composés, p. | 13.          |
| Détonnation du nitre,         | Distillation,  | 23.          |
| 344 & 358.                    | — montante,    | 24 &         |
| Diamant,                      |                | <i>ſuiv.</i> |
| Digeſtion                     | — descendante, | 24           |
| Diſſolution, 3 & <i>ſuiv.</i> |                | & 30.        |
| Diſſolvans ſimples, 2         | — latérale,    | 24 &         |
| & <i>ſuiv.</i>                |                | 31.          |

## E

|                           |                          |      |
|---------------------------|--------------------------|------|
| <b>E</b> AU, pag. 2 & 63. | Eſprit de nitre à la ma- |      |
| — forte,                  | nière de Glauber,        |      |
| — de Luce,                | page                     | 354. |
| — de Rabel,               | — de nitre fumant,       |      |
| Ecaille de mer,           |                          | 356. |
| Élément,                  | — de ſel dulcifié,       |      |
| Émeraude,                 |                          | 300. |
| Empyreume,                | — de vitriol,            | 276. |
| Eſprit ardent,            | Evaporatoires.           |      |

## F

|                          |                          |      |
|--------------------------|--------------------------|------|
| <b>F</b> AUSSE AIGUE-    | Fauſſe Hyacinthe, page   |      |
| MARINE, p. 164.          |                          | 166. |
| — Améthiſte, 165.        | — Topaze,                | 163. |
| — Chryſolite, 164.       | Faux Grenat,             | 166. |
| — Émeraude, <i>ibid.</i> | <del>Topaze</del> Rubis, | 165. |

|                   |                                         |                     |                           |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Saphir,           | page <a href="#">165.</a>               | Flux noir,          | page <a href="#">359.</a> |
| Feldt Spath,      | <a href="#">241.</a>                    | Foie de Soufre,     | <a href="#">263.</a>      |
| Feu,              | <a href="#">2</a> & <a href="#">44.</a> | Fourneau d'alambic, |                           |
| Filtration,       | <a href="#">40.</a>                     |                     | <a href="#">29.</a>       |
| Fleurs de Soufre, | <a href="#">260.</a>                    | — de coupelle,      | <a href="#">41.</a>       |
| Flux blanc,       | <a href="#">359.</a>                    | — de réverbère,     | <a href="#">32.</a>       |

## G

|                   |                          |                   |                           |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| GEMBAUX,          | page <a href="#">35.</a> | Grais de Turquie, | page <a href="#">145.</a> |
| Girasol,          | <a href="#">157.</a>     | — carié,          | <a href="#">146.</a>      |
| Gland de mer,     | <a href="#">156.</a>     | Granit,           | <a href="#">251.</a>      |
| Grais,            | <a href="#">142.</a>     | Grenat,           | <a href="#">184.</a>      |
| — des Rémouleurs, | <a href="#">145.</a>     | Gyps,             | <a href="#">417.</a>      |
|                   |                          | — soyeux,         | <a href="#">418.</a>      |

## H

|                     |                          |                    |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| HUILES,             | page <a href="#">22.</a> | Huiles de vitriol, | <a href="#">272.</a> |
| — de tartre par dé- |                          | — glaciale,        | <a href="#">356.</a> |
| faillance,          | <a href="#">305.</a>     | Huîtres,           | <a href="#">106.</a> |
|                     |                          | Hyacinthe,         | <a href="#">180.</a> |

## I

|                    |                           |                       |                           |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| JADE,              | page <a href="#">220.</a> | Jaspe verd,           | pag. <a href="#">149.</a> |
| Jaspe fleuri gris, | <a href="#">149.</a>      | — sanguin,            | <a href="#">150.</a>      |
| — fleur jaune,     | <i>ibid.</i>              | Incrustations,        | <a href="#">210.</a>      |
| — rouge,           | <a href="#">148.</a>      | Inflammation des hui- |                           |
|                    |                           | les,                  | <a href="#">291.</a>      |

## L

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>L</b> AIT DE SOUFRE, | Limas,                | 105.                  |
| page 2 <u>13</u> .      | Liqueur des cailloux, |                       |
| Lapis - Lazuli,         | <u>243</u> .          | 158, & 308.           |
| Lépas,                  | <u>105</u> .          | — des Savoniers, 305. |
|                         |                       | Liqueur               |



# DES MATIERES. 449

Liqueur fumante de Lumachele, 203.  
Boyle, p. 264 & 327. Lurs, 34.

## M

**M**AGISTER DE Marnes, p. 110 & 111.  
SOUFRE, page Matras, 33.  
263. Menstrues simples, 9  
Magnésie, 350. & suiv.  
Manche de côuteaux, — composés, 13.  
106. Mica, 229.  
Marais salans, 372. Mixte, 43.  
Marbres, 196 & suiv. Moufle, 42.  
— figurés, 204. Moule, 106.

## N

**N**AUTILES, p. 105. Nitre alkalyfé par lui-  
Nérites, *ibid.* même, pag. 352.  
Neutres, (Sels) 15. — alkalyfé par le  
— parfaits, 331. tartre, 259.  
— demi-volatils, — cubique, 366.  
390. — d'argille, 440  
— terreux, 414. — de fable, 415.  
Nitre, 343. — de craie, 427.

## O

**O**CHRE, page 135 Oreille de mer, p. 105.  
& 136. Oscabron, 106.  
Œil de chat, 117. Ostéocolle, 111.  
Offa Helmontii, 328. Ourfin, 108.  
Opale, 157.

## P

**P**IGNES, p. 106. Pélican, page 36.  
Tome I. P p

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Peridot, page 178.        | Pierre à cautère, p. 315.  |
| Phlogistique, 52 & suiv.  | — à plâtre, 419.           |
| Pholade, 106.             | — de Bologne, 423.         |
| Phosphore d'Homberg, 408. | — hépatique, 420.          |
| Pierres vitreuses, 140.   | — pourrie, 124.            |
| — à filtrer, 144.         | Poudre à canon, 364.       |
| — meulière, 146.          | — fulminante, <i>ibid.</i> |
| — à fusil, 147.           | Porcelaine, 133.           |
| — d'Hirondelle, 158.      | — (coquilles) 106.         |
| — précieuses, 167.        | Porphyre, 248.             |
| — calcaires, 191.         | Pourpre, 106.              |
| — (analyse des) 211.      | Poussiepie, <i>ibid.</i>   |
| — argilleuses, 218.       | Précipitation, 12.         |
| — de lard, 219.           | Pudding, 252.              |
| — naxienne, 227.          | Pyromètre, 47.             |
| — de roche, 238.          | Pyrophore d'Homberg, 434.  |

## Q

QUARTZ, page 160 & suiv.

## R

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| RÉCIPIENT, page 33.                     | Réfrigérant, page 27.   |
| — aux huiles essentielles, <i>ibid.</i> | Rocher, (coquille) 106. |
|                                         | Roulleau, <i>ibid.</i>  |
|                                         | Rubis, 182.             |

## S

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| SABLES, page 86.       | Sables cuivreux, p. 92.  |
| — pierreux, 88.        | — aurifer, 92.           |
| — métalliques, 90.     | Sables, (usages des) 93. |
| — d'étain, 91.         | Sablon blanc, 88.        |
| — de fer, <i>ibid.</i> |                          |

# DES MATIERES. 451

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Sablon jaune, <i>page</i> 89.       | Sel marin argilleux ,           |
| Sabots ou Trochilites ,             | 440.                            |
| 105.                                | — marin calcaire ,              |
| Salpêtre de Houffage ,              | 419.                            |
| 344.                                | — de fable , 415.               |
| Sanguine, 136.                      | — Polycresse de Gla-            |
| Saphir, 174.                        | ser, 354.                       |
| Sardoine, 152.                      | — sédatif, 321.                 |
| Schiste, 225 & <i>suiv.</i>         | Sels simples, 271.              |
| Schlot, 380.                        | — sulfureux de Stalh,           |
| Schorl, 246 & <i>suiv.</i>          | 387.                            |
| Sels, 14 & 270.                     | — marin, 388.                   |
| — ammoniacaux, 327 & 390.           | Sélénites, 416.                 |
| Sel ammoniac, 385.                  | Serpentine, ( pierre )          |
| — fixe, 408.                        | 221.                            |
| — ammoniacal ni-                    | Soufre, 254.                    |
| treux, 393.                         | — lavé, 281.                    |
| — vitriolique, 391.                 | — artificiel, 266.              |
| Sel Alembroth, 396.                 | Soufre, ( analyse du )          |
| — d'argille, 314.                   | 266.                            |
| Sel de <i>duobus</i> , <i>ibid.</i> | — ( usage du ) 268.             |
| — d'epsom, 382 &                    | Spath, 204 & <i>suiv.</i>       |
| 339.                                | — vitreux, 418.                 |
| — de Glauber, 337.                  | — fusible, <i>ibid.</i>         |
| — fébrifuge, 367.                   | Stalactites, 208 & <i>suiv.</i> |
| — gemme, 370.                       | Stalagmites, 209.               |
| — marin, 379.                       | Stéatites, 222.                 |
|                                     | Sublimation, 24.                |
|                                     | Synthèse, 6.                    |

## T

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| TALC, <i>page</i> 228 & | Terres calcaires, 98.    |
| <i>suiv.</i>            | — ( usages des )         |
| Tartre vitriolé, 331.   | 317.                     |
| Terre élémentaire, 78.  | Terres argilleuses, 114. |

452 T A B L E, &c.

|                   |              |                           |           |
|-------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Terres ductiles , | page 115.    | Terres douce de Vitriol , | page 356. |
| —— composées ,    | 134.         | —— noire ,                | 137.      |
| —— animales ,     | 139.         | Terreau ,                 | 138.      |
| —— minérales ,    | 135.         | Terre figillée ,          | 119.      |
| —— végétales ,    | 137.         | Terre vernissée ,         | 130.      |
| —— coquillieres , | 104.         | Tonnes ,                  | 106.      |
| —— d'Angleterre , | 136.         | Topaze ,                  | 178.      |
| —— de Vérone ,    | <i>ibid.</i> | Toutbes ,                 | 138.      |
| —— d'ombre ,      | <i>ibid.</i> | Tourmaline ,              | 186.      |
|                   |              | Trappe ,                  | 242.      |
|                   |              | Tripoli ,                 | 122.      |
|                   |              | Tuf ,                     | 211.      |
|                   |              | Turquoises                | 107.      |
|                   |              | Tuyau ,                   | 105.      |

V

|                           |                     |         |
|---------------------------|---------------------|---------|
| V E R R E D E B O R A X , | Vitriol de sable ,  | p. 115. |
| page 267.                 | Volcan artificiel , | 267.    |
| Vis , ( coquilles ) 106.  | Unicorne fossile ,  | 107.    |

Y

|                |                   |         |
|----------------|-------------------|---------|
| Y VOIR FOSILE, | Yeux de serpent , | p. 109. |
| page 107.      | Yeux de loup ,    | 156.    |

Z

|               |           |
|---------------|-----------|
| Z O L I T E , | page 235. |
|---------------|-----------|

*Fin de la Table.*

# ADDITIONS

## & Corrections à faire dans ce premier Volume.

- P**AGE 4, ligne 2, les végétaux qui ont la vie & le mouvement, lisez les végétaux qui ont la vie & n'ont point le mouvement.
- Page 10, lig. 3, le parties, lisez, les parties.
- Page 10, lig. 20, au-dessous du terme, lisez, au-dessus du terme.
- Page 93, lig. 8, gangue, lisez, gangue.
- Page 106, lig. 24, couches analières, lisez, conques anatiferes.
- Page 111, lig. 7, lencargilla, lisez, leucargilla.
- Page 122, lig. 3, de hiescens, lisez, dehiscens.
- Page 153, lig. 20, seu cachates, lisez, leucachates.
- Page 226, lig. 17, tunitans, lisez, tinnitans.
- Page 271, lig. 15, purs ni autrement, lisez, purs autrement.
- Page 286, lig. 2, de sa fermentation, lisez, de sa formation.
- Page 333, lig. 6, distillation de l'acide nitreux, lisez, distillation du nitre.
- Page 378, lig. 22, à l'ouverture desquels, lisez, près de ces ouvertures
- Page 386, lig. 20, lorsqu'au contraire le sel est mêlé à des matières fermentescibles en petite quantité, lisez, lorsqu'au contraire le sel est mêlé en petite quantité à des matières fermentescibles.
- Page 392, lig. 16, du phlogistique de l'acide nitreux ou des doubles affinités, lisez, du phlogistique, de l'acide nitreux, ou des doubles affinités.

Ad. 1456331

